

G. BERTANI, F. MARTINI

LA PRESENZA RELITTICA DEL GENERE *RHYNCHOSPORA* VAHL  
NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

*THE RELIC GENUS RHYNCHOSPORA VAHL IN FRIULI-VENEZIA GIULIA  
REGION (NORTH-EASTERN ITALY)*

**Riassunto breve** – Vengono discusse la distribuzione e l'appartenenza fitosociologica di *Rhynchospora alba* (L.) Vahl e *R. fusca* (L.) Ait. f., elementi relittici della flora del Friuli-Venezia Giulia. I rilievi ne documentano la presenza nel *Caricetum davallianae* Dutoit 24 em. Görs 63 e nell'*Euphrasio marchesettii - Schoenetum nigricantis* Marchiori et Sburlino 82.

**Parole chiave:** Gen. *Rhynchospora* Vahl, Corologia, Fitosociologia, Friuli-Venezia Giulia.

**Abstract** – *The paper deals with the distribution and phytosociology of the genus Rhynchospora in Friuli-Venezia Giulia (North-eastern Italy). R. alba (L.) Vahl and R. fusca (L.) Ait. f. appear inside of Caricetum davallianae Dutoit 24 em. Görs 63 and Euphrasio marchesettii - Schoenetum nigricantis Marchiori et Sburlino 82.*

**Key words:** Genus *Rhynchospora* Vahl, Chorology, Phytosociology, Friuli-Venezia Giulia (North-eastern Italy).

## 1. Generalità

Il genere *Rhynchospora*, che ha baricentro nelle aree tropicali e subtropicali del Nuovo Mondo (SCHULTZE-MOTEL, 1967), conta circa 250 specie. Alla flora italiana appartengono solamente *R. alba* e *R. fusca*<sup>(1)</sup>, entità morfologicamente poco variabili, iscritte rispettivamente alle sect. *albae* e *fuscae* (KÜKENTAL, 1950). Si tratta di specie anfiatlantiche, ad areale eurosibirico-nordamericano con l'esclusione delle regioni

(1) La nomenclatura scientifica segue PIGNATTI (1982) per le piante vascolari e FRAHM & FREY (1983) per le briofite.

