

GORTANIA - Atti Museo Friul. Storia Nat.	13 ('91)	195-201	Udine, 31.VII.1992	ISSN: 0391-5859
--	----------	---------	--------------------	-----------------

L. LAPINI, A. DALL'ASTA, D. SCARAVELLI

FIRST RECORD ON THE OCCURRENCE OF *TRITURUS V. VULGARIS*
(LINNÉ, 1758) IN NORTH-EASTERN ITALY
(AMPHIBIA, CAUDATA, SALAMANDRIDAE)

PRIMI DATI SULLA PRESENZA DI *TRITURUS V. VULGARIS*
(LINNÉ, 1758) NELL'ITALIA NORD-ORIENTALE
(AMPHIBIA, CAUDATA, SALAMANDRIDAE)

Abstract – The Authors refer about the occurrence of *Triturus v. vulgaris* in north-eastern Italy. After a review of the distribution of this newt in the eastern Alps, they introduce a provisional UTM (10x10 square grid system) synthesis of the distribution of *T. v. vulgaris* and *T. v. meridionalis* in the Friuli-Venezia Giulia region.

Key words: Distribution, *Triturus v. vulgaris*, *T. v. meridionalis*.

Riassunto breve – Gli Autori riferiscono i primi dati sulla presenza di *Triturus v. vulgaris* nell'Italia nord-orientale. Dopo una rapida disamina delle attuali conoscenze sulla distribuzione di questo tritone nelle Alpi sud-orientali, gli Autori presentano una sintesi preliminare della distribuzione di *Triturus v. vulgaris* e *Triturus v. meridionalis* nel Friuli-Venezia Giulia realizzata secondo il sistema UTM con un reticolo di km 10 di lato.

Parole chiave: Distribuzione, *Triturus v. vulgaris*, *T. v. meridionalis*.

1. Introduction

Triturus vulgaris (L., 1758) is a Caucasian-Euroanatolic polytypic species (sensu LA GRECA, 1963) of the Euro Turanic “*vulgaris* group” (GIACOMA & BALLETO, 1988), distributed in central and south-eastern Europe and central western Asia (THORN, 1968; GENIEZ & GRILLET, 1990). It has been subdivided in seven well distinct subspecies (RAXWORTHY, 1990), only one of them (*T. v. meridionalis*) dwelling in northern and central Italy (LANZA, 1968; BRUNO, 1973; LANZA, 1983; LAPINI, 1983; DOLCE & LAPINI, 1989).

