

GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat.	17(1995)	145-147	Udine, 31.VII.1996	ISSN: 0391-5859
---	----------	---------	--------------------	-----------------

M. SPECCHI, E. PIZZUL

*PSEUDORASBORA PARVA* (SCHLEGEL, 1842) (OSTEICHTHYES, CYPRINIDAE)  
NELLE ACQUE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. PRIMA SEGNALAZIONE

*PSEUDORASBORA PARVA* (SCHLEGEL, 1842) (OSTEICHTHYES, CYPRINIDAE) IN  
*FRIULI-VENEZIA GIULIA FRESHWATERS (NORTH-EASTERN ITALY).*  
FIRST OBSERVATION

**Riassunto breve** - Nel Fiume Vipacco, in occasione di una campagna di recupero di esemplari di *Silurus glanis*, nell'aprile 1996 è stato catturato un esemplare di *Pseudorasbora parva*, specie alloctona nelle nostre acque il cui areale originale interessava l'Asia orientale. In Italia la presenza di questa specie è stata segnalata all'inizio degli anni '90 nei corsi d'acqua della bassa pianura emiliana.

**Parole chiave:** *Pseudorasbora parva*, Fiume Vipacco, Friuli-Venezia Giulia, Nuova segnalazione.

**Abstract** - In the river Vipacco, while *Silurus glanis* was being fished in April 1996, a specimen of *Pseudorasbora parva* was caught. This is an East Asiatic fish which was discovered in the early '90s to live in Italian water courses limited to the lower Emilian plain.

**Key words:** *Pseudorasbora parva*, Vipacco river, North-Eastern Italy, New record.

*Pseudorasbora parva* (fig.1) è un piccolo Ciprinide la cui lunghezza totale è solitamente inferiore a cm 10; il corpo è fusiforme con capo appuntito e bocca in posizione supera. È una specie che possiede un'ampia valenza ecologica preferendo tuttavia acque stagnanti o a lento corso (GANDOLFI et al., 1991).

L'originaria diffusione della specie interessava esclusivamente l'Asia orientale; ma in seguito ad un'introduzione accidentale avvenuta nel 1960 nelle acque del basso Danubio, ha ampliato il suo areale nell'Europa centro-orientale. Nel 1980 è segnalata nelle acque francesi (ALLARDI & CHANCEREL, 1988) e da BIANCO (1988) in alcune località dei Balcani. Quest'ultimo Autore osserva che su 19 esemplari esaminati, 11 avevano età 0+ (lunghezza standard compresa tra mm 32 e 74, linea laterale incompleta costituita da 9-28 scaglie) 8 esemplari avevano età compresa tra 0+ e 1+ (lunghezza standard variabile tra mm 32-74, linea laterale completa costituita da 35-37 scaglie); tutti gli esemplari presentavano inoltre una banda longitudinale scura, più pallida negli esemplari di età 1+.

