S. Costalonga, R. Pavan, P. Ragogna

SEGNALAZIONI FLORISTICHE DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. VII (119-144)

FLORISTIC FINDINGS FROM FRIULI-VENEZIA GIULIA REGION. VII (119-144)

Riassunto breve - Nel settimo contributo alla cartografia floristica della regione Friuli-Venezia Giulia si rendono noti i ritrovamenti di alcune interessanti entità a livello regionale e provinciale: Fagopyrum esculentum, Amaranthus buchonii, Arenaria leptoclados, Minuartia rupestris, Ranunculus muricatus, Barbarea bracteosa, Berteroa incana, Trifolium striatum, Lavatera cretica, Viola suavis, Laserpitium krapfii subsp. gaudinii, Anagallis foemina, Galium rubrum, Anchusa arvensis, Stachys annua, Physostegia virginiana, Lycopus exaltatus, Salvia nemorosa, Verbascum sinuatum, Chaenorrhinum minus subsp. litorale, Orobanche hederae, Scabiosa dubia, Aster linosyris, Sagittaria latifolia, Allium rotundum, Carex polyphylla, Valeriana supina.

Parole chiave: Floristica, Cartografia, Friuli-Venezia Giulia, Italia nord-orientale.

Abstract - The paper deals with the seventh contribution to the floristic cartography of Friuli-Venezia Giulia Region (North-East Italy) and mentiones these entities: Fagopyrum esculentum, Amaranthus buchonii, Arenaria leptoclados, Minuartia rupestris, Ranunculus muricatus, Barbarea bracteosa, Berteroa incana, Trifolium striatum, Lavatera cretica, Viola suavis, Laserpitium krapfii subsp. gaudinii, Anagallis foemina, Galium rubrum, Anchusa arvensis, Stachys annua, Physostegia virginiana, Lycopus exaltatus, Salvia nemorosa, Verbascum sinuatum, Chaenorrhinum munis subsp. litorale, Orobanche hederae, Scabiosa dubia, Aster linosyris, Sagittaria latifolia, Allium rotundum, Carex polyphylla, Valeriana supina.

Key words: Flora, Cartography, Friuli-Venezia Giulia, North-East Italy.

Introduzione

Il presente contributo si aggiunge ai sei precendentemente pubblicati su questa stessa rivista da Poldini & Vidali (*Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 6 (1984): 191-202, 1985), Martini & Poldini (*ibid.*, 9 (1987): 145-168, 1988; 10 (1988): 145-162, 1989; 13 (1991): 137-156, 1992), Barbo, Bertani, Costalonga, Danelutto, Favretto, Guerra, Pavan & Tonussi (*ibid.*, 17 (1995): 121-139, 1996) e Costalonga & Pavan (*ibid.*, 20 (1998): 75-80). La nomenclatura segue Ehrendorfer & Coll., Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas (1973);

GAMESNII 21 (1999)

PIGNATTI, Flora d'Italia (1982); POLDINI, Atl. corol. piante vasc. Friuli-Venezia Giulia (1991); TUTIN et al., Flora Europaea (1964-80) e, nel caso di *Physostegia virginiana*, BRITTON & BROWN, An Illustr. Fl. of the Northern U.S. and Canada (1898).

Le schede 119-143 sono curate da S. Costalonga e R. Pavan, la scheda 144 è di P. Ragogna.

119. Fagopyrum esculentum Moench (Polygonaceae)

(Syn.: Fagopyrum sagittatum Gilib.; Polygonum fagopyrum L.)

Avventizia rediviva per la regione Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Roveredo in Piano, incolto in località La Viola (UL 11.97 - 9941/4) m 90, 25 Sep 1998, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie che in passato veniva coltivata per scopi alimentari, specialmente in Trentino e in Valtellina (Pignatti, Fl. Ital., 1: 146, 1982).

Segnalata come "qua e là subspontanea" da L. e M. Gortani (Fl. Friul., 2: 144, 1906) per il Friuli e la Carnia, è stata trovata nel 1956 "nei cespugli presso il Lago di Pietra Rossa", a est di Monfalcone (Mezzena, L'erbario di Carlo Zirnich, *Atti Mus. Civ. St. Nat.*, Trieste, 38: 347, 1986).

120. Amaranthus bouchonii Thell (Amaranthaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, incolto all'esterno del Cimitero di S. Odorico (UL 06.91 - 10041/3) m 26, 23 Oct 1997 et 4 Sep 1998, R. Pavan et S. Costalonga (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie esotica segnalata recentemente come nuova per il Friuli-Venezia Giulia da A. Danelutto (Barbo et al., *Gortania - Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 17 (1995): 133, 1996).

Dopo questa segnalazione è stata pure ritrovata in numerose altre località in provincia di Udine e nell'area di base di Grado (Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 4, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 19 (1997): 162).

121. Minuartia rupestris (Scop.) Sch. et Th. (Caryophyllaceae)

Seconda segnalazione per la cartografia della provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Montereale V.C., nei pressi di Pala d'Altei (UM 14.14 - 9841/2) m 1400, 28 Jun 1998, S. Costalonga et R. Pavan (MFU, TSB, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Indicata da Pignatti (Fl. Ital., 1: 203, 1982) come rarissima per le Alpi, in Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 520, 1991) risultano dati di campagna solo per le

Alpi Carniche e per un'Area di Base delle Alpi Giulie. Per la cartografia della provincia di Pordenone, nel citato Atlante viene indicato un dato di letteratura solo per l'Area di Base 9840.

122. Ranunculus muricatus L. (Ranunculaceae)

Specie rediviva per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Roveredo in Piano, coltivi in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 21 Apr et 3 May 1998, R. Pavan et S. Costalonga (MFU, TSB, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie annuale, comune al Sud e con distribuzione frammentaria al Nord (Pignatti, Fl. Ital., 1: 314, 1982). Per il Friuli-V.G. esiste la segnalazione di L. e M. Gortani (Fl. Friul., 2: 212, 1906) per Villaraspa (GO) su indicazione di G.A. Pirona.

123. Barbarea bracteosa Guss. (Cruciferae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone e terza segnalazione per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami Della Valentina (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 29 Apr 1998, R. Pavan (MFU, TSB, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie meridionale piuttosto rara al Nord (Pignatti, Fl. Ital., 1: 397, 1982). In Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 182, 1991) è indicata solo per l'Area di Base 9343 su segnalazione di H. Melzer.

124. Berteroa incana (L.) DC. (Cruciferae)

(Syn.: Alyssum incanum L.)

Specie rediviva per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami Della Valentina (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 1 Oct 1998, R. Pavan (MFU, TSB, Herb. Costalonga).

Osservazioni. Secondo Pignatti (Fl. Ital., 1: 430, 1982) è una specie di incolti e ruderi, rara ed incostante, spesso sinantropica. Per il Friuli-V.G. esistono solo dati di letteratura per il Goriziano ed il Triestino (Poldini, Atl. corol. piante vasc. FVG: 184, 1991).

125. Trifolium striatum L. (Leguminosae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Roveredo in Piano, coltivi in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 2 Jun 1998, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie annuale di incolti aridi, diffusa in tutto il territorio, ma con carattere di rarità (PIGNATTI, Fl. Ital., 1: 733, 1982). In POLDINI (Atl. corol. piante vasc. FVG: 757, 1991) i numerosi dati di letteratura per il Friuli orientale ed il Triestino sono stati, in

parte, recentemente confermati (Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 3, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 18 (1996): 176, 1997).

126. Lavatera cretica L. (Malvaceae)

Avventizia sporadica, nuova per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, incolto a bordo strada in Via Isonzo (UL 05.92 - 10040/2) m 26, 16 et 17 Mai 1994, R. Pavan et S. Costalonga (TSB, MFU, Herb. Costalonga); ibidem, 14 Apr 1998, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie annuale comune solo nel Meridione (Pignatti, Fl. Ital., 2: 90, 1982), mentre più a nord è indicata solo per le coste occidentali fino alla Liguria.

La pianta cresce rigogliosa ogni anno nell'erba a bordo strada, a ridosso del muro di un capannone adibito a magazzino di prodotti per l'agricoltura ed è probabile fruttifichi prima delle periodiche pulizie.

127. Viola suavis Bieb (Violaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Roveredo in Piano, bordo stradine di campagna in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 6 et 24 Feb 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

Osservazion ni. Secondo Merxmüller in Pignatti (Fl. Ital., 2: 105, 1982) è una specie diffusa, con carattere di rarità, nelle vallate alpine dalle Dolomiti alla Liguria e negli Appennini dall'Emilia agli Abruzzi. In Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 791, 1991) viene segnalata per la regione Friuli-V.G. la sola presenza di *Viola suavis* MB. ssp. *adriatica* (Freyn) Haesler, endemismo illirico, per il Triestino, il Goriziano ed in provincia di Udine per le Aree di Base di Gemona, Tarcento, Venzone e Pontebba (queste ultime due aggiunte successivamente [Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 1, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 15 (1993): 128, 1994]).

MAINARDIS & SIMONETTI (Flora delle Prealpi Giulie Nord-Occidentali tra il Fiume Tagliamento ed il Gruppo del Monte Canin, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 12 (1990): 112, 1991) segnalano la presenza di *Viola suavis* Bieb. (col sinonimo di *V. austriaca* A. & J. Kern.), in luoghi erbosi e selvatici, a Gemona, Glemina e Venzone.

128. Laserpitium krapfii Crantz subsp. gaudinii (Moretti) Thell. (Umbelliferae)

Specie nuova per la cartografia del Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. TV - Fregona, in Cansiglio sul M. Millifret (TM 94.03 - 9940/1) m 1570, 2 Sep 1998, S. Costalonga et R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Questa specie è stata ritrovata dopo oltre 20 anni dall'indicazione di Lorenzoni, Marchiori & Razzara nel Primo Catalogo Floristico delle Riserve del Cansiglio Occidentale - I Riserva Naturale Integrale "Piaie Longhe-Millifret" (*Atti 5° Conv. St. Nat. Prealpi Venete*, Lago (TV), 8-9 nov. 1975: 189, 1977).

Laserpitium krapfii Crantz subsp. gaudinii (Moretti) Thell. è un endemismo diffuso nelle Alpi Orientali, dal M. Grappa alle Grigne e Canton Ticino; segnalato anche al Passo Tre Croci in Cadore, mentre la subsp. krapfii è un'entità illirica con un areale che si avvicina ai nostri confini orientali nel Goriziano e Triestino (Pignatti, Fl. Ital., 2: 244, 1982).

129. Anagallis foemina Miller (Primulaceae)

GAMFSNU 21 (1999)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Roveredo in Piano, coltivi in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 19 Mai 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Secondo Pignatti (Fl. Ital., 2: 291, 1982) è una specie segnalata per tutto il territorio italiano, ma meno diffusa di *Anagallis arvensis* L.

In Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 139, 1991) ci sono dati di campagna e di letteratura solo per la parte orientale della regione.

130. Galium rubrum L. (Rubiaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t o. Prov. PN - Caneva, nei pressi del Col de Fer (UL 02.95 - 10040/2) m 260, 24 Jun 1998, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Questa specie è un endemismo Sud alpico - Nord appenninico (PIGNATTI, Fl. Ital., 2: 370, 1982). In POLDINI (Atl. corol. piante vasc. FVG: 377, 1991), per il Friuli-V.G., ci sono dati di campagna o di letteratura solo per le province di Udine e di Gorizia.

Galium rubrum L. era già stato trovato, da S. Costalonga et R. Pavan, il 12 luglio 1997 sotto il M. Pizzoc, a m 1200, Area di Base 9940/3 ricadente nella cartografia del Friuli-V.G., ma fuori regione (Comune di Fregona - TV) (Reperti: TSB, Herb. Costalonga).

131. Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.) Nordh. (Boraginaceae) (Syn.: Lycopsis arvensis L. subsp. orientalis Kusnez.)

Avventizia sporadica, specie rediviva per la regione Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i: Prov. PN - Roveredo in Piano: in un campo semiabbandonato già coltivato a cicoria, in località la Viola (9941/4) m 90, 17 Mai 1998, S. Costalonga et G. Tonussi (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i: È una terofita eurasiatica di incolti e siepi ed è presente, con carattere di rarità, nella maggior parte del territorio italiano (PIGNATTI, Fl. Ital., 2: 418, 1982).

Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.) Nordh. era già stata trovata, nel 1940 e nel 1945, da Zirnich nel Goriziano (Mezzena, L'erbario di C. Zirnich, Atti Mus. Civico St. Nat., Trieste, 38: 28, 1986).

132. Stachys annua (L.) L. (Labiatae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Pordenone, coltivi bordo strada per Roveredo (UL 17.96 - 9941/4) m 83, 13 Mai 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

Osserva, zioni. È una specie annuale rara che, secondo Pignatti (Fl. Ital., 2: 469, 1982), è assente in tutto il versante orientale del territorio italiano. Nel Friuli-V.G., invece, esistono dati di campagna e di letteratura per le province di Trieste, Gorizia ed Udine (Poldini, Atl. corol. piante vasc. FVG: 725, 1991; Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 1, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 15 (1993): 126, 1994; Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 3, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 18 (1996): 176, 1997; Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 4, *Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 19 (1997): 171, 1997).

133. Physostegia virginiana (L.) Benth. (Labiatae)

Avventizia sporadica, specie nuova per la cartografia del Friuli-Venezia Giulia.

Reperti. Prov. BL - Farra d'Alpago, bordo fangoso del torrente Tesa in prossimità del lago di S. Croce in località Sbarai (TM 95.11 - 9840/3) m 390, 30 Aug 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

Osservazion i. È una specie perenne originaria dell'America del Nord dove cresce sulle rive dei fiumi, nelle boscaglie e nei prati molto umidi (Britton & Brown, An Illustr. Fl. of the Northern U. S. and Canada, 3: 89, 1898) e viene coltivata per scopi ornamentali (Phillips & Rix, Riconoscere le piante perenni, 2: 103, 1994).

Il luogo del ritrovamento, dove la specie è presente con numerosi esemplari, è lontano da centri abitati. La tendenza a diffondersi sfuggendo alle colture era già stata osservata da Britton & Brown (cit.), nei luoghi dove la pianta era stata importata.

134. Lycopus exaltatus L.fil. (Labiatae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone e rediviva per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 18 Sep 1997, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Secondo Pignatti (Fl. Ital., 2: 494, 1982), è una specie perenne piuttosto rara, presente in alcune regioni del Nord e del Centro Italia.

Per il Friuli-Venezia Giulia ci sono solo dati di letteratura risalenti a Marchesetti ed ai Gortani e che riguardano il Triestino ed il Goriziano (Poldini, Atl. corol. piante vasc. FVG: 500, 1991).

135. Salvia nemorosa L. (Labiatae)

GAMFSNU 21 (1999)

Avventizia sporadica, specie nuova per la provincia di Pordenone e rediviva per il Friuli V.G.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 12 Sep 1997, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie rara di ruderi ed incolti aridi, presente solo in qualche regione del Nord e del Centro Italia (PIGNATTI, Fl. Ital., 2: 506, 1982).

Viene indicata da Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 664, 1991) solo per il Triestino, con dati di letteratura risalenti a Marchesetti.

136. Verbascum sinuatum L. (Scrophulariaceae)

Avventizia sporadica, specie nuova per la provincia di Pordenone e rediviva per il Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 21 Dec 1996, R. Pavan. La pianta, raccolta allo stato vegetativo con la sola rosetta basale, è stata piantata in orto dove è fiorita nel giugno 1998 (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

Osservazion i. Sebbene questa specie venga indicata da Pignatti (Fl. Ital., 2: 532, 1982) come comune in tutta Italia, in Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 773, 1991) è presente solo come dato di letteratura, dovuto al ritrovamento di Zirnich presso il Lago di Doberdò nel Goriziano (Mezzena, L'erbario di Carlo Zirnich, *Atti Mus. Civ. St. Nat.*, Trieste, 38: 435, 1986).

137. *Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp. *litorale* (Willd.) Hayek (Scrophulariaceae) (Syn.: *Chaenorhinum litorale* (Willd.) Fritsch)

Entità nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami (UL 05.91 - 10040/4) m 28, 4 Sep 1998, S. Costalonga (det. L. Poldini) (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Mentre *Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp. *minus* è l'entità più comune in tutto il territorio italiano, la subsp. *litorale* (Willd.) Hayek è limitata alle coste

GAMFSNU 21 (1999)

84

adriatiche, dal Triestino alle Marche, con penetrazione nelle zone collinari circostanti (Pignatti, Fl. Ital., 2: 542, 1982).

In Friuli-Venezia Giulia la subsp. minus è diffusa in tutta la regione (Poldini, Atl. corol. piante vasc. FVG: 260, 1991), mentre la subsp. litorale (Willd.) Hayek era limitata finora alle Aree di Base costiere delle province di Trieste, Gorizia ed Udine (Poldini & Vidali, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 3, Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat., 18 (1996): 167 e 178, 1997; POLDINI & VIDALI, Addenda ed errata/ corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 4, Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat., 19 (1997): 164).

138. Orobanche hederae Duby (Orobanchaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Pordenone, incolto al margine del Parco S. Valentino (UL 18.93 -10040/2) m 37, 18 Mai et 5 Jun 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

Osservazioni. Secondo Pignatti (Fl. Ital., 2: 613, 1982), è una specie eurimediterranea presente, ma con carattere di rarità, in tutte le regioni italiane.

In Friuli-V.G. Orobanche hederae Duby viene segnalata da Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 549, 1991) con dati di letteratura e di campagna solo per poche Aree di Base.

139. Scabiosa dubia Vel. (Dipsacaceae)

Specie nuova per la cartografia floristica del Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. TV - Fregona, in Cansiglio sul M. Millifret (TM 94.03 - 9940/1) m 1550, 2 Sep 1998, S. Costalonga (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. Specie di boscaglie e prati aridi, è presente (Pignatti, Fl. Ital., 2: 677, 1982) nelle Alpi Orientali, dal Cadore al Bergamasco e, secondo lo stesso autore (cit.), probabilmente "in tutta l'area dalla Carnia alle Grigne".

Come Scabiosa cfr. dubia Velen. viene indicata da Mainardis & Simonetti (Flora delle Prealpi Giulie nord-occidentali tra il fiume Tagliamento ed il gruppo del Monte Canin, Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat., 12 (1990): 148, 1991) per numerose località dell'area da loro indagata. Può darsi che per il Friuli-V.G. non sia stata finora segnalata con certezza per la sua somiglianza con Scabiosa lucida Vill. "dalla quale si distingue tuttavia per la caratteristica pelosità vellutata" (Pignatti, cit.).

140. Aster linosyris (L.) Bernh. (Compositae)

Specie nuova per la cartografia floristica della provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. TV - Cordignano, alture del Castelir a Villa di Villa (UL 00.94 - 10040/2) m 220, 18 Nov 1998, R. Pavan (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie comune diffusa nei colli prealpini dal Carso Triestino ai Laghi lombardi e nel resto d'Italia fino alla Basilicata (PIGNATTI, Fl. Ital., 3: 18, 1982). In POLDINI (Atl. corol. piante vasc. FVG: 171, 1991) ci sono parecchi dati di campagna, dal Triestino alla Carnia. Ritrovata recentemente anche nelle Aree di Base di Lignano, Latisana e Gorizia (POLDINI & VIDALI, Addenda ed errata/corrige all' "Atl. corol. piante vasc. FVG" (1991). 3, Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat., 18 (1996): 163, 1997).

141. Sagittaria latifolia Willd. (Alismataceae)

Specie esotica, avventizia sporadica, nuova per la regione Friuli-Venezia Giulia.

R e p e r t i. Prov. PN - Pordenone, fosso a bordo della strada per Vallenoncello, a sud della Fiera (UL 18.90 - 10041/4) m 18, 18 Sep 1998, R. Pavan (MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È specie ornamentale di origine nordamericana che viene indicata da PIGNATTI (Fl. Ital., 3: 321, 1982) come naturalizzata solo presso Varese. Il luogo del ritrovamento nei pressi di Pordenone è lontano da centri abitati e la pianta è in osservazione già da una decina d'anni.

Sagittaria latifolia Willd. è pure presente, con numerosi esemplari, in un fosso di Gaiarine in provincia di Treviso, non molto distante dal fiume Livenza, dove è stata raccolta da R. Pavan il 25 settembre 1998 (Reperti: TSB, Herb. Costalonga). Il luogo, che è lontano da centri abitati, non rientra però nell'ambito della cartografia del Friuli-Venezia Giulia.

142. Allium rotundum L. (Liliaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

Reperti. Prov. PN - Roveredo in Piano, incolto in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 17 Mai 1998, S. Costalonga (MFU, Herb. Costalonga).

Osservazioni. È una specie rara presente solo in poche regioni del norde del centro Italia (Pignatti, Fl. Ital., 3: 383, 1982). In Poldini (Atl. corol. piante vasc. FVG: 127, 1991) ci sono dati di letteratura per tre Aree di Base, due nel Triestino ed una in provincia di Udine e dati di campagna per due Aree di Base nel Triestino, di cui una a conferma del dato di letteratura.

143. Carex polyphylla Kar. et Kir.

(Syn.: Carex leersii F. Schultz)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

Reperti. Prov. PN - Sacile, scalo ferroviario legnami Della Valentina (UL 05.91 - 10040/

4) m 28, 29 Apr 1998, R. Pavan (Herb. Costalonga); Roveredo in Piano, incolto in località La Viola (UL 14.97 - 9941/4) m 90, 1 et 3 Mai 1998, R. Pavan et S. Costalonga (TSB, MFU, Herb. Costalonga).

O s s e r v a z i o n i. È una specie del gruppo *Carex contigua* Hoppe (= *C. muricata* L.) che P_{IGNATTI} (Fl. Ital., 3: 648, 1982) indica per le "vallate subalpine del Trentino e probabilmente altrove". Poldini, nel Catalogo Floristico del Friuli-Venezia Giulia e dei territori adiacenti (in *Studia Geobotanica* 1(2): 466, 1980), segnala *Carex polyphylla* Kar. et Kir. per il Triestino (M. Radio) e Istria (Prebenicco) con la dicitura "da controllare". La specie è stata recentemente segnalata per l'Area di Base 10248, nel Triestino, da Martini, Nardini & Rizzardini (*Gortania-Atti Mus. Friul. St. Nat.*, 19 (1997): 149-159).

144. Valeriana supina Ardoino (Valerianaceae)

Specie nuova per la provincia di Pordenone.

R e p e r t i. Prov. PN - Cimolais: ghiaione presso Forcella Val del Drap, sotto Punta Patèra (gruppo Cima dei Preti) (9640/4) m 2320, 29 Jul 1998, P. Ragogna (MFU).

O s s e r v a z i o n i. Secondo Pignatti (Fl. Ital., 2: 654, 1982) è una specie endemica rara, a distribuzione Est-alpica, relativamente frequente nelle Dolomiti centrali, ma che nel Friuli-Venezia Giulia è nota solo per tre Aree di Base: nel gruppo del M. Canin (9646), del Montasio (9546) e del M. Bivera (9541) (Poldini, Atl. corol. piante vasc. FVG: 838, 1991).

La specie è stata osservata anche lungo il sentiero (segnavia CAI n. 389) che da Forcella Val del Drap porta a Casera Laghet de Sora, in territorio veneto, attraverso la grande conca di Pala Anziana, alla base di Cima Laste, dove forma dei vasti tappeti tra i detriti ghiaiosi.

Indirizzo degli Autori - Authors' addresses:

⁻ Severino Costalonga

Strada per Fratta 43, I-33077 SACILE (PN)

⁻ Roberto Pavan

Via Marconi 8, I-33077 SACILE (PN)

⁻ Pierluigi RAGOGNA

Vicolo Roggiuzzole 5a, I-33170 PORDENONE