GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat.	22 (2000)	77-79	Udine, 30.XI.2000	ISSN: 0391-5859

NOTA BREVE

L. GALLO

SEGNALAZIONI FLORISTICHE RELATIVE AD ALCUNE ENTITÀ ESOTICHE SPONTANEIZZATE IN CROAZIA (REPUBLIKA HRVATSKA) CON CENNI SULLA LORO DISTRIBUZIONE ITALIANA

FLORISTIC REPORTS ON SOME ALIENS NATURALIZED IN CROATIA (REPUBLIKA HRVATSKA) WITH NOTES ON THE ITALIAN DISTRIBUTION

Riassunto breve - L'autore segnala il ritrovamento di alcune stazioni di *Aptenia cordifolia* (L. f.) Schwantes (Aizoaceae), *Phedimus spurius* (M. Bieb.) 't Hart (Crassulaceae), *Sedum sarmentosum* Bunge (Crassulaceae) e *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. (Compositae) nuove per la Croazia (Republika Hrvatska).

Parole chiave: Croazia, Italia, Flora.

Abstract - *The author reports some new findings of aliens naturalized in Croatia (Republika Hrvatska); the species are:* Aptenia cordifolia *(L. f.) Schwantes (Aizoaceae),* Phedimus spurius *(M. Bieb.) 't Hart (Crassulaceae),* Sedum sarmentosum *Bunge (Crassulaceae) and* Senecio mikanioides *Otto ex Walp. (Compositae).*

Key words: *Croatia, Italy, Flora.*

Introduzione

L'autore riporta alcune segnalazioni di entità esotiche più o meno ampiamente spontaneizzate in Croazia osservate nel mese di agosto del 1996 e ritenute di un certo interesse in quanto non riportate nelle due edizioni di *Flora Europaea* per JU. Le specie in questione sono *Aptenia cordifolia* (L. f.) Schwantes (Aizoaceae), *Phedimus spurius* (M. Bieb.) 't Hart (Crassulaceae), *Sedum sarmentosum* Bunge (Crassulaceae) e *Senecio mikanioides* Otto ex Walp. (Compositae). Con l'eccezione di *S. sarmentosum*, esse non risultano citate neppure in "Flora Croatica/Index Florae croaticae" (Pericin in litt.).

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes (Aizoaceae)

R e p e r t i. Lošinj a Veli Lošinj nei dintorni del Duomo, invadente in un giardino oggi abbandonato [GL-4317].

O s s e r v a z i o n i. Specie sudafricana riportata da TUTIN (1993) per le coste dell'Europa meridionale ed occidentale. Per l'Italia PIGNATTI (1982) la indica come presente solo in Liguria (Varazze), Puglia (Brindisi), Lazio (Ventotene) e Malta. La specie è però ampiamente coltivata in tutto il meridione d'Italia e diversi casi di spontaneizzazione sono stati osservati dall'autore anche in Sicilia e Sardegna; per quest'ultima regione non vi sono segnalazioni neppure in VIEGI (1993).

Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart (Crassulaceae)
(= *Sedum spurium* M. Bieb.)

R e p e r t i. Istria nei pressi di Kostrena Sv. Lucija, in un gerbido adibito a discarica fra le pietre a 282 m s.l.m. [GL-4301].

O s s e r v a z i o n i. Il nome generico *Phedimus* è stato proposto da 't HART nel 1995 per riunire un consistente gruppo di specie, perlopiù asiatiche, scorporate dall'ampio genere *Sedum* L. Negli ultimi anni *P. spurius* è stato segnalato come spontaneizzato in diverse località dell'Italia nord-occidentale (GALLO, 1996). A conoscenza dell'autore vi è anche un campione d'erbario proveniente dalla Slovenia in prossimità del confine croato: "in Matteria [Materija] zona litorale", legit Pospichal, july 1896, Erb. Pospichal (TSM).

Sedum sarmentosum Bunge (Crassulaceae)

R e p e r t i. Istria, dintorni di Ičiči, salita per il tunnel di Učka, su di un muro nei pressi di un giardino (Gallo L. obs. 19-28/08/96); Istria, Mošćenice (Rijeka), su di un muro (Gallo L. obs. 19-28/08/96).

O s s e r v a z i o n i. Non riportata da WEBB (1993) per JU ma il dott. C. Pericin (in litt.) mi comunica che questa specie è riportata in "Flora Croatica/Index Florae Croaticae" come entità coltivata e naturalizzata. Specie ampiamente utilizzata come ornamentale da molto tempo in Europa è stata frequentemente confusa con *S. lineare* Thunb. da cui si distingue principalmente per le foglie lanceolate e carnose piuttosto che lineari e sottili (GALLO, 1996).

Senecio mikanioides Otto ex Walp. (Compositae)(1)

R e p e r t i. Lošinj a Veli Lošinj su di un muretto ombreggiato dietro una chiesetta del paese. [GL-4315].

(1) Gordon Rowley (in litt.) mi comunica che questa specie nel R.H.S. Dictionary of Gardening è denominata *Delairia odorata* Lem.

O s s e r v a z i o n i. CHATERS & WALTERS (1980) la riportano come coltivata per ornamento e naturalizzata nell'Europa meridionale ed occidentale. PIGNATTI (1982) la indica per Liguria, Calabria e Sardegna come "Coltiv. per ornam. ed inselvatichito su vecchi muri pr. il mare".

Manoscritto pervenuto il 22.VI.1999.

Ringraziamenti

Si ringraziano il dott. Claudio Pericin di Basilea (CH) ed il dott. Gordon Rowley di Reading (UK) per le informazioni fornite ed il curatore dell'erbario di TSM per avermi messo a disposizione i campioni d'erbario di cui la ricerca necessitava.

Bibliografia

CHATERS A.O. & WALTERS S.M., 1980 - *Senecio*. In: TUTIN T.G. et al. - Flora europaea. Vol. IV. *Cambridge University Press*: 193.

GALLO L., 1996 - Dati inediti sulla presenza di *Sedum sarmentosum* Bunge e *S. spurium* Bieb. (*Crassulaceae*) in Piemonte e Valle d'Aosta. *Allionia*, 34: 35-38.

HART H. 'T, 1995 - Infrafamilial and generic classification of the Crassulaceae. In: HART 't & EGGLI (Eds.) - Evolution and systematics of the Crassulaceae. *Backhuys Publishers*, Leiden: 159-172.

PIGNATTI S., 1982 - Flora d'Italia. Vol. I e III. *Edagricole*, Bologna.

TUTIN T.G., 1993 - *Aptenia*. In: TUTIN T.G. et al. - Flora europaea - *Psilotaceae* to *Platanaceae*. II° ed., vol. 1, *Cambridge University Press*: 136.

VIEGI L., 1993 - Contributo alla conoscenza della biologia delle infestanti delle colture della Sardegna nord-occidentale. I. Censimento delle specie esotiche della Sardegna. *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 29: 131-234.

WEBB D. A., AKEROYD J. R. & HART H. 'T, 1993 - *Sedum*. In: TUTIN T.G. et al. - Flora europaea - *Psilotaceae* to *Platanaceae*. II° ed., vol.1, *Cambridge University Press*: 431.

Indirizzo dell'Autore - Author's address:
- dott. Lorenzo Gallo
Strada Val San Martino sup. 194, I-10131 TORINO