

GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat.	23 (2001)	137-156	Udine, 31.III.2002	ISSN: 0391-5859
---------------------------------------------	-----------	---------	--------------------	-----------------

E. ZALLOT

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA SPECIE  
*CHARPENTIERIA STENTZII* (ROSSMÄSSLER, 1836)  
 (GASTROPODA PULMONATA; STYLOMMATOPHORA; CLAUSILIIDAE)

*CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF*  
*CHARPENTIERIA STENTZII* (ROSSMÄSSLER, 1836)  
 (GASTROPODA PULMONATA; STYLOMMATOPHORA; CLAUSILIIDAE)

**Riassunto breve** - Nel corso di specifiche indagini malacologiche sono state raccolte nuove forme di *Charpentieria stentzii* (ROSSMÄSSLER, 1836) nel Nord Est italiano. Si può pensare che altre ne potrebbero essere individuate mediante ulteriori puntuali esplorazioni in tutta l'area presa in considerazione dal presente studio. Alcuni Autori considerano tra le varie forme di *Charpentieria stentzii* anche delle sottospecie. In base ai caratteri conchiologici *Ch. stentzii* è una specie politipica, tuttavia da un'analisi biogeografica, in base a considerazioni di tipo geologico e con lo studio delle affinità esistenti tra le diverse forme o sottospecie è stato possibile individuare la presenza di due grandi gruppi di popolazioni che ridurrebbero di conseguenza il numero di sottospecie finora descritte.

**Parole chiave:** *Charpentieria stentzii* (ROSSMÄSSLER, 1836), Sistematica, Distribuzione, Nord Est italiano.

**Abstract** - *New forms of Charpentieria stentzii* (ROSSMÄSSLER, 1836) have been collected in North-eastern Italy. We believe that others may be discovered whether a punctual exploration of the total area will be done. Researchers of *Charpentieria stentzii* considered several forms as subspecies. It is clear that *Charpentieria stentzii* a polytypic specie in conchiological characters, but biogeographical data, geological history and affinities between different forms indicate the presence of two big groups of populations. Consequentially, the number of subspecies can be reduced.

**Key words:** *Charpentieria stentzii* (ROSSMÄSSLER, 1836), Systematics, Distribution, North-eastern Italy.

## Introduzione

Il genere *Charpentieria* (STABILE, 1864) è presente nell'Italia nord-orientale con due specie: *Charpentieria itala* (VON MARTENS, 1824) e *Charpentieria stentzii* (ROSSMÄSSLER, 1836). La sistematica intraspecifica relativa a *C. stentzii*, proposta da NORDSIECK (1963), prevedeva le seguenti sottospecie:

- *Ch. stentzii stentzii*: sottospecie tipica, per la Val di Non e le Dolomiti occidentali;

