

GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat.	24 (2002)	65-74	Udine, 30.IV.2003	ISSN: 0391-5859
---	-----------	-------	-------------------	-----------------

F. SGUAZZIN

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA FLORA BRIOLOGICA DEL LITORALE ALTOADRIATICO E IN PARTICOLARE DELLA PINEDA (LIGNANO SABBIAADORO E BIBIONE) E DELLA PINETA DI VALLE VECCHIA (CAORLE)*

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE ABOUT BRYOLOGICAL FLORA OF NORTHERN ADRIATIC COAST AND IN PARTICULAR OF THE PINEDA (LIGNANO SABBIAADORO AND BIBIONE) AND OF VALLE VECCHIA PINE WOOD (CAORLE)

Riassunto breve - È stata compiuta una ricerca sulla flora briologica delle pinete Pineda (Sinistra e Destra) e di Valle Vecchia, che si trovano lungo il litorale altoadriatico, interessando i territori di Lignano Sabbiadoro, Bibione (S. Michele al Tagliamento) e Caorle. Sono state osservate e raccolte 42 specie e per ognuna è stato indicato il substrato e l'elemento corologico di appartenenza. *Tortella flavovirens* risulta nuova per il Veneto, mentre per 5 altri *taxa* si tratta di conferme di ritrovamenti effettuati prima del 1950: 4 riguardano il Veneto e 1 il Friuli-Venezia Giulia. Le specie temperate appaiono largamente dominanti, mentre si evidenzia una buona presenza di specie submediterranee.

Parole chiave: Briofite, Flora, Pinete, Litorale altoadriatico.

Abstract - *A research has been carried out on the bryological flora of Pineda (Sinistra and Destra) and of Valle Vecchia pine woods, situated along the Northern Adriatic coast [Lignano Sabbiadoro, Bibione (S. Michele al Tagliamento), Caorle]. 42 species have been observed and gathered, and for each of them substratum and chorological element have been indicated. Tortella flavovirens has turned out to be new for Venetia, while 5 of the other taxa confirm the findings prior to 1950: 4 regard Venetia and 1 Friuli-Venetia Julia. Temperate species seem to be largely dominant, while a good presence of submediterranean ones can be found.*

Key words: *Bryophytes, Flora, Pine woods, Northern Adriatic coast.*

Introduzione

Anche se troviamo citazioni di muschi per la fascia lagunare veneziana già in ZANNICHELLI (1730; 1735) e poi, lungo tutto l'Ottocento, in RUCHINGER (1818), VON MARTENS (1824), NACCARI (1828), ZANARDINI (1847), SORMANI MORETTI (1880-81), SACCARDO & BIZZOZERO (1883), i contributi briofloristici, riguardanti nello specifico i litorali sabbiosi,

* L'Autore fa parte del Gruppo di Lavoro per la Briologia della Società Botanica Italiana.

