

GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat.	25 (2003)	325-340	Udine, 30.VI.2004	ISSN: 0391-5859
---	-----------	---------	-------------------	-----------------

L. LAPINI, T. FIORENZA, A. DALL'ASTA

ZOOTOCA VIVIPARA CARNIOLICA MAYER, BÖHME, TIEDEMANN & BISCHOFF, 2000,
SULLE COLLINE MORENICHE DEL FRIULI CENTRALE (ITALIA NORD-ORIENTALE)
(REPTILIA: LACERTIDAE)

ZOOTOCA VIVIPARA CARNIOLICA MAYER, BÖHME, TIEDEMANN & BISCHOFF, 2000,
ON THE MORAINIC HILLS OF CENTRAL FRIULI (NORTH-EASTERN ITALY)
(REPTILIA: LACERTIDAE)

Riassunto breve - La sorprendente scoperta di una popolazione intermorenica di lucertola vivipara (*Zootoca vivipara*) nel Friuli centrale ha stimolato una serie di approfondimenti mirati a valutarne lo status tassonomico e l'importanza conservazionistica. La nuova popolazione appartiene alla forma ovipara *Z. v. carniolica*, che al di sotto dei 600 metri di quota ha una distribuzione molto frammentata di tipo relict. Essa comunque domina in gran parte della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre la forma ovovivipara - affine a quella nominale - sembra essere abbastanza diffusa sulle Alpi Carniche centro-occidentali, vicino al confine con l'Austria e con il Veneto.

Parole Chiave: *Zootoca vivipara carniolica*, Distribuzione, Italia nord-orientale.

Abstract - The discovery of an inter-morainic population of the common lizard (*Zootoca vivipara*) in Central Friuli has stimulated a series of verifies to evaluate its taxonomic status and conservation value. The new population belong to the oviparous form *Z. v. carniolica*, that under 600 metres of altitude shows a very scattered relict distribution. This form, however, dominates in most of Friuli Venezia Giulia, while the viviparous form - similar to the nominal one - seems to be quite common in Central and Western Carnic Alps, near the border with Austria and Veneto.

Key words: *Zootoca vivipara carniolica*, Distribution, North-Eastern Italy.

1. La lucertola vivipara: note tassonomiche e corologiche

Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787) è un *Lacertidae* paleartico distribuito in un enorme areale compreso fra l'Europa occidentale e le coste pacifiche della Russia, esteso almeno sino all'Isola di Sahalin. In Scandinavia e in Siberia l'areale della specie tocca il 70° parallelo di latitudine Nord, mentre verso Sud raggiunge le catene montuose dell'Europa centro-meridionale e dell'Asia centrale, coprendo anche parte della Cina nord-orientale. Nella porzione meridionale dell'areale la specie ha una decisa vocazione montano-alpina e in queste zone la

