Tommaso Campedelli
Enrico Benussi
Gianpiero Calvi
Guglielmo Londi
Severino Vitulano
Simonetta Cutini
Paolo Bonazzi
Lia Buvoli
Jacopo Tonetti
Fabrizio Florit
Guido Tellini Florenzano

ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI NELLA ZPS IT3341002 "AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA"

ATLAS OF THE BREEDING BIRDS IN THE SPA IT3341002
"AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA"

Riassunto breve - In questo lavoro vengono presentati i risultati di quattro anni di censimenti (2010-2013) dell'avifauna nidificante nella ZPS "Aree carsiche della Venezia Giulia". Complessivamente sono state contattate 188 specie, di cui 114 nidificanti (16 quelle di interesse conservazionistico europeo). Oltre alla distribuzione geografica, i dati raccolti hanno permesso di approfondire, per la maggior parte delle specie, anche aspetti legati alla loro ecologia riproduttiva, attraverso l'elaborazione di modelli ecologici ottenuti utilizzando il software MaxEnt, e alle problematiche di conservazione. Per le specie di maggiore interesse le informazioni presentate abbracciano un periodo di tempo molto più lungo e forniscono preziose e talvolta inedite informazioni sull'evoluzione delle popolazioni negli ultimi 30-40 anni.

Parole chiave: ZPS "Aree carsiche della Venezia Giulia", Avifauna nidificante, Carso, Friuli Venezia Giulia, MaxEnt, Atlante degli uccelli nidificanti.

Abstract - *In this work the results of a four years monitoring project of breeding birds (2010-2013) in the "Aree carsiche della Venezia Giulia" SPA are presented. During this period, a total of 188 species were contacted; 114 are considered nesting, of which 16 are of European conservation concern. In addition to the geographical distribution, for the most part of breeding species, the data gathered have allowed to analyse in deep also several aspects related to their breeding ecology, investigated through the development of ecological models using MaxEnt, and conservation issues. For the species of greatest interest, the information presented embraces very long period of time and provides valuable and sometimes unpublished information on the evolution of populations over the last 30-40 years.*

Key words: "Aree carsiche della Venezia Giulia" SPA, Breeding birds, Karst, Friuli Venezia Giulia Region, MaxEnt, Atlas of breeding birds.

Introduzione (GTF)

Sono ormai oltre cinquant'anni che, in Italia e nel resto del mondo, viene studiata e presentata la distribuzione geografica delle specie selvatiche attraverso la produzione di "atlanti". Una parte importante di questi riguarda la distribuzione degli uccelli, in particolare degli uccelli nidificanti. Solitamente i dati sulla distribuzione vengono mostrati attraverso la presenza delle specie entro elementi in genere di forma quadrata, elementi che possono essere di dimensione variabile, sia in base all'estensione del territorio indagato, sia in base all'entità dello sforzo di campionamento. L'atlante del Carso, che qui presentiamo, si basa su una griglia di 234 quadrati di 1 km di lato, poi ridotti a 178 accorpendo le aree marginali, e a questi ultimi si riferiscono le informazioni sulla presenza delle specie nidificanti.

Se i primi atlanti presentavano solo la distribuzione spaziale delle specie, quasi sempre arricchita da informazioni sul livello di accertamento della riproduzione, si è rapidamente compreso che informazioni così numerose e diffuse sul territorio indagato permettono di approfondire molti altri aspetti, se si vuole più "fini", legati alla distribuzione degli uccelli sul territorio. Sono nati così i cosiddetti atlanti di seconda generazione, che riportano una serie importante di informazioni aggiuntive rispetto alla semplice presenza delle specie sul territorio indagato. A questo punto è utile fare una prima grande distinzione, tra gli atlanti prodotti - solo o in maniera preponderante - dall'impegno di volontari, e gli atlanti derivanti in gran parte da un impegno coordinato e professionale. I primi, senz'altro encomiabili e che si possono considerare tra i primi e tuttora più importanti esempi di "citizen science", risentono però in modo negativo del fatto che lo sforzo

di campionamento è assai variabile tra luoghi, per cui risulta difficile stilare oggettive graduatorie tra siti più o meno ricchi di specie, né si possono agevolmente derivare informazioni dirette sull'ecologia delle specie, sebbene esistano metodologie sempre più raffinate per affrontare con successo quest'ultima problematica.

Indubbiamente, si possono trarre molto più agevolmente conclusioni da atlanti "professionali", a patto che questi abbiano rispettato un protocollo uniforme di raccolta dei dati. L'atlante qui presentato appartiene a quest'ultima categoria e la metodologia utilizzata (si veda la parte specifica sui metodi) ha previsto metodi di censimento uniformi e la misura dello sforzo di campionamento per ciascuno dei quadrati indagati.

Gli atlanti di seconda generazione possono presentare sostanzialmente tre livelli di approfondimento. Uno, dato che sono stati spesso prodotti come secondi atlanti a distanza di tempo, riguarda l'analisi delle variazioni avvenute nella distribuzione, corredata ovviamente di approfondimenti sulle cause delle stesse. Un altro tipico livello di approfondimento riguarda l'abbondanza locale delle specie. Non si ritiene cioè più sufficiente definire che una specie nidifica in un particolare quadrato, ma si vuol definire la sua abbondanza, sempre a livello di quadrato. Per ottenere dati utili in questo senso occorre svolgere i rilievi di campagna secondo specifici protocolli, che prevedono una misura dello sforzo di campionamento, l'uso di personale particolarmente specializzato, e l'esecuzione dei rilievi solo in specifiche, ottimali, condizioni meteorologiche e stagionali. Come si potrà vedere, questo atlante ha previsto rilievi standardizzati svolti tenendo conto di queste limitazioni, per cui è corretto confrontare anche l'abbondanza delle specie tra i vari quadrati indagati. Non è possibile, tolti alcuni casi di specie particolarmente rare e localizzate, disporre di valori assoluti di abbondanza, ossia di quanti individui o coppie fossero presenti al momento dei rilievi, ma si possono confrontare quelli che si chiamano indici di abbondanza, tra quadrati diversi. Se in un quadrato abbiamo rilevato dieci maschi cantori di usignolo, in questo quadrato vi erano più usignoli rispetto a un quadrato dove ne abbiamo rilevati solo due. A partire da questi indici è possibile costruire mappe di abbondanza relativa, mappe che a loro volta permettono di evidenziare agevolmente quali sono, per ciascuna specie, le aree geografiche di maggiore interesse.

Il terzo grande campo di approfondimento, sempre sviluppato per approfondire e meglio utilizzare i dati di un atlante, riguarda l'ecologia delle specie. Si tratta cioè di analizzare quali fattori ambientali favoriscono - o sfavoriscono - la presenza delle specie. A partire da informazioni dettagliate sull'uso del suolo, sul clima, e sull'entità dell'impatto antropico, l'atlante qui presentato mostrerà, attraverso l'uso di una modellistica ambientale entrata nell'uso corrente in ecologia animale, quali tra i vari fattori risultano importanti nel determinare pre-

senza ed abbondanza delle specie, fornendo in definitiva elementi per comprendere i perché delle differenze di distribuzione tra specie in aree diverse. Una particolare attenzione è stata data, in questo ambito, all'importanza dei fattori di impatto antropico, tentando di evidenziare prima di tutto quali specie possono risentire in modo negativo dell'impatto stesso. Ovviamente vi sono numerosi casi che mostrano, dall'altra parte, come almeno certe tipologie di impatto antropico - prima tra tutte l'attività agricola - possono determinare proprio queste la presenza e l'abbondanza di una serie importante di specie, legate più o meno strettamente alle attività umane. Basta pensare, in questo senso, che un territorio come il Carso sarebbe privo di passerini, rondini, ma anche tottaville, zigoli neri e gialli e l'elenco potrebbe continuare, se non vi fossero attività agricole, insediamenti rurali e, in una parola, in assenza di qualsiasi attività umana.

Ritornando al primo degli aspetti relativi agli atlanti di seconda generazione, quello del confronto storico tra periodi diversi, va notato da un lato come il Carso non è mai stato interessato da un atlante ornitologico specifico (sono state pubblicate carte di distribuzione sull'avifauna nidificante della provincia di Trieste e della porzione ad Est del Fiume Isonzo di quella di Gorizia in PERCO & UTMAR (1989); l'Inventario Faunistico Regionale Permanente di FELCHER et al. (1991), comprende carte della distribuzione degli uccelli nidificanti, anche se la copertura geografica dei rilevamenti risulta incompleta per alcune aree della regione, per lo più localizzate in pianura; mappe dell'avifauna nidificante della provincia di Gorizia sono pubblicate in PARODI 1999). Formalmente, l'unico atlante ornitologico confrontabile è quello nazionale (1982-1986; MESCHINI & FRUGIS 1993), svolto però a una scala che rende impossibile quasi ogni tipo di confronto. Però il Carso, per la sua conformazione e per la presenza di validi ornitologi locali, ormai da gran tempo operanti sul territorio, non era, prima di questo lavoro, assolutamente tabula rasa di conoscenze ornitologiche. Anzi, è proprio a partire da una serie di confronti sulla distribuzione delle specie, che, assieme alle citate analisi ecologiche, è stato possibile evidenziare una serie di criticità ambientali e quindi una serie di necessità di attenzione e di intervento per far sì che il patrimonio naturale dell'area non si depauperi nel tempo.

Il Carso, ed in particolare le sue aree propriamente carsiche, riveste infatti un notevole interesse naturalistico e in particolare un interesse ornitologico, tanto che il suo territorio è stato designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, da parte dell'Unione Europea. Infatti questo atlante è nato proprio per definire la distribuzione degli uccelli nidificanti in questa ZPS. Le ragioni dell'interesse particolare di questo territorio per l'avifauna sono numerose e tra loro interconnesse. Prima di tutto la posizione di quest'area, che costituisce se si vuole una cerniera tra il mondo balcanico e il resto d'Europa e in particolare l'Italia peninsulare. È per questo

motivo che proprio nel Carso troviamo alcune specie al limite del loro areale, specie che arricchiscono l'ornitofauna di questo estremo lembo d'Italia. Un altro motivo è legato alle condizioni climatiche. Convivono, nel Carso, situazioni schiettamente mediterranee – prova ne sia la presenza di specie vegetali tipiche della macchia – con ambienti decisamente continentali, sebbene si tratti di una striscia di limitata estensione.

Ma questa variabilità climatica è legata anche, e forse soprattutto, alla particolare morfologia dei rilievi. È noto che, in tutto il mondo, aree calcaree caratterizzate da una specifica geomorfologia, soprattutto dalla presenza di quei particolari "crateri", sorta di vallate senza sbocco, chiamati doline, si definiscono "carsiche", ovvero il nome di questa particolare area è divenuto sinonimo di una particolare conformazione geomorfologica. Il clima, anzi il microclima, all'interno delle doline è particolare, al loro interno tende a ristagnare l'aria provocando frequenti fenomeni di inversione termica, per i quali sul fondo delle doline troviamo un clima più freddo e umido rispetto ai versanti. È infatti proprio all'interno delle doline che è possibile rinvenire specie - vegetali, ma anche animali - caratteristiche di aree montane e questo contribuisce ad un deciso incremento nella varietà di specie presenti.

Ma il patrimonio naturale, soprattutto in un paese mediterraneo come l'Italia, dipende molto anche dalla presenza storica e attuale delle attività umane, che hanno fortemente plasmato e seguitano a plasmare il territorio. In questo ambito vanno considerati due fenomeni tra loro apparentemente in contraddizione, che stanno portando a rapide modificazioni e spesso impoverimenti nel patrimonio naturale. Da un lato abbiamo infatti un forte incremento di presenza e impatto antropico legato all'espansione edilizia (residenziale, turistica e industriale) con collegato un incremento nello sviluppo e nell'impatto di infrastrutture quali strade, elettrodoti, ecc. D'altra parte si è registrato, rapidamente negli ultimi decenni, un abbandono delle attività agricole e zootecniche tradizionali, tanto che una delle tipologie ambientali che più caratterizzava il Carso, la "landa", è oggi in fase di rapida scomparsa. Questo ambiente era mantenuto in essere da una significativa presenza di bestiame al pascolo, oggi pressoché scomparso. Ma è anche pressoché scomparsa anche ogni altra forma di attività agricola. Chi scrive ricorda di aver conosciuto il Carso prima di tutto dalle immagini della I Guerra Mondiale, immagini che ritraevano, in moltissimi casi, un territorio quasi privo di vegetazione. Percorrendolo oggi, a cento anni di distanza, pare impossibile che boschi e arbusteti a scotano e altre specie abbiano soppiantato quasi interamente i magri pascoli che definivano gran parte delle doline e del restante territorio. Non si tratta certo di fenomeni isolati e caratteristici del solo Carso, anzi il fenomeno è una delle tendenze più preoccupanti di tutta l'Europa mediterranea. Proprio a tentare di invertire questa tendenza sono orientati gran parte degli

sforzi di conservazione, soprattutto all'interno di aree, come le ZPS, per le quali altre forme di minaccia, come quelle legate all'espansione edilizia, rivestono grazie alla normativa esistente un interesse minore.

Questo atlante vorrebbe ottenere almeno due risultati. Il primo riguarda ovviamente "fare il punto" sulle conoscenze e pertanto sulla situazione dell'avifauna nidificante nel Carso, speriamo di aver svolto in tal senso un lavoro esauriente, che permetta di fissare una serie di acquisizioni ottenute da uno sforzo di ricerca uniforme e - crediamo - sufficiente. L'altro e forse più importante risultato riguarda la speranza che questo lavoro richiami l'attenzione sull'importanza naturalistica del territorio e ancor di più sulle tendenze che ora sono in atto, tendenze che se da un lato possono portare a una situazione migliore, come accade per lo stato di conservazione delle foreste che sempre più paiono ospitare anche specie di notevole interesse, d'altro canto si rivelano assai preoccupanti, con la rapida perdita di habitat per le specie legate alla landa carsica e ai coltivi, entrambe situazioni che caratterizzano fortemente da secoli questi territori, e che sono oggi in fase di rapida scomparsa.

Materiali e metodi (GL, TC, GTF)

Impostazione generale

Il progetto "Atlante degli uccelli nidificanti nella ZPS Aree carsiche della Venezia Giulia" ha avuto una durata di quattro anni (2010-2013) ed è basato su dati originali raccolti sia con differenti metodologie standardizzate, sia cercando in maniera opportunistica le specie negli ambienti e nei momenti più favorevoli al loro rinvenimento.

La grande maggioranza dei dati è stata raccolta con metodi standard, utilizzando quindi protocolli definiti e replicabili. Questo approccio è stato preferito rispetto ai rilevamenti "classici" da atlante (ovvero ricerca opportunistica del maggior numero di specie possibili, senza protocolli o stratificazioni del campione), perché offre due sostanziali vantaggi: 1) la possibilità di confrontare tra loro le unità di rilievo, censite tutte con la stessa metodologia e per ciascuna delle quali si può calcolare lo sforzo di campionamento, e 2) la prospettiva di uno strumento di monitoraggio molto preciso, ripetendo i rilievi in tempi successivi, con la stessa metodologia. Sono pertanto state definite due metodologie standard, una per gli uccelli diurni e una per gli uccelli notturni.

Naturalmente vi sono molte specie che, con i soli rilievi standardizzati, potrebbero essere sottostimate, o addirittura non rilevate, pertanto sono state effettuate specifiche ricerche con l'obiettivo di definire la distribuzione degli uccelli più rari e localizzati o di quelli più elusivi. Queste ricerche sono state pianificate sfruttando le conoscenze pregresse, in alcuni casi anche molto dettagliate (vedi bibliografia), le osservazioni fatte nell'area

al di fuori del progetto (anche se a questo contemporaneamente) e rese pubbliche (tramite il portale ornitho.it), i dati progressivamente raccolti nel corso del progetto e specificatamente analizzati (mediante la costruzione di modelli e la definizione dell'idoneità ambientale sulla base delle osservazioni dei primi anni). Il progetto è stato inoltre aperto a quanti abbiano voluto partecipare fornendo i propri dati raccolti nell'area e nel periodo compresi nel progetto stesso. Gli autori dei singoli capitoli sono indicati fra parentesi con le relative sigle.

Unità di riferimento e piano di campionamento

Le unità di riferimento inizialmente scelte sono quadrati di 1×1 km appoggiati sulla griglia UTM (*European Datum 1950*; Fig. 1).

Utilizzando griglie a maglie regolari per studi distributivi tipo "atlante" si pone il problema di trattare gli elementi marginali, quelli cioè che hanno al loro interno soltanto una superficie ridotta dell'area di studio. In questi quadrati la superficie effettiva di censimento è inferiore a quella di un quadrato "pieno" e, se questa è molto inferiore, si costituiscono unità di campionamento non omogenee, dove, ad esempio, la maggiore o minore ricchezza specifica, è essenzialmente funzione della superficie piuttosto che delle caratteristiche ambientali dell'area. Il problema è spesso risolto scegliendo le sole unità di riferimento che contengano una superficie minima, normalmente il 50% o il 40%, ed escludendo

tutte le altre. In questo modo si ottengono però risultati parziali, e soprattutto si corre il rischio di errori sistematici: risultano ad esempio eliminate molte delle aree di confine che possono coincidere con elementi geografici peculiari (ad esempio fiumi o crinali). Nel caso specifico, data la forma allungata e molto frastagliata della ZPS, un simile approccio avrebbe peraltro portato ad escludere una porzione significativa dell'area di studio.

Si è pertanto proceduto in maniera differente, mantenendo "interi" tutti gli elementi di 1×1 km di lato con almeno il 40% di superficie di ZPS e accorpando invece quelli che avevano una superficie minore (unendo due o più quadrati fino a raggiungere la soglia oppure unendo un quadrato con superficie ridotta a uno adiacente). Abbiamo scartato solo gli elementi effettivamente marginali (meno dell'1% di superficie di ZPS) ma considerato come aree da campionare anche piccole zone non incluse nella ZPS ma circondate in tutto o in gran parte dalla ZPS stessa (che costituiscono una sorta di "enclave"), in quanto funzionalmente connesse all'area protetta.

Negli accorpamenti si è inoltre tenuto conto della similarità tra i diversi elementi raggruppandoli in base alle caratteristiche ambientali. Utilizzando la carta dell'uso del suolo della Regione Friuli Venezia Giulia si è calcolata la percentuale di copertura di: 1) ambienti antropizzati (tutte le categorie 1 del Corine), 2) ambienti agricoli (tutte le categorie 2.2 e 2.3); 3) mosaici ambientali (categorie 2.4); 4) pascoli (categoria 3.2.1); 5) vegetazione arbustiva (categorie 3.2.2 e 3.2.4); 6) rocce e vegetazione

Fig. 1 - Elementi della griglia UTM (*European Datum 1950*) 1×1 km interessati dalla ZPS Aree carsiche della Venezia Giulia - UTM (*European Datum 1950*) 1×1 km square grid of ZPS Aree carsiche della Venezia Giulia.

rada (categorie 3.3.2 e 3.3.3); 7) boschi di latifoglie (categoria 3.1.1); 8) boschi di conifere (categoria 3.1.2); 9) boschi misti (3.1.3), 10) dune e spiagge (categoria 3.3.1). Sulla base dei valori così calcolati, abbiamo condotto una cluster analysis (metodo di raggruppamento: beta flessibile con $\beta = 0.25$, misura della distanza: relativo di Sorensen). La cluster analysis fornisce una serie di possibili risultati, ovvero di suddivisione degli elementi in gruppi tra loro più o meno simili; la scelta del numero ideale di gruppi è stata fatta in maniera oggettiva applicando il metodo dell'Indicator Value (IV; DUFRENE & LEGENDRE 1997). L'IV è una statistica, calcolata per ciascuna categoria (in questo caso la tipologia di uso del suolo) all'interno di ciascun gruppo (in questo caso il raggruppamento individuato dalla cluster analysis), e può essere definita come una misura della specificità di una particolare categoria, nel caratterizzare un gruppo rispetto a tutti gli altri. L'IV tiene conto della fedeltà (quanto una categoria è diffusa nel gruppo che si sta considerando), che è misurata dalla frequenza relativa (ovvero dal rapporto tra il numero di unità in cui la categoria è presente e il numero complessivo delle unità stesse nel gruppo), sia della sua specificità (quanto una categoria è esclusiva di un determinato gruppo) che è misurata dal rapporto tra il numero di unità in cui la categoria è presente all'interno del gruppo e il numero totale di unità in cui la stessa categoria è presente). Il prodotto di specificità e fedeltà moltiplicato per 100 produce l'IV (il valore 100 è attribuito all'indicatore perfetto, cioè la categoria presente in tutte le unità di un gruppo e solo in quelle). Secondo quanto previsto da questo metodo, il numero ideale di raggruppamenti è quello cui è associato il maggior numero di categorie con IV significativo, cioè significativamente diverse tra gruppi, e il valore di medio di p , che esprime la significatività di queste differenze, minore (più il valore di p è piccolo, più è robusta la differenza tra due o più gruppi).

I gruppi così individuati sono quattro e corrispondono, grosso modo: alle aree più antropizzate intendendo

sia quelle abitate sia quelle coltivate in varia forma (Gruppo 1), agli arbusteti (Gruppo 2), ai boschi di latifoglie (Gruppo 3) e ai boschi di conifere (Gruppo 4); in quest'ultimo gruppo ricadono anche i pochi quadrati con superfici, comunque in genere limitate, di boschi misti e di pascoli (Tab. I).

Sulla base di questi risultati ottenuti si è proceduto agli accorpamenti (cfr. *supra*), unendo ove possibile i quadrati 1×1 km appartenenti allo stesso gruppo; dove non è stato possibile, non essendovi quadrati adiacenti dello stesso gruppo, il quadrato di superficie ridotta è stato accorpato al quadrato adiacente scegliendolo tra quelli appartenenti al gruppo più rappresentato. Le unità di campionamento così ottenute sono 178 (Fig. 2).

Per la programmazione dei rilievi, le unità di campionamento sono state suddivise in due gruppi di censimento (A e B), prima raggruppando 3-4 singole unità di campionamento vicine in "macro-unità", in cui il censimento potesse essere effettuato indicativamente da un rilevatore in una giornata, in modo da ridurre, anche in base a considerazioni logistiche, la dispersione dei rilievi, poi attribuendo ciascuna macro-unità, tramite sorteggio, al gruppo di censimento A o al gruppo di censimento B (Fig. 3). Le unità di ciascun gruppo sono state visitate ad anni alterni nel periodo febbraio-aprile o in quello compreso tra maggio e agosto (lo schema si è applicato ai rilievi standardizzati per gli uccelli diurni; le ricerche mirate alle singole specie sono state comunque condotte, per quanto possibile, nei momenti di maggiore contattabilità di ciascuna di queste). L'appartenenza ai raggruppamenti ambientali delle unità di campionamento (Tab. II), è stata utilizzata per verificare che la ripartizione nei gruppi A e B risultasse bilanciata rispetto alle tipologie ambientali presenti in modo da evitare che un determinato ambiente, ricadendo in prevalenza in uno solo dei due gruppi, fosse di fatto campionato soltanto in un periodo dell'anno, introducendo un possibile errore sistematico.

		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	p
1	Ambienti antropizzati	69	6	4	10	0.001
2	Ambienti agricoli	51	1	7	6	0.001
3	Mosaici ambientali	51	1	5	5	0.001
4	Pascoli	2	0	2	29	0.002
5	Vegetazione arbustiva	0	84	2	4	0.001
6	Rocce e vegetazione rada	0	0	0	8	0.042
7	Boschi di latifoglie	3	2	66	23	0.001
8	Boschi misti	3	1	0	12	0.050
9	Boschi di conifere	0	11	4	68	0.001
10	Dune e spiagge	15	0	0	0	0.003

Tab. I - Valori di IV delle tipologie ambientali nei quattro raggruppamenti di quadrati 1×1 km costruiti in base alle somiglianze di uso del suolo. - IV (Indicator Value) of land use types in the four "environmental groups" of grid cells.

	Gruppo 1 Antropizzato	Gruppo 2 Arbusteti	Gruppo 3 Boschi latifoglie	Gruppo 4 Boschi conifere	Totale
Gruppo A	8	9	61	10	88
Gruppo B	8	6	60	16	90
Totale	16	15	121	26	178

Tab. II - Ripartizione delle unità di campionamento nei gruppi relativi alle tipologie ambientali (gruppi 1-4) e alle tempistiche di campionamento (gruppi A e B). - Number of sampling units in sampling (A and B) and environmental groups (1-4).

Raccolta dati

Le metodologie standard applicate sono due: una per gli uccelli diurni e una per quelli notturni.

Per gli uccelli diurni, sono stati individuati transetti lineari da percorrere a piedi, utilizzando di preferenza la sentieristica e la rete viaria secondaria, distribuiti in modo che tutte le tipologie ambientali presenti nelle diverse unità risultassero adeguatamente campionate. Ogni percorso è stato suddiviso in tratti di 200 metri, georiferiti mediante GPS; in ciascun tratto sono state registrate tutte le specie di uccelli osservate o udite (senza limiti di distanza). I percorsi non sono rimasti fissi tutti gli anni ma sono stati stabiliti in modo che comunque, ogni unità di campionamento fosse percorsa ogni anno in maniera esaustiva (coprendo cioè tutti gli ambienti presenti) nel periodo previsto dal piano di campionamento. Nel 2010 e 2012, le unità del gruppo A sono state visitate tra febbraio e aprile, quelle del gruppo B da maggio ad agosto; negli anni 2011 e 2013 l'ordine è stato invertito.

Per quanto riguarda gli uccelli notturni, sono state effettuate stazioni di ascolto con l'ausilio del playback, tecnica particolarmente efficace ed efficiente per questo gruppo di uccelli (JOHNSON et al. 1981). Il metodo consiste nello stimolare la risposta della specie che si vuole censire simulando, mediante la riproduzione del canto con un registratore, la presenza di un altro soggetto. Rispetto ad altre tecniche di censimento, come ad esempio il semplice ascolto delle vocalizzazioni emesse spontaneamente, il playback ha il vantaggio di poter impiegare un numero limitato di rilevatori e di censire

vaste superfici, anche molto eterogenee da un punto di vista ambientale. I censimenti sono stati effettuati indicativamente dalle ore 18:00 alle ore 03:00, utilizzando punti di emissione/ascolto posti ad una distanza non inferiore a 500 metri l'uno dall'altro. Lo schema adottato ha previsto 1' di ascolto/1' di stimolazione/1' di ascolto; se non si sono ottenute risposte, si è proceduto ad una nuova stimolazione secondo lo stesso schema. Considerando che la parte triestina dell'area di studio è da diversi anni oggetto di uno specifico monitoraggio degli uccelli notturni nidificanti (BENUSSI 2008), abbiamo ritenuto opportuno concentrare i rilievi nelle aree non coperte dalle attività di cui sopra, sostanzialmente tutta la parte goriziana della ZPS, procedendo per le aree già ben conosciute alla conferma delle informazioni già disponibili e approfondire alcuni aspetti della biologia riproduttiva delle specie di maggiore interesse, come il gufo reale.

Oltre a questi dati provenienti da censimenti di tipo standard, sono confluiti nel database anche numerosi altri dati derivanti da osservazioni condotte senza seguire particolari protocolli. Si tratta di dati raccolti in maniera "opportunistica" cercando di massimizzare l'efficienza della ricerca per le specie rare o particolarmente elusive, con l'obiettivo di precisarne la distribuzione. I criteri seguiti sono stati in sintesi: 1) visite ripetute ad ambienti localizzati (ad es. pareti rocciose, ambienti umidi, Torrente Rosandra) o particolarmente importanti (ad esempio i lembi residui di landa), 2) ricerca attiva dei rapaci sulla base anche delle conoscenze pregresse, 3) ricerca delle specie sulla base delle carte di idoneità "provvisorie" elaborate nel corso dei primi anni del lavoro, 4) verifica

Fig. 2 - Unità di campionamento suddivise nei quattro gruppi ottenuti in base alle similarità ambientali
- *Sampling units splitted in four "environmental groups" obtained on the basis of environmental similarity.*

Fig. 3 - Unità di campionamento suddivise nei due gruppi di censimento.
- *Sampling units splitted in the two sampling groups.*

delle informazioni raccolte nell'area al di fuori del progetto e rese pubbliche (sul portale ornitho.it).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, a tutti coloro che avevano informazioni raccolte nell'area utili al progetto è stato proposto di partecipare conferendo i dati; in caso di risposta positiva i dati sono stati inclusi nel database col nome del rilevatore e trattati alla stregua di tutti gli altri; i dati per i quali non abbiamo ricevuto specifico assenso, sono stati trattati come fonti esterne al progetto e citati secondo le regole di ornitho.it (http://www.ornitho.it/index.php?m_id=22&item=3).

Analisi dei dati e modelli ecologici

Lo studio delle preferenze ambientali rappresenta, all'interno di un atlante, uno strumento conoscitivo che integra le cartine di distribuzione delle specie. Oltre a individuare i fattori ambientali che caratterizzano le aree di presenza, attraverso le analisi delle preferenze ambientali, è possibile produrre delle carte di idoneità ambientale che rappresentano la distribuzione potenziale delle specie e che, soprattutto per quelle più rare, possono essere utili anche per individuare ambiti di presenza prima sconosciuti, o quantomeno aree dove concentrare le ricerche. I risultati delle analisi delle preferenze ambientali sono inoltre particolarmente utili per definire le politiche di conservazione, poiché da un lato definiscono le caratteristiche che rendono un territorio idoneo alla presenza di una specie, indicando gli elementi che è necessario conservare, e dall'altro individuano direttamente le aree maggiormente idonee, che potrebbero

essere utilizzate ad esempio per individuare nuove aree protette o zone da escludere da piani di sviluppo.

Le preferenze ecologiche delle specie sono state analizzate utilizzando i modelli a massima entropia, calcolati mediante il software MaxEnt (PHILLIPS et al. 2006; PHILLIPS & DUDÍK 2008). Il metodo, individua appunto la distribuzione potenziale della specie che, tenendo conto della natura dei fattori ambientali che caratterizzano sia i punti di presenza sia l'intera area di studio (background), si avvicina maggiormente ad una distribuzione uniforme, cioè quella appunto a massima entropia. I metodi che impiegano dati di sola presenza (ELITH et al. 2006) permettono di ovviare al problema di verificare la reale assenza di una specie che, ad eccezione di alcuni casi, è generalmente difficile da accertare. Molti autori hanno evidenziato come analisi condotte su dati di presenza-assenza possano portare ad una erronea valutazione dei parametri ambientali che influiscono sulla distribuzione di una specie (MOILANEN 2002; GU & SWIHART 2004) in particolare quando si ha a che fare con specie rare o molto elusive che, soprattutto nel primo caso, rappresentano spesso quelle di maggiore interesse nel campo della biologia della conservazione (KERR et al. 2000). MaxEnt permette di analizzare relazioni di differente tipo tra presenza della specie e variabili ambientali ed inoltre, tra i vari metodi che utilizzano solo dati di presenza, ha il vantaggio di elaborare modelli efficaci anche con campioni di numerosità limitata e di fornire risultati meno influenzati da un ineguale livello di campionamento (ELITH et al. 2006). Rispetto a quest'ultimo punto è quindi possibile

tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>
cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	merlo	<i>Turdus merula</i>
germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>
falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	tordela	<i>Turdus viscivorus</i>
astore	<i>Accipiter gentilis</i>	usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>
sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
poiana	<i>Buteo buteo</i>	cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>
falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>
fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>
gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>
folaga	<i>Fulica atra</i>	capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>
colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>
tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>
tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>
cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>
barbagianni	<i>Tyto alba</i>	cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>
assiolo	<i>Otus scops</i>	cincia mora	<i>Periparus ater</i>
gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>
civetta	<i>Athene noctua</i>	cinciallegra	<i>Parus major</i>
alocco	<i>Strix aluco</i>	picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>
gufo comune	<i>Asio otus</i>	rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>
succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>
rondone comune	<i>Apus apus</i>	averla piccola	<i>Lanius collurio</i>
rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>
upupa	<i>Upupa epops</i>	gazza	<i>Pica pica</i>
torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	taccola	<i>Corvus monedula</i>
picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>
picchio verde	<i>Picus viridis</i>	corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>
picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	storno	<i>Sturnus vulgaris</i>
picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>
picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>
tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	passera mattugia	<i>Passer montanus</i>
allodola	<i>Alauda arvensis</i>	fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>
rondine	<i>Hirundo rustica</i>	verzellino	<i>Serinus serinus</i>
balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	verdone	<i>Carduelis chloris</i>
calandro	<i>Anthus campestris</i>	cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>
ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	fanello	<i>Carduelis cannabina</i>
ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	crociere	<i>Loxia curvirostra</i>
pettirosso	<i>Erethacus rubecula</i>	frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>
codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	zigolo nero	<i>Emberiza cirulus</i>
codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>
saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>

Tab. III- Elenco delle specie per le quali sono stati elaborati i modelli ecologici
- List of the species for which ecological models have been calculated.

utilizzare anche dati raccolti anche al di fuori di censimenti standardizzati (dati integrativi), che, soprattutto per specie rare appunto, e in particolare nell'ambito dei progetti atlante, costituiscono una parte non secondaria, almeno per importanza, del numero complessivo di osservazioni.

Sebbene MaxEnt risulti utile ed efficace anche in casi in cui il numero di osservazioni è limitato, la qualità dei risultati è comunque influenzata dal numero di dati utilizzati. A seguito di alcune prove, abbiamo pertanto escluso dalle analisi le specie con un numero di osservazioni inferiore a 10 (non considerando ovviamente le osservazioni riferibili a individui in migrazione o comunque a soggetti censiti al di fuori del periodo riproduttivo). Sono state altresì escluse le specie per le quali le localizzazioni sono risultate concentrate in pochissime unità di campionamento. In totale sono

stati elaborati modelli di idoneità ambientale per 87 specie (Tab. III).

L'analisi delle preferenze ecologiche prevede di testare l'effetto che alcuni parametri ambientali, descrittivi dell'area in cui si è condotto lo studio, hanno sulla presenza delle diverse specie. La scelta dei parametri ambientali da testare è stata fatta sia in funzione delle banche dati disponibili sia dell'interesse che questi, o meglio il loro effetto sulla presenza delle specie, poteva avere anche a livello di definizione di politiche di gestione e tutela. In Tab. IV è riportato l'elenco dei parametri utilizzati. A seconda della loro natura, queste variabili sono state misurate, e quindi associate al dato di presenza ornitologico, a livello puntiforme, ovvero interrogando in ambiente GIS il valore della variabile in corrispondenza del dato di presenza della specie (ad esempio la distanza dagli edifici, dalle strade o dalla

linea di costa), oppure a livello areale (ad esempio per l'uso del suolo). In questo caso il valore della variabile è espresso come percentuale di superficie occupata in un intorno circolare di raggio di 250 metri o 500 metri. Questi intorni, oltre ad essere utilizzati per valutare le caratteristiche dell'ambiente in cui la specie è stata osservata, rappresentano una stima dell'errore spaziale nella localizzazione delle varie specie; il primo, quello di dimensioni minori, è stato utilizzato per quasi tutte le specie di passeriformi, escluse quelle udibili a maggiori distanze, come l'allodola, per le quali invece, come anche per le specie di maggiori dimensioni, è stata utilizzato l'intorno di maggiore estensione.

Oltre a variabili di uso del suolo, come ad esempio la copertura in ambienti forestali o zone umide, abbiamo calcolato una serie di parametri che descrivono più in dettaglio l'antropizzazione del territorio e il grado di diversità dell'ambiente. Nel primo caso, oltre alla superficie occupata dagli ambienti urbanizzati (edificato), abbiamo calcolato anche la distanza dagli edifici, in modo da poter avere anche una stima dell'effetto indiretto, ovvero di disturbo, prodotto dagli ambienti urbanizzati. Sono state calcolate tre diversi tipi di distanze: la distanza dai singoli edifici e quella dai centri abitati, distinguendo quelli di piccole-medie dimensioni (*dist_100edifici*) da quelli più grandi (*dist_500edifici*). In questo modo è stato possibile valutare un effetto diverso in funzione del tasso di urbanizzazione del territorio.

Per quanto riguarda invece la diversità ambientale, oltre alla diversità di uso del suolo, espressa come indice di Shannon, abbiamo calcolato l'estensione dei margini forestali e la deviazione standard dell'altitudine; quest'ultima può essere considerata una misura della variabilità morfologica del territorio. Infine, poiché i rilievi sono durati quattro anni e hanno coinvolto un numero piuttosto elevato di rilevatori (otto), abbiamo ritenuto opportuno tenere conto oltre che della data, anche dell'anno in cui i rilievi sono stati effettuati e del rilevatore che li ha eseguiti.

Al fine di ridurre al minimo i possibili effetti legati alla correlazione tra variabili, è stata effettuata un'analisi preliminare di correlazione di Spearman: le uniche variabili correlate tra loro in modo significativo e importante (soglia 0.8) sono i due descrittori delle doline (*dol_S* e *dol_V*) e i due parametri che misurano la distanza dalle strade (*dist_strade* e *dist_strade pesata*). Invece di eliminare a priori una delle due variabili, si è preferito, di volta in volta, valutare quale delle due avesse un effetto più importante e contribuisse maggiormente a migliorare il modello. La selezione delle variabili, ovvero la costruzione del modello, è stata fatta in base a: 1) i risultati del Jackknife test, che permette di valutare l'effetto di ciascuna variabile confrontando l'efficienza del modello con e senza la variabile stessa; 2) l'entità del contributo percentuale di ciascuna variabile, eliminando quelle con contributo nullo o comunque irrisorio e 3) il

grado di variabilità nell'entità dell'effetto di ciascun parametro, variabilità calcolata mediante la realizzazione di un certo numero di repliche del modello (in questo caso 10), ciascuna effettuata utilizzando un subset diverso di dati (crossvalidation, ELITH et al. 2011). In quest'ultimo caso parametri che mostrano una variabilità del proprio effetto molto ampia sono da considerarsi meno informative (Fig. 4). L'efficienza del modello è stata valutata mediante il valore AUC della curva ROC.

Un aspetto estremamente importante quando si lavora con MaxEnt è la scelta del background, cioè l'insieme di punti che il software utilizza come termine di paragone con i punti in cui la presenza della specie è stata accertata. La configurazione spaziale del background influenza in maniera importante l'esito delle analisi e deve essere quindi selezionato con grande attenzione, in particolare tenendo conto delle differenze di campionamento tra settori dell'area di studio (sampling bias). Tra i diversi modi con cui è possibile individuare il background, noi abbiamo scelto quello che prevede di utilizzare tutti i punti effettivamente campionati, ovvero, nel nostro caso, tutti i centroidi degli spezzoni di 200 metri in cui sono suddivisi i transetti standard (cfr. Metodologia di censimento); rispetto agli altri possibili, questo criterio di scelta sembra migliorare effettivamente la qualità dei modelli che si ottengono (ELITH et al. 2011; MEROW et al. 2013).

parametro	descrizione
ambienti aperti	superficie occupata da landa, arbusteti e prati-pascolo
ambienti agricoli	superficie occupata da ambienti agricoli
ambienti forestali	
bosco	superficie occupata dal bosco
pinete	percentuale di pinete sulla superficie forestale
zone umide	superficie occupata dalle zone umide
antropizzazione	
edificato	superficie occupata dagli ambienti urbanizzati
<i>dist_strade</i>	distanza dalle strade
<i>dist_strade pesata</i>	distanza dalle strade pesate in funzione della loro importanza
<i>dist_edifici</i>	distanza dai singoli edifici
<i>dist_100edifici</i>	distanza dai 100 edifici più vicini
<i>dist_500edifici</i>	distanza dai 500 edifici più vicini
esposizione/clima	
<i>esp_N</i>	numero di pixel (celle 20 m ²) esposti a nord
<i>esp_S</i>	numero di pixel (celle 20 m ²) esposti a sud
linea costa	distanza dalla linea di costa
diversità ambientale	
margini	estensione dei margini forestali
<i>H_suolo</i>	diversità dell'uso del suolo
<i>dol_S</i>	superficie occupata dalle doline
<i>dol_V</i>	volume complessivo delle doline
<i>ds_alt</i>	deviazione standard dell'altitudine
altre variabili	
anno	anno in cui sono stati fatti i rilievi
data	giorno dell'anno in cui sono stati fatti i rilievi
rilevatore	

Tab. IV- Parametri utilizzati nella costruzione dei modelli
- *Environmental variables used in the ecological models.*

Risultati generali (GL)

Nel complesso i dati raccolti sono oltre 50.000, dei quali oltre 40.000 relativi a nidificazioni almeno possibili. Le specie contattate nel corso dell'indagine sono 188; di queste 114 sono nidificanti mentre per due specie, fiorrancino e stiacchino, sono stati raccolti indizi di nidificazione che comunque meritano conferma (Tab. V).

Per nove specie (in ordine di abbondanza fringuello, merlo, capinera, cinciallegra, lù piccolo, usignolo, pettirosso, cinciarella, ghiandaia) il numero complessivo di dati supera i mille contatti e per cinque di queste, merlo, fringuello, capinera, cinciallegra, usignolo, lù piccolo, cinciarella) anche i soli contatti relativi alla nidificazione superano il migliaio. Da rilevare l'elevatissimo numero di contatti con specie come il picchio rosso maggiore (oltre 900 di cui 771 relativi alla nidificazione) e soprattutto frosone (anchesso oltre 900 di cui 585 relativi alla nidificazione) e zigolo muciatto (quasi 700 di cui 616 relativi alla nidificazione) che, sebbene non siano complessivamente specie rare, si trovano normalmente, in altre parti d'Italia, con frequenze relative molto più basse.

Il pattern di distribuzione della ricchezza mette in evidenza valori generalmente più alti nella parte settentrionale mentre in quella centrale e meridionale i valori più elevati riguardano aree più localizzate (Fig 5). In

generale la maggiore ricchezza è riconducibile ad una maggiore varietà di habitat e/o alla presenza di habitat particolarmente importanti. Nella parte più settentrionale i valori elevati sono determinati soprattutto dalle aree ancora relativamente ampie di landa e dalle zone umide, in particolare la Foce del Timavo e il Lago di Doberdò; nella parte centrale e meridionale le aree con maggiore ricchezza risultano alcune maglie tra Opicina e Basovizza (delle quali una è quella che coincide con la landa di Banne) o lungo il confine sloveno (dove sono concentrati i boschi più belli) e con la Val Rosandra.

Le specie di interesse per la conservazione (sensu Dir. 79/409/CEE e successive modifiche) riscontrate nell'indagine sono complessivamente 31 di cui però solo 16 nidificanti (tarabusino, falco pecchiaiolo, falco di palude, falco pellegrino, re di quaglie, cavaliere d'Italia, sterna comune, fraticello, gufo reale, succiacapre, martin pescatore, picchio cenerino, picchio nero, tottavilla, calandro, averla piccola).

Il pattern della ricchezza delle specie di interesse per la conservazione è praticamente identico a quello della ricchezza generale (Fig. 6), evidenziando (anche se ovviamente con maggiore nettezza) in pratica le stesse maglie che corrispondono agli ambienti di landa, alle zone umide, alle pareti rocciose e al torrente della Val Rosandra, ad alcune aree agricole tradizionali attorno a Basovizza, ai boschi dei Monti Orsaro e Lanaro. Questo risultato evidenzia in maniera netta la grande importanza di tutte queste tipologie ambientali e delle aree dove sono meglio conservate. Risulta anche evidente come l'intera comunità ornitica possa essere un valido indicatore per queste aree di grande pregio che non solo ospitano le specie di maggior interesse conservazionistico, ma una comunità di uccelli complessivamente più ricca e differenziata.

Fig. 4 - Esempi di parametri i cui effetti mostrano range di variabilità differenti; il parametro in basso non è evidentemente informativo, quindi è stato scartato
- Examples of variables effect in ecological models: the variable below is not informative, hence it has been discarded.

Introduzione alle schede monografiche

Per tutte le specie nidificanti riscontrate nell'indagine sono presentate due cartine. La prima cartina rappresenta la distribuzione nelle unità di campionamento per ciascuna delle quali è indicato il grado massimo di accertamento della nidificazione (possibile, probabile, certa). La seconda cartina rappresenta, invece, la distribuzione dei dati reali e include, quindi, tutte le osservazioni della specie effettuate nel periodo di nidificazione.

Per le specie con un numero di dati sufficienti, in appendice alle schede monografiche (pagg. 168-174) è stata inoltre elaborata una cartina con l'abbondanza. Per questa carta si sono utilizzati i soli dati raccolti con i rilevamenti standard, relativi a individui nidificanti e il dato è espresso come individui/km di transetto per ciascuna unità di campionamento.

Sempre per le specie con un numero sufficiente di dati, per le quali è stato possibile condurre le analisi e costruire i modelli per le preferenze ambientali, è ri-

Fig. 5 - Carta della ricchezza specifica complessiva.
- *Map of species richness.*

Fig. 6 - Carta della ricchezza specifica considerando le sole specie di interesse conservazionistico (sensu Dir. 2009/147/CE).
- *Map of species richness, considering only species of conservation concern (sensu Dir. 2009/147/EC).*

portata, sempre in appendice (pagg. 175-182), anche la cartina con la rappresentazione del modello stesso (con colore di intensità crescente al crescere dell'idoneità).

Per le stesse specie nelle schede sono anche riportate le preferenze ambientali, sintetizzate in un grafico a barre. Nel grafico ogni fattore ambientale è rappresentato da una barra di lunghezza proporzionale all'importanza del

fattore stesso nel modello (e quindi nell'ecologia della specie). La barra si trova nella parte destra del grafico ed è di colore verde se il fattore ha effetto positivo, si trova nella parte sinistra e ha colore rosso se ha effetto negativo. Per quanto riguarda i fattori esposizione/clima che, per come sono costruite le variabili, non possono avere effetto negativo, la barra è di colore grigio.

specie		contatti totali	contatti nidific.	specie		contatti totali	contatti nidific.
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	7478	5317	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	83	75
Merlo	<i>Turdus merula</i>	6316	5957	Folaga	<i>Fulica atra</i>	79	58
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	5627	4376	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	72	59
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	4362	3970	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	60	58
Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	2295	1258	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	57	42
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1594	1498	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans albistriata</i>	56	41
Pettirosso	<i>Eritacus rubecula</i>	1391	534	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	48	46
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1336	1133	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	47	3
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	1269	825	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	46	45
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	923	585	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	46	46
Passera spp.	<i>Passer domesticus/italiae</i>	921	*	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	44	44
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	917	852	Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	40	36
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	911	771	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	39	25
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	773	315	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	39	7
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	686	616	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	39	39
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	623	608	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	38	21
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	567	499	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	38	38
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	563	363	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	37	36
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	542	438	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	35	32
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	450	443	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	35	2
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	441	371	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	34	34
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	439	321	Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	33	14
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	405	405	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	32	29
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	401	352	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	32	32
Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	394	351	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	31	30
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	391	380	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	29	28
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	382	380	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	28	27
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	382	283	Passera d'italia	<i>Passer italiae</i>	27	27
Gazza	<i>Pica pica</i>	334	281	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	23	23
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	309	291	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	23	20
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	308	304	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	22	22
Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	303	303	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	20	5
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	300	4	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	20	4
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	300	269	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	19	12
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	274	273	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	18	18
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	242	234	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	17	17
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	215	187	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	16	1
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	210	173	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	14	10
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	209	125	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	13	1
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	188	174	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	12	8
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	183	164	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	10	1
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	165	151	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	10	7
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	161	150	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	10	3
Allocco	<i>Strix aluco</i>	159	159	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	9	3
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	139	129	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	8	1
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	136	121	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	8	4
Assiolo	<i>Otus scops</i>	134	124	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	7	1
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	128	127	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	7	7
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	127	125	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	6	6
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	120	86	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	6	4
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	118	72	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	5	5
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	118	117	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	5	2
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	118	110	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	5	2
Upupa	<i>Upupa epops</i>	116	64	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	5	1
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	98	97	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	5	5
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	98	90	Sterpazzolina sp.	<i>Sylvia cantillans/subalpina</i>	5	*
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	97	92	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	4	1
Civetta	<i>Athene noctua</i>	94	94	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	2	1
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	84	24	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	1	1

Tab. V - Numero di contatti totali e ascrivibili a individui nidificanti rilevati nel corso del progetto (*: dato non valutabile).

- Number of observations, total and related only to breeding individuals for each species sampled in the project (*: unverifiable data).

Per comodità di lettura, diversi fattori relativi ad un solo ambito (ad esempio tutti quelli relativi all'antropizzazione o tutti quelli relativi alla diversità ambientale), sono rappresentati con un'unica barra; in questi casi la lunghezza della barra è proporzionale all'importanza complessiva di tutti i fattori del gruppo e il segno, positivo o negativo, è determinato dall'effetto prevalente. Anche nel caso in cui l'effetto della variabile non sia lineare ma di tipo quadratico o con delle soglie, il segno

è determinato dall'effetto prevalente. I dettagli degli effetti dei diversi fattori sono, ove necessario, spiegati e approfonditi nel testo.

Nel breve testo di commento sono citati esplicitamente i soli riferimenti bibliografici relativi a lavori specifici riguardanti l'area di studio o alle zone vicine, mentre sono in genere omesse le citazioni relative agli aspetti più generali di ecologia e di distribuzione delle specie.

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

Nidificante sedentario, presente tutto l'anno; durante l'inverno ai contingenti locali si aggiungono individui provenienti dalle regioni del Nord e dell'Est Europa. Specie legata alle zone umide, il tuffetto è risultato distribuito in modo regolare in tutti gli ambienti idonei, con il maggior numero di osservazioni provenienti dalle Foci del Timavo e zone limitrofe. La presenza della specie è stata comunque accertata anche per i laghi di Pietrarossa e Doberdò, e per le piccole zone umide artificiali delle Mucille. La situazione non è cambiata rispetto a 20-30 anni fa, quando sia BENUSSI (1983) per la parte triestina, sia Guzzon (in PARODI 1999) per quella goriziana, definiscono la specie come relativamente comune e presente in tutti gli ambienti idonei. Storicamente era considerato abbondante come svernante e presente durante la migrazione (SCHIAVUZZI 1883).

Nell'ambito di questa indagine, la nidificazione del tuffetto è stata accertata nel Lago di Doberdò e in quello di Pietrarossa, in entrambi i casi con l'osservazione di giovani dell'anno, mentre UTMAR (2013) ne conferma la riproduzione anche nella zona della Foce del Timavo.

Guglielmo Londi

foto V. Dall'Orto (archivio MIFSN)

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

Considerato storicamente specie svernante e migratrice regolare (SCHIAVUZZI 1883), occasionalmente estivante (GUZZON in PARODI 1999), per l'area di studio non esistono segnalazioni di nidificazioni certe. Nell'ambito di questa indagine, una coppia è stata osservata intenta nelle caratteristiche parate nuziali il 14 aprile 2013 nel lago di Doberdò.

Sebbene il periodo in cui è stata effettuata l'osservazione rientri appieno nella fenologia riproduttiva della specie e le caratteristiche ambientali del lago, almeno in certi periodi, quando vi è presenza di acqua, risultino idonee, la nidificazione della specie è da considerarsi con molta cautela. Nei mesi successivi infatti la coppia non è stata più osservata. È probabile che il mutare delle condizioni ambientali, ad esempio conseguenti al parziale essiccamento del lago, abbia modificato l'area e indotto quindi la coppia ad abbandonare il sito; è tuttavia altresì ipotizzabile che, con il ritirarsi dell'acqua e il conseguente sviluppo della vegetazione anche nelle parti centrali del lago, a seguito di una drastica riduzione della visuale, la presenza degli animali sia passata inosservata.

La nidificazione dello svasso maggiore nel Carso è, ad oggi, da ritenersi possibile.

Tommaso Campedelli

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Tarabusino

Ixobrychus minutus

Nidificante e migratore regolare, la presenza del tarabusino nel Carso appare, come del resto logico per una specie strettamente legata alla vegetazione palustre e più in generale alle zone umide di acqua dolce, molto localizzata. Nell'ambito di questo studio il tarabusino è stato segnalato sei volte, tutte nel periodo potenzialmente idoneo per la nidificazione (maggio-giugno), nelle principali aree umide interne alla ZPS: la foce del Timavo, il Lago di Pietrarossa e quello di Doberdò.

Rispetto a quanto già noto, si conferma quindi la presenza della specie in tutte le aree potenzialmente idonee; già Kravos (in PARODI 1999) per la parte goriziana e PETRUCCO & BENUSSI (1997) per quella triestina, e prima di loro PERCO & UTMAR (1989), segnalavano la specie come nidificante certa nelle stesse aree, con l'aggiunta, per la porzione triestina, di alcune osservazioni nel tratto terminale dei fiumi Rosandra e Ospo, aree esterne alla ZPS, dove la presenza di questa specie è stata confermata anche recentemente (BENUSSI 2013).

Guido Tellini Florenzano

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Cigno reale

Cygnus olor

Sedentario, il cigno reale ha cominciato a nidificare in questo settore di adriatico all'inizio degli anni '80, a seguito di introduzioni (UTMAR 1989). Durante l'inverno, alla locale popolazione si aggiungono contingenti svernanti, provenienti in particolare dai paesi dell'Est Europa (Utmar in PARODI 1999). SCHIAVUZZI (1883) non riporta alcuna segnalazione della specie, sebbene la presenza in Italia del cigno reale, limitatamente alla stagione invernale e durante le migrazioni, fosse già nota ad autori coevi (PARODI et al. 1993). La nidificazione della specie in questa zona è fatto relativamente recente; nel 1999, a quasi 20 anni dal primo caso di nidificazione nella laguna di Grado, la specie non era ancora segnalata come nidificante (Utmar in PARODI 1999). La nidificazione del cigno reale all'interno della ZPS è stata accertata esclusivamente nei pressi della Foce del Timavo, con l'osservazione regolare nel corso dei quattro anni di individui adulti con pulcini a seguito; gruppi di individui non riproduttori, anche consistenti, possono essere osservati facilmente lungo tutta la linea di costa.

Anche in questo caso, come per le altre specie legate in maniera esclusiva agli ambienti umidi, il modello risulta estremamente semplice; i fattori che influenzano maggiormente la presenza della specie sono infatti la distanza dalla costa, naturalmente la probabilità di incontrare la specie è massima in prossimità della stessa, e la presenza di zone umide, anch'esse evidentemente con effetto positivo.

Simonetta Cutini

foto L. Dorigo (archivio MFSN)

Volpoca

Tadorna tadorna

Nidificante localizzata, è regolarmente presente come svernante e durante il periodo migratorio. La prima nidificazione è stata accertata per il Friuli Venezia Giulia nella Laguna di Grado nel 1995 (Utmar in PARODI 1999), nidificazione divenuta poi regolare con un incremento del numero di coppie negli anni successivi. Durante il periodo di indagine, la specie si è riprodotta con una coppia nella cassa di Colmata del Lisert; prima conferma il 10/05/2010 con sei pulli al seguito degli adulti (UTMAR 2013); ripetute osservazioni compiute in loco negli anni successivi, fino al 2013, fanno ipotizzare ulteriori possibili riproduzioni. Per il triestino le prime osservazioni riconducibili ad una nidificazione sono avvenute il 23/05/2008 sulle falesie di Duino, dove una coppia è stata vista entrare in un sito costituito da una cavità in parete, su un pinnacolo di roccia a circa 35-40 metri d'altezza. Nei giorni successivi, la femmina è stata vista sostare a lungo dentro la cavità (probabilmente in cova), mentre il maschio rimaneva alla base delle falesie o in mare a 200-300 metri dal nido. Non è stato possibile verificare il successo della riproduzione. Nel 2010 il 15 maggio lo stesso sito è frequentato da una coppia; il 24 maggio due coppie cercano posatoi sulle rocce sotto la falesia. Nel 2012 e 2013 la nidificazione viene ritenuta possibile grazie alle osservazioni in zona di individui nel periodo adatto alla riproduzione.

La volpoca, negli ultimi anni, risulta essere sensibilmente in aumento negli ambienti adatti su gran parte del territorio regionale e nelle zone umide adriatiche in generale (BRICETTI & FRACASSO 2003).

Enrico Benussi

foto R. Castellani

Canapiglia

Anas strepera

Specie osservabile prevalentemente durante la migrazione e la stagione invernale, quando è presente in buon numero nella vicina Riserva Naturale Foce dell'Isonzo.

La canapiglia è indicata da Utmar (in PARODI 1999) come nidificante rara e irregolare in provincia di Gorizia e i dati riportati riguardano esclusivamente l'area dell'Isola della Cona. Nell'ambito di questa ricerca, è stata raccolta una sola osservazione riconducibile a un caso di possibile nidificazione, una coppia osservata nel Lago di Pietrarossa il 13 luglio 2013. La possibilità che la specie nidifichi all'interno della ZPS è suffragata da altre osservazioni, contemporanee a questo studio, che interessano in particolare sia il lago di Doberdò sia quello di Pietrarossa (UTMAR 2013; ZANUTTO 2013).

Queste recenti e sempre più numerose osservazioni di canapiglia in periodo riproduttivo, vanno probabilmente inquadrare in un fenomeno più ampio, anch'esso di recente origine, che ha visto un incremento di segnalazioni di canapiglia sia nelle zone umide limitrofe (AA.VV. 2013) sia in altre zone umide del medio e alto adriatico (cfr. COSTA et al. 2009 per il Parco Regionale del Delta del Po in Emilia-Romagna).

Guglielmo Londi

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Germano reale

Anas platyrhynchos

Specie sedentaria nidificante, comune durante le stagioni di passo e durante l'inverno, quando alla popolazione locale si aggiungono contingenti provenienti da altre nazioni europee. Come tutte le specie legate alla presenza di ambienti umidi, seppur poco esigente, nidifica ad esempio anche in lagune salmastre, il germano reale è localizzato in corrispondenza dei pochi ambienti idonei presenti all'interno della ZPS. Alcune osservazioni riguardano anche tratti della costiera triestina, in particolare in prossimità di Duino-Aurisina e del Castello di Miramare, dove altri osservatori riportano la presenza di femmine con pulli al seguito (UTMAR 2013).

L'osservazione di un individuo in volo nei pressi di San Dorligo della Valle è verosimilmente da ricondurre ad una piccola popolazione che si riproduce nella parte terminale dei torrenti Rosandra e Ospio. La maggior parte delle osservazioni riguarda tuttavia le zone umide della Foce del Timavo, i laghi di Pietrarossa e Doberdò e le cave delle Mucille; in tutti questi siti la nidificazione della specie è stata accertata. La distribuzione della specie ricalca fedelmente quella descritta da Utmar (in PARODI 1999) per la parte goriziana e da BENUSSI (1983) e PETRUCCO & BENUSSI (1997) per quella triestina, sebbene, almeno negli ultimi decenni, la specie abbia mostrato una tendenza all'incremento.

I risultati delle analisi ecologiche, oltre a confermare la preferenza per gli ambienti umidi, sembrano evidenziare una certa sensibilità della specie al disturbo antropico e una preferenza per gli ambienti aperti, normalmente utilizzati come aree di foraggiamento.

Guido Tellini Florenzano

foto S. Carbonetto

Marzaiola

Anas querquedula

Considerata in passato esclusivamente di passo (SCHIAVUZZI 1883), Utmar (in PARODI 1999) riporta casi di nidificazioni probabili, comunque irregolari, per il lago di Doberdò. L'unica osservazione di marzaiola registrata nei quattro anni di studio e riconducibile a un probabile caso di nidificazione, riguarda appunto il Lago di Doberdò, dove una coppia è stata osservata il 20 maggio 2012. Ulteriori visite non hanno permesso di confermare la presenza della specie, anche se non è da escludere che la presenza di due soli individui possa essere passata inosservata; come detto anche per lo svasso maggiore, il lago è soggetto, nei periodi di minori precipitazioni, a fenomeni di prosciugamento quasi totale, con conseguente sviluppo della vegetazione elofitica e, conseguentemente, di una drastica diminuzione della visuale sulle acque libere.

La presenza della specie in periodo riproduttivo è stata recentemente confermata anche al di fuori di questo studio, da altri rilevatori, in aree vicine, come il Lago di Pietrarossa e le foci del Timavo (AA. VV. 2013).

Anche alla luce di questi ulteriori dati, la nidificazione della specie è quindi da considerarsi probabile e, nell'ambito del sistema delle zone umide della parte settentrionale della ZPS, probabilmente abbastanza regolare.

Simonetta Cutini

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Edredone

Somateria mollissima

Anatra marina presente durante tutto l'anno, con una popolazione che a livello regionale può essere stimata in 50-70 individui, sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio. La prima nidificazione è stata accertata nella primavera del 1999 (Utmar in PARODI 1999) alle foci dell'Isonzo, dove negli anni successivi si sono riprodotte fino a 6 coppie. Un tentativo di riproduzione (senza successo) è avvenuto nella cassa di colmata del Lisert nel 2004 (PERCO & PERCO 2011). Un uovo infecundo abbandonato senza nido è stato raccolto presso la spiaggia sotto il castello di Duino nel 2009 (R. Valenti com. pers.).

Durante il periodo di indagine, nel 2010, almeno 2 coppie sono state osservate alla base delle falesie di Duino tra la fine di aprile e gli inizi di maggio; nei due mesi successivi vengono osservate 3 femmine con 2 pulli di pochi giorni presso le mitilcolture, e un'altra femmina con almeno un pullus di pochi giorni presso la spiaggia del castello di Duino. A fine aprile 2011 è stato trovato, in una insenatura nel tratto costiero Duino-Baia Sistiana, un nido ubicato tra la vegetazione a pochi metri dall'acqua contenente 4 uova; il 23 maggio sono state osservate 2 femmine con 3 e 2 pulli di circa 10 giorni tra le mitilcolture; altre osservazioni di femmine con pulli (probabilmente le stesse) si sono ripetute nello stesso anno fino a giugno inoltrato. Nel marzo 2012, è stata osservata una coppia in corteggiamento presso la spiaggia del castello di Duino dove, il 10 aprile, è stato trovato un nido parzialmente allo scoperto contenente 2 uova; è verosimile che l'osservazione, poco distante, di una femmina con un pullo a seguito effettuata nel maggio successivo sia da riferirsi a questa nidificazione.

foto P. Utmar

Nello stesso periodo (7 giugno), l'osservazione di due femmine con 4 pulli ciascuna tra le mitilcolture intenti ad immergersi e a salire autonomamente sui galleggianti degli allevamenti, fanno credere alla riproduzione di una seconda coppia in loco. Nel 2013 il 10 maggio viene documentata una femmina con 6 pulli di circa una settimana nei pressi del porticciolo di Duino.

La presenza dell'edredone come nidificante risulta essere di rilievo trattandosi di specie rara e localizzata nel bacino del Mediterraneo.

Enrico Benussi

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

Specie migratrice regolare e nidificante localizzata sul Carso triestino e goriziano. I movimenti migratori si hanno prevalentemente nel mese di maggio e dalla fine di agosto fino a settembre. Considerato in passato nidificante probabile in ambiente carsico da PERCO & UTMAR (1989), Parodi e Peressin (in PARODI 1999) stimano in almeno 5 coppie la popolazione nidificante dell'intera provincia di Gorizia. All'interno della ZPS nidifica nell'area della Riserva Naturale della Val Rosandra con una coppia nella pineta del M.te Cocusso ed una seconda probabilmente sul M.te Carso (BENUSSI 2010). Nell'area di studio nidifica prevalentemente nei boschi di latifoglie o misti, ma anche in pinete mature di *Pinus nigra*. Le osservazioni sono risultate più frequenti nella porzione settentrionale della ZPS (Carso goriziano) e lungo il confine con la Slovenia, dove si trovano le formazioni forestali più estese e continue e, almeno per quanto riguarda i boschi di latifoglie, più mature (M.te Ermada, comprensorio del M.te Lanaro, Monrupino, M.te Francovec). Osservazioni riconducibili a individui probabilmente nidificanti sono state effettuate in zona del Lisert in data 7 agosto 2011 e alle sorgenti del Timavo (S. Giovanni di Duino) nel luglio 2013 (UTMAR 2013). L'unico caso di riproduzione accertata, è costituito da un nido con adulto in cova osservato il 27/06/2011 in una pineta presso Banne. Sono stimate in 6-8 le coppie nidificanti nell'area di studio.

Il modello ecologico evidenzia un contributo importante di tre variabili: la presenza di zone umide, di ambienti urbanizzati e la distanza dalle strade più trafficate, tutte con un effetto negativo. Se le ultime due sembrano indicare una elevata sensibilità della specie

al disturbo antropico, l'effetto negativo della presenza delle zone umide è, verosimilmente, da interpretarsi non tanto da un punto di vista ecologico ma più da un punto di vista geografico: la totalità delle zone umide è infatti concentrata nella porzione nord-occidentale della ZPS, mentre il maggior numero di osservazioni di falco pecchiaiolo riguardano la parte sud-orientale della stessa.

Enrico Benussi

Falco di palude

Circus aeruginosus

Presente regolarmente durante i periodi di passo e come estivante, solo recentemente il falco di palude si è aggiunto all'elenco delle specie che nidificano regolarmente all'interno della ZPS, sebbene risulti estremamente localizzato, come del resto inevitabile in questo contesto, per una specie strettamente legata alla presenza di zone umide. Dati pregressi, riferibili a possibili casi di nidificazione, riguardano la sola parte goriziana: Utmar (in PARODI 1999) riporta la specie come nidificante probabile nella zona del Lisert negli anni '60 e '70.

Durante il corso dell'indagine, la riproduzione della specie è stata accertata con regolarità almeno dal 2011 (UTMAR 2013), sempre all'interno dei canneti della Foce del Timavo e zone limitrofe, anche con l'osservazione, in più occasioni, di giovani dell'anno.

Considerando la recente dinamica di colonizzazione dell'area, non è da escludere che nei prossimi anni tentativi di nidificazione possano interessare anche altri siti idonei, come ad esempio il Lago di Doberdò.

Tommaso Campedelli

foto R. Castellani

Astore

Accipiter gentilis

Presente tutto l'anno, l'astore è sedentario e nidificante, erratico nel periodo invernale, comune ed uniformemente diffuso negli ambienti forestali maturi delle zone carsiche. Facilmente osservabile anche nei centri abitati, soprattutto in autunno ed inverno. La diffusione della specie è stata studiata da PERCO & BENUSSI (1981) e BENUSSI & PERCO (1984) e successivamente da BENUSSI & SERIANI (1991) che hanno individuato 21 territori di nidificazione adiacenti nel Carso triestino e sloveno, per una disponibilità territoriale pari a 24,4 kmq/coppia. L'astore predilige come siti di nidificazione i boschi maturi, in particolare alcuni impianti artificiali a *Pinus nigra*. Su un totale di 29 nidi censiti, l'83% è stato costruito su pino nero, mentre solo il 17% su quercia (BENUSSI & PERCO 1984). Il nido viene di norma costruito su alberi di grosse dimensioni, localizzati nelle aree più interne e meno disturbate del bosco, ma vicino a radure o tratti a minor densità di alberi che facilitano l'accesso al nido.

Diffuso principalmente nella porzione orientale della ZPS, in particolare nell'area compresa tra il M.te S. Leonardo, Monrupino e il M.te Orsario; numerose segnalazioni riguardano anche i rilievi della porzione meridionale dell'area, in particolare nel basovizzano e nella Riserva Naturale della Val Rosandra, dove si riproduce con due coppie accertate nelle pinete mature del M.te Cocusso e del M.te Carso (BENUSSI 2010). Una terza coppia nidifica verosimilmente nei boschi misti della parte più meridionale della Riserva, sopra l'abitato di S. Dorligo della Valle. La specie è comunque presente, sebbene più localizzata, anche nella porzione settentrionale della ZPS; alcune osservazioni riguar-

dano infatti la zona del Lago di Doberdò, dove è stata anche accertata la nidificazione.

Il modello ecologico dell'astore evidenzia molto bene quali sono i principali fattori che influenzano la presenza di questa specie: i boschi di conifere e, in particolare, uno scarso disturbo antropico. La carta elaborata a partire dai risultati del modello mostra una generale maggiore idoneità per la parte sud-orientale della ZPS, seppur con alcune eccezioni nel Carso goriziano, in particolare nei pressi delle zone umide (cfr. anche Parodi e Peressin in PARODI 1999). Rispetto a quanto emerso dalle indagini, il modello individua alcune aree apparentemente molto idonee per la specie, distribuite lungo la costa, sempre in corrispondenza di boschi di conifere. L'astore appare una specie in aumento su gran parte del territorio carsico grazie alla naturale ripresa e maturazione della copertura boschiva a discapito degli ambienti aperti.

Enrico Benussi

Sparviere

Accipiter nisus

Nidificante sedentario e migratore regolare, lo sparviere è distribuito in maniera uniforme in tutta la ZPS, dove frequenta varie tipologie di ambienti forestali e di margine, quest'ultimi soprattutto per la ricerca delle prede. La distribuzione di questa specie non sembra essere cambiata rispetto a quella degli anni '90 del secolo scorso, quando era considerata comune e ampiamente diffusa (PETRUCCO & BENUSSI 1997; Parodi e Peressin in PARODI 1999); SCHIAVUZZI (1883) la considerava invece "di passaggio autunnale ed invernale, comunissima".

Nell'ambito di questa indagine, la nidificazione della specie è stata accertata esclusivamente nei pressi del Lago di Doberdò; quest'area, unitamente a quella limitrofa del Lago di Pietrarossa, sembrano particolarmente idonee per lo sparviere, la cui preferenza, proprio in periodo riproduttivo, per formazioni boschive ripariali è del resto nota, soprattutto in contesti scarsamente forestati (BRICHETTI & FRACASSO 2003).

Il modello ecologico elaborato per lo sparviere non sembra particolarmente efficiente (valore AUC pari a 0.6), risultando incapace di identificare in maniera netta le condizioni ambientali particolarmente idonee alla specie. Questa situazione appare tuttavia coerente con l'ecologia di una specie che si mostra particolarmente adattabile, e che ha sperimentato proprio negli ultimi 2-3 decenni un generalizzato incremento che lo ha portato a colonizzare ambienti e aree ritenuti prima inospitali, come ad esempio zone agricole e aree urbanizzate (CALVI et al. 2013) e ampi settori della pianura padana (BRICHETTI & FRACASSO 2003). La stessa carta di idoneità mostra valori elevati sia in prossimità del

Lago di Doberdò e di quello di Pietrarossa, comunque caratterizzati da fasce di vegetazione ripariale arborea molto sviluppata, sia nelle aree più aperte ad est dei due bacini.

Guglielmo Londi

Poiana

Buteo buteo

Nidificante sedentaria, presente in Carso durante tutto l'anno. La poiana è il rapace diurno sicuramente più comune e diffuso. Distribuito uniformemente all'interno della ZPS, frequenta un ampio spettro di ambienti, nidificando prevalentemente all'interno delle aree boscate più estese. La cartina dell'abbondanza mostra un quadro piuttosto omogeneo, anche se i valori più elevati si registrano prevalentemente nella porzione settentrionale della ZPS. La distribuzione attuale della specie non sembra discostarsi troppo da quanto riportato per la fine del secolo scorso da Montina e Peressin (in PARODI 1999), BENUSSI (1983) e PETRUCCO & BENUSSI (1997), anche se è probabile che, almeno nella porzione triestina, la specie sia oggi più comune, avvantaggiata probabilmente, almeno in questa fase, dalla continua espansione del bosco. SCHIAVUZZI (1883) la considera nel territorio di Monfalcone "perenne e sommamente dannosa, perché distrugge le covate dei Germani reali"; a causa di questo la poiana era oggetto di caccia anche "quella col Gufo reale".

Il modello elaborato per la poiana evidenzia la presenza di alcune interessanti relazioni, in particolare con il bosco (di latifoglie) e con gli ambienti urbanizzati, in entrambi i casi di tipo quadratico: la probabilità di presenza della specie è massima per valori intermedi di copertura, in particolare per il bosco, più bassi invece per l'edificato. Questo risultato, insieme all'effetto positivo della variabilità morfologica del territorio, bene individua una specie ad alta valenza ecologica, pressoché ubiquitaria all'interno della ZPS, ma legata soprattutto a situazioni ecotonali e caratterizzate da un certo grado di diversità ambientale. La poiana sembra

evitare esclusivamente le aree aperte e urbanizzate più estese. Le aree maggiormente idonee alla specie sembrano essere concentrate ai due estremi della ZPS, anche se è un po' tutta la parte orientale dell'area a mostrare valori di idoneità medio-alti.

Simonetta Cutini

Gheppio

Falco tinnunculus

Il gheppio è specie nidificante sedentaria, presente all'interno della ZPS durante tutto l'anno; migratore regolare, durante l'inverno ai contingenti locali si aggiungono individui provenienti principalmente dai paesi dell'Europa dell'Est. Rispetto a quanto riportato da Florit (in PARODI 1999), la specie sembra essere adesso molto più diffusa nel Carso goriziano, dove si concentra infatti il maggior numero delle osservazioni registrate nei quattro anni di indagine, e dove la specie, fino a un recente passato, era invece di comparsa irregolare.

Un processo opposto sembra aver interessato la parte triestina, dove la specie, considerata da BENUSSI (1983) "comune e presente con un buon numero di coppie" sembra oggi molto meno diffusa, concentrata nei pochi ambienti aperti rimasti. L'unica area in cui la presenza della specie appare regolare è nei dintorni di Banne, dove, oltre ad uno degli ultimi esempi di landa carsica, esiste anche un complesso di edifici abbandonati, una vecchia caserma, apparentemente idonea alla nidificazione della specie. Una condizione simile, anche se solo relativamente alla disponibilità di siti di nidificazione, riguarda la stazione ferroviaria di Prosecco, dove infatti la specie è stata osservata regolarmente.

L'abitudine del gheppio di nidificare su manufatti, tipo capannoni e altri edifici, è del resto ben nota, anche in zona; un caso di nidificazione certa riportato da Florit (in PARODI 1999) riguarda l'area industriale Lisert a Monfalcone e già SCHIAVUZZI (1887) cita un caso di nidificazione alla Rocca di Monfalcone. Una coppia osservata ripetutamente durante la stagione riproduttiva 2013 potrebbe aver nidificato nella zona di Duino,

in prossimità degli ambienti a landa sulle pendici basse del M.te Cocco.

Le preferenze ambientali emerse dall'analisi ecologica evidenziano come il gheppio sia legato alla presenza di ambienti aperti, nel caso specifico alla landa, a cui si riferiscono, infatti, la maggior parte delle osservazioni e in corrispondenza della quale il modello indica i valori di idoneità ambientale più elevati. Tra le aree più idonee per la specie, anche gli ambienti agricoli localizzati nella porzione meridionale della ZPS, vicino agli abitati di Pese e Grozzana e in corrispondenza dell'area interessata dal progetto di recupero della landa vicino Basovizza. Il bosco ha un deciso effetto negativo, in particolare le pinete, mentre la specie mostra un certo grado di tolleranza rispetto alla presenza umana, utilizzando sovente le aree periferiche dei centri abitati più grandi per la caccia.

Simonetta Cutini

Lodolaio

Falco subbuteo

Migratore e nidificante, osservabile in Carso da aprile inoltrato a settembre, il lodolaio era storicamente considerato specie esclusivamente migratrice nella provincia di Trieste (SCHIAVUZZI 1883) e ancora PETRUCCO & BENUSSI (1997), alla fine del secolo scorso, non lo inseriscono tra le specie nidificanti. Per quanto riguarda invece la parte goriziana, PERCO & UTMAR (1989) prima e Tout (in PARODI 1999) poi, segnalano la possibile nidificazione del lodolaio in alcuni limitati settori del Carso monfalconese. Nell'ambito della presente indagine, il lodolaio è stato osservato in 10 occasioni, di cui tre però molto probabilmente riconducibili a individui in migrazione; in questa specie infatti il passaggio di individui in migrazione per tutto il mese di maggio, si sovrappone ampiamente con il periodo di nidificazione degli individui più precoci.

Tutte le osservazioni in periodo riproduttivo interessano la parte settentrionale della ZPS, corrispondente alla parte nord della provincia di Trieste e al Carso goriziano, dove effettivamente la specie sembra essere più diffusa. Osservazioni riportate da altri rilevatori confermano questo pattern distributivo (AA. VV. 2013), che sembra individuare, idealmente, il limite meridionale dell'areale in corrispondenza del paese di Duino-Aurisina.

Guido Tellini Florenzano

foto M. De Luca

Falco pellegrino

Falco peregrinus

Specie stanziale e migratrice regolare, nidificante localizzata in Carso con tre coppie, due presenti all'interno della ZPS (costiera triestina tratto Duino-Sistiana e Val Rosandra), mentre un'altra si è insediata nel 2012 in una cava abbandonata nei pressi di Sagrado (GO) posta appena ai margini dell'area. In provincia di Gorizia veniva considerato assente come nidificante ma presente durante i movimenti migratori e nel periodo autunno-invernale fino alla fine degli anni '90 da PARODI (1999).

Nell'area di studio la specie utilizza come siti di nidificazione esclusivamente ambienti rupestri, sia costieri che dell'interno, preferenze del resto ben note anche a scala nazionale, dove, recentemente, la presenza della specie si è fatta sempre più comune anche in ambito urbano (DINETTI & FRASSINET 2001). In Val Rosandra risulta assente come nidificante fino al 2008 quando fu accertata la prima storica nidificazione di una coppia su una parete esposta a SW. Negli stessi luoghi la coppia ha tentato la riproduzione fino al 2013 con alterni esiti derivati dalla presenza di una femmina immatura (2009 e 2010) e a possibili predazioni del nido (2011 e 2013). Solo nel 2012 la riproduzione ha avuto esito positivo. Nel sito conosciuto nella costiera triestina il primo insediamento è stato individuato nel 1987, dove ha nidificato fino al 1991 (PERCO & PERCO 2011). La specie è rimasta assente per 18 anni, quando nel 2009 una nuova coppia si è insediata nel medesimo sito. Da allora fino al 2013 le nidificazioni sono avvenute regolarmente e con una buona produzione di giovani.

Osservazioni di falchi pellegrini avvengono con una certa frequenza durante tutto l'anno su gran parte del-

le zone monitorate, dove la specie appare in sensibile incremento.

La carta di idoneità evidenzia, oltre ai siti di nidificazione conosciuti, ovvero la costa settentrionale e la Val Rosandra, valori elevati di idoneità nella parte nord-orientale della ZPS, a est di Jamiano, e vicino a Banne, lungo i contrafforti che dall'altopiano degradano verso Trieste. Queste zone sono, da un punto di vista morfologico, molto irregolari, e sono presenti anche piccole pareti rocciose. La variabilità morfologica, misurata in questo caso come variazione dell'altitudine, è, secondo il modello, uno dei fattori più importanti per definire la probabilità di presenza della specie, insieme alla distanza dalla costa, il primo per contributo percentuale, con cui esiste una relazione negativa.

Enrico Benussi

Fagiano comune

Phasianus colchicus

Specie nidificante sedentaria, naturalizzata e insediata in modo definitivo sul Carso in seguito a continui ripopolamenti a scopo venatorio (BENUSSI 1983), è considerata comune e ubiquitaria e si riproduce in tutto il territorio. La distribuzione di questa specie è evidentemente influenzata dai ripopolamenti effettuati a scopo venatorio, che localmente possono alterare la demografia delle popolazioni residenti e naturalizzate. Nel corso dei rilevamenti il fagiano comune è risultato maggiormente presente in tutta la porzione nord-occidentale della ZPS, nel Carso goriziano, dove si riscontrano gli ambienti più idonei alla specie. Nel resto della ZPS si rinvenivano nuclei isolati, tra cui spicca un maggior numero di contatti nella zona di Rupinpiccolo.

Il modello ecologico evidenzia un effetto positivo importante degli spazi aperti e infatti le aree a maggiore idoneità sono individuate proprio in corrispondenza di questi ambienti, in particolare nelle aree a landa e arbusteti che si estendono tra gli abitati di Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari. Infine la specie sembra preferire aree morfologicamente più uniformi e pianeggianti.

Jacopo Tonetti

foto M. De Luca

Porciglione

Rallus aquaticus

Nidificante, parzialmente sedentario, è presente durante tutto l'anno. Nell'ambito di questa indagine, il porciglione è stato rilevato esclusivamente nelle tre principali zone umide della ZPS, i laghi di Doberdò e Pietrarossa e le Foci del Timavo. La nidificazione della specie era già nota per queste aree (Guzzon in PARODI 1999), e non è da escludere che la specie possa nidificare anche nelle cave delle Mucille.

Il porciglione è un rallide legato alla presenza di vegetazione elofitica, in particolare fragmiteti e tifeti, dove si rifugia e costruisce il nido; frequenta un ampio spettro di zone umide, per lo più caratterizzate da livelli idrici bassi. In Friuli Venezia Giulia è distribuito prevalentemente nelle zone umide costiere e nelle bonifiche della bassa pianura.

Guglielmo Londi

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Re di quaglie

Crex crex

Migratore regolare ma scarso, segnalato da PERCO & UTMAR (1989) anche come estivante irregolare per le province di Trieste e Gorizia. Guzzon e Tout (in PARODI 1999) riportano l'osservazione di un individuo nella zona del Lisert (Monfalcone) durante i movimenti post-riproduttivi nell'ottobre 1988. Nessun dato disponibile per la provincia di Trieste. Nell'ambito di questa indagine è stato rilevato un maschio in canto il 21/05/2013 nella piana erbosa di Grozzana/Pese (trattasi dell'unico ambiente vocato per la specie in ambito carsico). Sempre un unico maschio, verosimilmente lo stesso e che si dimostra spiccatamente territoriale, contattato nella medesima località più volte fino alla metà di giugno dello stesso anno.

Va segnalata la presenza di un secondo maschio in canto, il 16 giugno, a soli 1,7 chilometri in linea d'aria nella piana coltivata di Krvavi Potok (Slovenia). Nel medesimo luogo, nel 2012, un individuo in canto per diverse settimane veniva segnalato da P. Kmed (P. Tout com. pers.). In entrambi i casi lo sfalcio avvenuto nelle zone nei giorni successivi ha verosimilmente compromesso la nidificazione. In seguito non si sono avuti più contatti. La scarsità di informazioni fuori dal periodo riproduttivo è dovuta probabilmente all'elusività che contraddistingue questa specie.

Enrico Benussi

foto E. Florit

Gallinella d'acqua

Gallinula chloropus

Sedentaria nidificante, la gallinella d'acqua è presente all'interno della ZPS durante tutto l'anno. Come tutte le specie legate agli ambienti umidi, sebbene estremamente adattabile e capace di riprodursi anche in zone umide di piccole e piccolissime dimensioni, la sua presenza è limitata alla parte nord-occidentale della ZPS, dove è presente e comune in tutti gli ambienti idonei. La nidificazione della specie è stata accertata in tutti i siti di presenza, ad eccezione delle cave delle Mucille, dove è comunque da considerarsi altamente probabile. La distribuzione della specie non ha subito, rispetto ad un recente passato, alcun evidente cambiamento (PETRUCCO & BENUSSI 1997; Guzzon in PARODI 1999), e anche storicamente era considerata "comunissima, specialmente nei mesi di ottobre e novembre" (SCHIAVUZZI 1883).

Il modello elaborato per la specie evidenzia, come era logico attendersi, un effetto positivo molto importante della presenza di ambienti umidi e un altrettanto effetto positivo della diversità di uso del suolo. Questa relazione potrebbe effettivamente indicare una preferenza della specie per ambienti umidi caratterizzati, ad esempio, dalla presenza di una ricca vegetazione ripariale, anche arborea, spesso utilizzata come rifugio oltre che per la costruzione del nido, ma anche di ambienti aperti nelle immediate vicinanze. Non è infatti raro osservare questa specie "al pascolo" in prati e incolti vicino alle zone umide.

Tommaso Campedelli

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Folaga

Fulica atra

Specie nidificante sedentaria, migratrice e svernante regolare, la distribuzione della folaga è localizzata in corrispondenza delle zone umide della foce del Timavo e del monfalconese, e nei laghi di Doberdò, Pietrarossa e delle Mucille. La distribuzione attuale ricalca quella riportata da diversi autori, tra cui BENUSSI (1983) e Guzzon e Utmar (in PARODI 1999). La folaga frequenta un ampio spettro di zone umide, sia di acqua dolce sia salmastra, comunque caratterizzate dalla presenza di una ricca vegetazione ripariale e elfitica. Durante la migrazione e lo svernamento predilige le acque aperte, dove forma numerosi gruppi monospecifici.

La presenza delle zone umide è l'unico fattore ambientale di un certo rilievo identificato dal modello ecologico; la folaga mostra una preferenza anche per le aree agricole e gli ambienti aperti in generale, abitualmente utilizzati, in vicinanza delle zone umide, come aree di foraggiamento. Le uniche aree idonee individuate dal modello coincidono con le zone umide in cui la presenza della specie è stata accertata.

Paolo Bonazzi

foto M. Arzillo (archivio MFSN)

Cavaliere d'Italia

Himantopus himantopus

Presente da marzo a settembre, migratore regolare, il cavaliere d'Italia nidifica all'interno della ZPS soltanto nella cassa di colmata del Lisert. La nidificazione della specie è stata accertata sia nel 2010, quando erano presenti almeno 5 coppie (UTMAR 2013), sia nel 2012, quando le coppie presenti erano almeno tre; il 14 luglio 2013, sempre all'interno della cassa di colmata, è stato osservato un giovane dell'anno.

La riproduzione del cavaliere d'Italia al Lisert è nota da tempo; Utmar (in PARODI 1999) riporta, a prova di una elevata adattabilità della specie, un caso di nidificazione su un terrapieno di sassi all'interno di ristagni di acqua piovana. Nell'area vengono sovente utilizzati nidi abbandonati di cigno reale.

Simonetta Cutini

foto V. Dall'Orto (archivio MIFSN)

Corriere piccolo

Charadrius dubius

Specie migratrice nidificante, è presente da marzo a settembre, occasionalmente oltre. La presenza del corriere piccolo all'interno della ZPS risulta estremamente localizzata; tutte le osservazioni raccolte si riferiscono infatti alle Foci del Timavo e alle aree limitrofe, in particolare alla cassa di colmata del Lisert. La presenza del corriere piccolo in quest'area in periodo riproduttivo era già nota e PARODI (1999) ne riporta con certezza la nidificazione. Nell'ambito di questa indagine, nel mese di maggio 2013, una coppia è stata più volte osservata impegnata in comportamenti territoriali e di corteggiamento, osservazioni peraltro confermate da altri osservatori per lo stesso periodo anche in anni precedenti (UTMAR 2013).

La nidificazione della specie, seppur con densità non elevate, è quindi da ritenersi altamente probabile.

Guido Tellini Florenzano

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Fratino

Charadrius alexandrinus

Specie nidificante e parzialmente sedentaria, la presenza del fratino all'interno del territorio della ZPS è limitata alla sola cassa di colmata del Lisert, dove è avvenuta l'osservazione di un individuo in comportamento territoriale. La nidificazione della specie nell'area è nota da tempo; Utmar (in PARODI 1999) stimava la popolazione locale, allora la più importante a livello provinciale, in 15-25 coppie, poi andate via via diminuendo fino al 2010, quando ne sarebbe rimasta soltanto una (UTMAR 2011).

Osservazioni regolari della specie in periodo riproduttivo da parte anche di altri rilevatori sono comunque continuate anche negli anni successivi, confermando, almeno, una frequentazione regolare dell'area. Tra le possibili cause della diminuzione, UTMAR (2011) indica, tra quelle più importanti, il disturbo antropico, l'aumento del gabbiano reale, potenziale predatore di pulli e uova, e l'incremento della copertura vegetale nei siti di nidificazione.

Simonetta Cutini

foto M. Basso (archivio MFSN)

Gabbiano reale

Larus michahellis

Specie stanziale e nidificante tra le più diffuse nelle zone umide e ambienti marini costieri, nel Friuli Venezia Giulia frequenta abitualmente anche gli ambienti di pianura; lo si osserva spesso nei corsi d'acqua dell'interno e saltuariamente nei laghi carsici.

Nell'area oggetto di indagine una colonia si è insediata alla fine degli anni '80 nella cassa di colmata del Lisert, in seguito (1997-98) questa zona è stata quasi completamente disertata probabilmente a causa di azioni predatorie da parte di carnivori (Utmar e Kravos in PARODI 1999). Poche coppie si sono riprodotte saltuariamente nel 2001 e 2005 mentre dal 2010 al 2012 la nidificazione è ritenuta possibile. Anche nel triestino si riproduce dalla metà degli anni '80 nell'ambito urbano di Trieste (BENUSSI & BEMBICH 1998) con una popolazione in continuo incremento e che oggi conta quasi 400 coppie.

Dati singoli che riguardano il Carso triestino si riferiscono a nidificazioni isolate di una coppia avvenuta sull'altopiano a Opicina nel 1999 e 2000 (BEMBICH 2001); verosimilmente l'insediamento di questa coppia è stato facilitato dalla presenza di una nota fonte trofica rappresentata da una grande discarica nella vicina Slovenia, frequentata con assiduità da gabbiani provenienti dalla città.

All'interno della ZPS, durante il periodo di indagine, il gabbiano reale ha nidificato regolarmente, seppur con un limitato numero di coppie isolate nel tratto costiero più settentrionale; adulti in cova e successivamente pulli sono stati osservati regolarmente sulle falesie di Duino dove PERCO & PERCO (2011) confermano in 2-4 il numero di coppie nidificanti. In un'unica occasione

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

una sola coppia si è riprodotta nella cava dimessa del Villaggio del Pescatore, il nido con l'adulto in cova è stato osservato il 6 maggio 2011.

Enrico Benussi

Sterna comune

Sterna hirundo

Migratrice nidificante, la sterna comune è presente nell'area di studio tra marzo e settembre. Come per il fraticello, anche per questa specie, la presenza è limitata alle Foci del Timavo e zone limitrofe, in particolare nella cassa di colmata del Lisert, dove la sterna comune è stata regolarmente osservata nell'arco dei quattro anni di indagine, anche da altri rilevatori (AA. Vv. 2013), e la sua nidificazione più volte accertata. La popolazione locale non supera verosimilmente le due coppie.

La nidificazione della specie in questa area è fenomeno abbastanza recente; secondo quanto riportato da Utmar (in PARODI 1999), la sterna comune nidificava regolarmente solo nella porzione occidentale della provincia di Gorizia, nella laguna di Grado, dove era considerata anche in un passato meno recente, nidificante comune (SCHIAVUZZI 1883).

Tommaso Campedelli

foto V. Dall'Orto (archivio MIFSN)

Fratricello

Sterna albifrons

Nidificante e migratore regolare, il fraticello è presente nell'area di studio da aprile ad agosto. All'interno della ZPS, è segnalato esclusivamente nell'area delle foci del Timavo, dove sono stati osservati, peraltro in una sola occasione, 13 individui il 1 giugno 2012. Sebbene l'osservazione di un numero così elevato di individui, seppur in periodo riproduttivo, sia probabilmente da ricondurre ad estivanti non riproduttori, la specie può essere comunque inserita tra quelle nidificanti possibili, sebbene in modo irregolare. La presenza della specie in periodo riproduttivo in questa zona è, infatti, confermata recentemente anche da altri rilevatori (UTMAR 2013) e la sua nidificazione già accertata negli anni '90 del secolo scorso (Utmar in PARODI 1999). In quello stesso periodo, il fraticello è stato protagonista di una marcata diminuzione che ha interessato tutti i siti costieri della regione (UTMAR 2001).

Storicamente il fraticello era considerato esclusivamente di passo, prevalentemente nel mese di agosto (SCHIAVUZZI 1883).

Guglielmo Londi

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Colombaccio

Columba palumbus

Il colombaccio nell'area del Carso è nidificante e migratore regolare, secondo BENUSSI (1983) parzialmente sedentario. Rispetto al secolo scorso, quando la specie era considerata scarsa e localizzata, confinata in alcuni ambiti collinari (BENUSSI 1983; FELCHER et al. 1991; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999), la specie appare oggi molto più comune e diffusa. Il colombaccio ha mostrato negli ultimi anni una tendenza all'espansione e all'incremento numerico (CAMPEDELLI et al. 2012), fenomeno che evidentemente ha interessato, sebbene in misura minore rispetto ad altre aree del paese, anche il Carso. I dati raccolti evidenziano una maggiore concentrazione della specie nel Carso goriziano, in particolare tra Monfalcone e Duino, dove si raggiungono i valori di densità più elevati, ma anche lungo la costa e sul confine italo-sloveno, in particolare in corrispondenza del Monte Lanaro.

L'analisi delle preferenze ambientali ha messo in evidenza come la specie nell'area di studio sia particolarmente legata alle aree a landa e a contesti ambientali diversificati. I fattori che sembrano invece limitare decisamente la presenza della specie risultano le aree agricole, in particolare quelle più estese e continue, gli ambienti urbani e le zone umide. Poche e circoscritte le aree particolarmente idonee, distribuite un po' lungo tutta la ZPS, per lo più in corrispondenza delle situazioni più diversificate.

Gianpiero Calvi

foto B. Dentessani

Tortora dal collare

Streptopelia decaocto

Specie nidificante stanziale, comune e ampiamente diffusa in tutte le aree urbanizzate, in particolare quelle di maggiori dimensioni; la distribuzione attuale non sembra discostarsi troppo da quanto descritto da altri autori per la fine del secolo scorso (BENUSSI 1983; PARODI 1999). La specie risulta particolarmente comune lungo la fascia costiera, soprattutto nell'area di Duino e Monfalcone, dove è presente una urbanizzazione diffusa del territorio, mentre diventa più localizzata verso l'interno, dove la si rinviene in particolare nei centri abitati circondati da aree agricole. Manca del tutto dalle aree a maggiore copertura forestale.

La tortora dal collare è specie prettamente sinantropica e il modello ecologico evidenzia molto bene questa spiccata preferenza per gli ambienti urbanizzati, che forniscono infatti il contributo maggiore nell'individuare le aree più idonee alla specie. Aree che risultano appunto concentrate lungo la fascia costiera e, più in generale, lungo i confini della ZPS. Le aree urbanizzate, e buona parte di quelle agricole che le circondano, ricadono infatti al di fuori della ZPS.

Gianpiero Calvi

foto B. Dentessani

Tortora selvatica

Streptopelia turtur

La tortora selvatica in Carso è nidificante e migratrice regolare, presente da aprile a settembre. La distribuzione che emerge dai dati raccolti nell'ambito di questa indagine sembra indicare come la specie, negli ultimi 30 anni, sia andata in corso ad una progressiva riduzione dell'areale, almeno per quanto riguarda la provincia di Trieste. Rispetto a quanto riportato da PERCO & UTMAR (1989) e PETRUCCO & BENUSSI (1997), la tortora selvatica sembra essere scomparsa dalla parte meridionale della ZPS, mentre nella fascia centrale del Carso triestino appare sporadica e localizzata nelle zone di Prosecco-Contovello e Gabrovizza. Valori di abbondanza più elevati si registrano solo nei boschi di Sales, verso il confine italo-sloveno, e nella zona tra Precenico superiore, Malchina e il Monte Sambuco. È molto probabile che la tortora selvatica abbia risentito negativamente dell'aumento della copertura forestale, processo che ha determinato una banalizzazione del paesaggio. Per quanto riguarda invece il Carso goriziano, la distribuzione attuale non sembra discostarsi troppo da quanto riportato da PARODI (1999) che individuava proprio nelle aree a landa cespugliata, uno degli ambienti in cui la specie risulta particolarmente abbondante.

Tipica delle aree caratterizzate da un discreto grado di diversità ambientale, il modello evidenzia infatti un effetto soglia ad esempio per la diversità di uso del suolo, come le aree agricole ricche di siepi e boschetti, ma anche le boscaglie più rade e aperte, la tortora selvatica evita decisamente le aree urbanizzate, anche quelle di più piccole dimensioni, e le aree forestali più estese e continue. La carta del modello individua infatti

le aree a maggiore idoneità principalmente nel settore nord-occidentale della ZPS, in alcune aree agricole interne e nelle zone a minor copertura forestale lungo il confine sloveno.

Paolo Bonazzi

Cuculo

Cuculus canorus

Specie nidificante e migratrice, comune e ben distribuita sia nel Carso triestino (BENUSSI 1983) sia in quello goriziano (GUZZON in PARODI 1999), in particolare nei pressi delle zone umide del monfalconese (PERCO & UTMAR 1989), dove ancora oggi appare decisamente comune e abbondante. Il cuculo, unico uccello in Europa a parassitare il nido di altre specie, mostra spesso una distribuzione influenzata, oltre che da alcuni parametri ambientali, anche dalla presenza delle specie ospiti (es. attorno alle zone umide dove parassita prevalentemente nidi di cannaiole comuni e cannareccione). Dai dati raccolti, la specie risulta distribuita in modo uniforme e continuo lungo tutta la dorsale di confine tra Italia e Slovenia, in particolare dall'altezza di Medeazza fino all'interporto di Ferneti. I valori di abbondanza maggiori si registrano nella Riserva Naturale del Monte Lanaro e nella parte sud-est della ZPS, nell'area di Grozzana.

Il cuculo mostra una netta preferenza per le aree boscate, preferenza ben evidenziata anche dalla carta di idoneità che individua nelle aree più orientali quelle con valori più elevati. La relazione positiva con fattori quali la lontananza dalla linea di costa e dalle strade potrebbe essere dovuta non tanto a relazioni di tipo ecologico, bensì a una maggiore distribuzione delle aree forestali in zone lontane sia dalla costa che dalle principali vie di comunicazione. Non è comunque da escludere che il cuculo preferisca condizioni climatiche più continentali, dove comunque risulta più frequente nelle aree più calde e meglio esposte.

Severino Vitulano

foto B. Dentessani

Barbagianni

Tyto alba

Specie sedentaria e migratore parziale, il barbagianni è nidificante localizzato all'interno della ZPS. BENUSSI (1983) riporta la presenza di poche coppie prevalentemente distribuite nella piana di Zaule, nella Valle dell'Ospo e nel muggesano. In provincia di Gorizia si stimavano 20-30 coppie (Corbatto e Paradisi in PARODI 1999), concentrate per lo più nella porzione settentrionale della provincia e in parte della pianura. I dati raccolti nell'ambito di questa indagine mostrano una presenza molto localizzata nel settore goriziano della ZPS, dove il barbagianni è stato contattato solo nei pressi di Doberdò del Lago, senza tuttavia confermarne la nidificazione. Lo stesso vale per la zona del Villaggio del Pescatore. Altri dati raccolti in periodo riproduttivo si riferiscono a soggetti osservati nei pressi dell'abitato di Opicina (TS), nelle zone periferiche di S. Dorligo della Valle, ai margini della piana di Zaule, nel settore più meridionale della provincia di Trieste. Abituale frequentatore di ruderi, campanili e vecchi cascinali, per lo più in contesti di pianura e collina, non trova in Carso un ambiente particolarmente idoneo. Un tempo molto comune, risulta in forte diminuzione, un po' in tutta l'Italia settentrionale (PERONACE et al. 2012). Tra le principali cause di diminuzione, si segnala l'alto numero di decessi dovuti al traffico veicolare; il barbagianni, assieme alla civetta, risulta infatti particolarmente colpito (39% di tutti gli Strigiformi trovati morti sulle strade italiane dal 1996 al 1999; SPAGNESI & SERRA 2003).

L'analisi dell'ecologia della specie indica una generale positiva relazione con gli ambienti urbanizzati, anche quelli di maggiori dimensioni: la maggior parte delle

osservazioni è stata raccolta nei dintorni di Monfalcone e della conurbazione che comprende anche Ronchi dei Legionari, specialmente nelle situazioni più diversificate, ovvero dove sono ancora presenti aree agricole e piccoli spazi a vegetazione naturale. Anche in territorio triestino, dove la specie è più rara, le poche aree idonee individuate dal modello riguardano l'immediata periferia di Opicina, dopo Trieste l'agglomerato urbano di maggiori dimensioni, e l'area industriale a sud di S. Dorligo della Valle.

Enrico Benussi

Assiolo

Otus scops

Nidificante e migratore regolare, i movimenti sono concentrati tra metà marzo/metà aprile e nel mese di settembre. In passato era considerato uniformemente diffuso, pur con fluttuazioni annuali, in tutti gli ambienti della provincia di Trieste (BENUSSI 1983, 2008). In Val Rosandra, in uno studio compiuto dal 1991 al 1996 in un area di circa 500 ha comprendente tutta la Valle e zone adiacenti (M.te Carso, S. Dorligo della Valle, M.te Stena, S. Lorenzo, Draga S. Elia), sono stati individuati 15 territori, per una densità variabile tra 2,4 e 3,25 terr./kmq (BENUSSI et al. 1997). Di questi, 13, tutti posti all'interno della Valle, sul versante orografico destro, risultavano concentrati in uno spazio di 1,5 chilometri in linea d'aria, con alcuni nidi ubicati all'interno di cavità di pareti rocciose a strapiombo. Nella provincia di Gorizia, la specie risulta diffusa soprattutto in ambienti di pianura e media collina, dove nei decenni ha subito un decremento a causa dell'utilizzo di pesticidi nell'agricoltura e nella riduzione di siti adatti alla riproduzione (filari di salici e gelsi capitozzati) tipici del paesaggio agrario isontino (Corbato e Paradisi in PARODI 1999). Nell'area di studio, caratterizzata in gran parte da un clima sub-continentale, l'assiolo preferisce le zone ed i versanti collinari termofili, con presenza di coltivi a conduzione tradizionale piuttosto che le doline o i boschi più interni. Si riproduce spesso in ambienti antropizzati, dove lo si osserva regolarmente in caccia nei pressi delle illuminazioni stradali.

Proprio la presenza di ambienti urbanizzati è uno dei fattori che più contribuisce a definire, con una relazione positiva, la probabilità di presenza della spe-

cie, che invece sembra sensibile al disturbo provocato dalle infrastrutture. Un altro fattore che influenza positivamente la presenza della specie è l'estensione dei margini forestali; l'assiolo infatti, pur essendo legato alla presenza del bosco, in particolare di latifoglie, necessita di aree aperte in cui cercare le prede e predilige condizioni caratterizzate da un certo grado di diversità ambientale. L'effetto negativo della presenza delle doline e della variabilità morfologica sono probabilmente da interpretarsi in senso geografico; il modello individua infatti tra le aree a minore idoneità quelle più orientali, dove si concentrano i principali rilievi e i boschi più estesi e continui, e quelle centro-meridionali della ZPS, dove più numerose sono le doline.

L'assiolo è considerato in diminuzione nell'area di studio, sebbene l'entità della popolazione mostri marcate fluttuazioni interannuali.

Enrico Benussi

Gufo reale

Bubo bubo

Specie sedentaria e nidificante, presente con quattro coppie localizzate in ambienti rocciosi adatti (rupi, falesie e cave) del Carso triestino ed almeno una in quello goriziano, all'esterno della ZPS, in un'area dove la presenza della specie era considerata sporadica e limitata per lo più al periodo invernale (Corbatto e Paradisi in PARODI 1999).

Sito storico di nidificazione, la Val Rosandra ospita attualmente una sola coppia di cui sono conosciuti almeno 5 siti riproduttivi. Tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90 vi si riproducevano fino a due coppie (densità di 0,43 terr./kmq; BENUSSI et al. 1997), sebbene con scarso successo. Gli altri siti di nidificazione noti sono costituiti da pareti rocciose, alte dai 15 ai 40 metri; in un caso la coppia ha utilizzato una cava dismessa del Carso interno. Nel giugno 2009 in Conca d'Orle, sito di nidificazione storico abbandonato dagli anni '70, ubicato a circa 3,5 chilometri in linea d'aria da un altro sito invece utilizzato, è stata ritrovata una carcassa in decomposizione di un pullo di circa 24-26 giorni. Accurati sopralluoghi non furono sufficienti a localizzare il nido e la presenza della specie non è stata riconfermata negli anni successivi; è probabile quindi si sia trattato di un caso di nidificazione isolato, verosimilmente di una coppia proveniente dalla vicina Slovenia (Benussi ined.). Erratico nel periodo autunnale, quando viene regolarmente osservato anche lontano dai territori di nidificazione (ad es. vicino alle falesie Duino, Aurisina, Malchina, Sgonico, S. Croce, Lago di Doberdò ecc.).

L'esiguo numero di dati a disposizione, tutti concentrati in poche aree, influenza la bontà del

modello che, tuttavia, riesce a evidenziare alcuni aspetti interessanti, tra cui una preferenza per le aree esposte a sud, situazione che caratterizza parte dei siti di nidificazione, e per gli ambienti con un certo grado di diversità ambientale, verosimilmente quelli che ospitano una densità maggiore di prede. In tal senso deve essere interpretata anche la relazione positiva, comunque debole, con gli ambienti urbanizzati, almeno quelli di minori dimensioni. È infatti noto come una delle prede favorite del gufo reale siano i ratti, principali commensali dell'uomo. Il gufo reale è stato più volte osservato nei pressi di Basovizza, S. Dorligo della Valle, Pese, Zolla e Monrupino.

Enrico Benussi

Civetta

Athene noctua

Prevalentemente sedentaria e nidificante localizzata, probabilmente migratrice regolare. In provincia di Trieste un tempo era considerata ben diffusa in aree coltivate e antropizzate (BENUSSI 1983). In passato pochi contatti nella Val Rosandra e zone limitrofe, dove un solo territorio di nidificazione è stato individuato presso l'abitato di Hervati nel 1995 (BENUSSI et al. 1997). PARODI (1999) stima per il goriziano 60-70 coppie e la considera il rapace notturno più comune, particolarmente diffuso in ambienti antropizzati, soprattutto rurali, di pianura. Durante il periodo riproduttivo frequenta in prevalenza i centri abitati, specialmente quelli rurali di più piccole dimensioni, e le aree agricole, mostrando una certa predilezione per le aree coltivate a vite e con presenza di alberature e vecchie piante. Durante il resto dell'anno è osservabile anche in zone a boscaglia. Nel corso dell'indagine è stata contattata in un buon numero di quadranti, soprattutto del Carso triestino. Individuate 3-4 coppie presso gli abitati di S. Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, S. Lorenzo e Grozzana, nel settore carsico più meridionale.

Da un punto di vista ecologico, la civetta appare qui molto più legata agli ambienti antropizzati, anche quelli di maggiori dimensioni (es. Opicina, una delle aree a maggiore idoneità), dove frequenta in particolare le aree periferiche caratterizzate dalla presenza di piccole aree agricole e spazi naturali, che non agli ambienti agricoli, dove invece la specie diviene meno comune. È probabile che questo sia dovuto ad una maggiore disponibilità di prede che caratterizza le aree urbane e zone limitrofe. Al pari dell'assiolo, mostra di evitare le aree vicine alle vie di comunicazione maggiormente trafficate.

Enrico Benussi

foto S. Zanini

Allocco

Strix aluco

Sedentario ed erratico, è il rapace notturno in assoluto più comune e diffuso all'interno della ZPS. Fino agli anni '70 la presenza di questa specie appariva limitata dalla scarsa presenza di siti idonei alla riproduzione: a dimostrazione di quanto affermato, nel marzo dell'81, una coppia si è riprodotta in un vecchio nido di poiana, fatto abbastanza raro per la specie. Attualmente appare quasi uniformemente distribuito nell'area, in particolare nella parte centrale e meridionale del Carso triestino, meno in quello goriziano (PARODI 1999), dove gli ambienti aperti, meno idonei alla specie, sono più diffusi. Nelle zone adiacenti al basovizzano sono stati individuati 6-8 territori di nidificazione così distribuiti: 2 coppie nei boschi sopra S. Dorligo della Valle, una coppia presso Botazzo, 1 coppia nei boschi cedui di Draga S. Elia, 2 coppie nei boschi di Grozzana, 2 coppie nelle aree a *Pinus nigra* del M.te Cocusso (BENUSSI 2008). Per la Val Rosandra ed aree adiacenti, viene riportato un totale di 4 coppie territoriali, per una densità di 0,87 terr./kmq (BENUSSI et al. 1997). La scelta del sito riproduttivo avviene in relazione alla disponibilità di cavità naturali presenti in alberi vetusti (roveri, cerri, pini neri secchi nei quali è defluita la resina) o di entrate di caverne e grotte; in ambiente carsico vengono spesso usati vecchi nidi di picchio nero, anche come roost al di fuori della stagione riproduttiva.

Frequenta una grande varietà di ambienti, comprese le aree antropizzate e le cave; specie prevalentemente forestale, l'alocco frequenta diversi tipi di boschi, dai cedui termofili alle pinete pure, mostrando tuttavia di preferire le fustaie adulte di latifoglie o miste, come ben evidenziato anche dal modello (relazione positiva per

valori intermedi di copertura di boschi di conifere). Lo stesso tipo di relazione si ha con la presenza di ambienti urbanizzati e con il grado di diversità ambientale, nello specifico lo sviluppo dei margini del bosco. È probabile che in questi ambienti la densità di prede sia decisamente maggiore. Caratteristica comune a tutte le specie di rapaci notturni, almeno quelle più diffuse, l'effetto negativo dovuto alla presenza delle strade.

La specie sembra essere tendenzialmente in aumento nell'ambito di tutto il territorio carsico, favorita soprattutto dal processo di invecchiamento dei boschi ma anche dall'aumento, per certi versi contemporaneo, del numero di siti di nidificazione rappresentati dai nidi dei picchi. La popolazione nell'area di indagine viene stimata in 20-25 coppie.

Enrico Benussi

Gufo comune

Asio otus

Specie sedentaria e nidificante, migratrice e svernante regolare, la sua distribuzione non appare del tutto omogenea e sul Carso triestino incerta e frammentaria: notizie di casi di nidificazione certa si riferiscono alle zone di Rupingrande, Colle dell'Anitra e Prosecco (GERDOL & PERCO 1977). Nel goriziano è il notturno più diffuso nel periodo invernale, quando diviene gregario e tende a formare assembramenti diurni, composti spesso da decine di individui, soprattutto in presenza di formazioni forestali ricche di conifere, sia in zone interne che lungo la fascia costiera. La popolazione nidificante in provincia di Gorizia era stimata, alla fine del secolo scorso, in 40-50 coppie nidificanti (Corbatto et al. in PARODI 1999). Uno specifico studio, compiuto da BENUSSI (2008) nei SIC e ZPS del Carso triestino e goriziano, ha consentito di localizzare un buon numero di soggetti territoriali, che tuttavia potrebbe rappresentare solo una parte della popolazione realmente presente. Il gufo comune è infatti specie molto elusiva, risponde raramente anche alle stimolazioni acustiche, mentre risulta più facile contattare gli immaturi estremamente vociferi fuori dal nido, e la sua presenza è perciò molto spesso sottostimata. Il 18/08/2010 giovani da poco usciti dal nido uditi mentre invocano cibo nella zona di Medeazza (UTMAR 2013).

Nell'ambito della Riserva della Val Rosandra è stata accertata la presenza di almeno 3 coppie, tutte in ambiente di pineta (M.te Cocusso, S. Dorligo della Valle, M.te Stena; BENUSSI 2010). Nelle aree carsiche frequenta prevalentemente le zone boschive, anche pinete mature, prevalentemente nelle aree più interne e continentali, intervallate però da spazi aperti e coltivati, come ben

evidenziato nel modello dall'effetto positivo importante dello sviluppo dei margini forestali e del grado di diversità ambientale. In queste situazioni si riproduce spesso in vecchi nidi di corvidi (cornacchia grigia, ghiandaia, gazza) e rapaci (poiana, astore). Rispetto alle altre specie di rapaci notturni, ad eccezione del gufo reale, sembra meno legato agli ambienti antropizzati, comunque utilizzati, soprattutto durante l'inverno.

Si conferma, come per gli altri strigiformi, la tendenza a evitare le aree attraversate dalle strade più trafficate. Le aree a maggiore idoneità si trovano ai due estremi della ZPS, in particolare a sud di Opicina, dove il paesaggio risulta più diversificato, e, nel settore settentrionale, in prossimità delle zone umide. In base ai dati a disposizione risulta difficile quantificare l'entità della popolazione nidificante.

Enrico Benussi

Succiacapre

Caprimulgus europaeus

Specie nidificante e migratrice regolare, i primi arrivi vengono segnalati nella seconda decade di maggio mentre i movimenti verso i quartieri di svernamento avvengono prevalentemente nella seconda decade di settembre, occasionalmente oltre. Presente soprattutto nei versanti collinari più soleggiati ed asciutti, frequenta ambienti boschivi aperti e luminosi; la maggiore probabilità di presenza della specie si ha infatti per valori intermedi di copertura, anche in formazioni degradate e poco più che arbustive, sempre però in presenza di ambienti aperti, in particolare aree a landa, ma anche prati e incolti. Lo si rinviene comunemente anche in situazioni ecotonali, ad esempio lungo sentieri e strade ruderali non asfaltate, e ai margini delle doline di maggiori dimensioni (Conca d'Orle, dolina Seghini, Foiba di Basovizza ecc.). In questi ambienti la specie appare ben diffusa, con le aree maggiormente idonee concentrate prevalentemente nella parte settentrionale dell'area, tra Doberdò del Lago e Polazzo e tra Monfalcone e Medeazza, dove infatti si trovano le superfici a landa più significative.

Dati pregressi indicano la specie nidificante anche su tratti erbosi di cenge in luoghi rupestri assai ripidi della Val Rosandra ed aree esposte a W-SW di tutto il ciglione carsico, anche fino al livello del mare. Negli ambienti idonei, il succiacapre utilizza anche le aree prossime agli edificati, anche se evita quelli di maggiori dimensioni, come del resto le aree più prossime alle strade più trafficate. Non vi sono informazioni pregresse riguardo la consistenza della popolazione nidificante.

Nel 2007 in un percorso campione dalla Val Rosandra al M.te Cocusso si sono avute risposte alle stimolazioni

in 11 stazioni su 12 (BENUSSI 2008). Negli ambienti aperti del Carso goriziano si hanno le maggiori densità di coppie nidificanti, e la popolazione, di difficile quantificazione, dovrebbe essere costituita da almeno 30-40 coppie (PARODI 1999).

La riduzione progressiva della landa a discapito delle aree boscate e l'abbandono delle attività agricole e zootecniche tutt'ora in atto, potrebbero rappresentare un fattore limitante per la presenza della specie.

Enrico Benussi

Rondone comune

Apus apus

Migratore regolare, è presente nell'area della ZPS da aprile ad agosto, occasionalmente osservabile anche in settembre. Le indagini condotte hanno permesso di identificare con dettaglio la distribuzione della specie, che appare fortemente concentrata in corrispondenza dei centri urbani. Rispetto a quanto riportato da BENUSSI (1983) e Parodi e Peressin (in PARODI 1999), non sembrano emergere cambiamenti nelle aree di presenza della specie. Valori elevati di abbondanza si registrano in particolare presso Fogliano Redipuglia e Ronchi dei Legionari, nel goriziano, e in corrispondenza di Duino, Aurisina-Santa Croce e Villa Opicina in territorio triestino.

La carta dell'idoneità mostra valori piuttosto alti per buona parte del territorio della ZPS, con la sola eccezione delle aree forestali più estese, con cui infatti il modello evidenzia una relazione negativa. I risultati delle analisi, inoltre, indicano una relazione positiva con gli ambienti urbanizzati e un effetto positivo della diversità ambientale e degli ambienti agricoli, probabilmente legata ad una maggiore disponibilità di siti di nidificazione che caratterizza i piccoli centri rurali.

Paolo Bonazzi

foto S. Zanini

Rondone maggiore

Apus melba

Nidificante localizzato e migratore regolare, in primavera i movimenti risultano più evidenti agli inizi di aprile anche se i primi arrivi si registrano già in marzo. La migrazione post-riproduttiva avviene principalmente in settembre, con le ultime partenze in ottobre inoltrato. Si osserva comunemente in volo, spesso con più soggetti assieme, prevalentemente nei settori adiacenti alle colonie, tutte localizzate nella parte occidentale del Carso triestino. Si riproduce in fessure ed anfratti di pareti rocciose naturali (tratto costiero) e di origine antropica (cave attive). Sono conosciuti da tempo quattro siti riproduttivi (MICCOLI 1958; PERCO & UTMAR 1989; BENUSSI 2011), ubicati rispettivamente nella cava di Sistiana dove sono stimate circa 50 coppie, valutate nel 1982 da Perco in 300-350 (PERCO & PERCO 2011), presso la galleria naturale lungo la strada costiera (35-40 coppie), nella cava romana di Aurisina (15-20 coppie) e sui contrafforti rocciosi lungo il tratto terminale della strada Napoleonica presso Prosecco (10-15 coppie). Altre due colonie sono presenti nella vicina Slovenia, nella cavità di S. Canziano (Skocjan), e sulle pareti della valle dell'Ospo (Osp) a cui si riferiscono presumibilmente le numerose osservazioni che vengono comunemente effettuate nell'area della Val Rosandra.

Il fattore in assoluto più importante nel definire l'idoneità per la specie è risultata la distanza dalla costa, con cui evidentemente esiste una relazione negativa: la probabilità di incontrare la specie diminuisce infatti spostandosi verso l'interno. Il modello evidenzia inoltre un effetto negativo delle altre tipologie ambientali, aree agricole, ambienti aperti e boschi, mentre sembra positiva la relazione con gli ambienti urbanizzati. Questo

risultato dipende probabilmente dal fatto che le aree costiere sono anche quelle più urbanizzate. La carta del modello individua, oltre ai siti di nidificazione costieri, anche alcune località interne, dove la specie si osserva più di frequente in alimentazione.

Enrico Benussi

Martin pescatore

Alcedo atthis

Specie sedentaria, il martin pescatore nidifica nelle zone umide della porzione settentrionale della ZPS, in particolare alle Foci del Timavo e zone contermini, dove si concentra il maggior numero di osservazioni registrate nei quattro anni di indagine. Alcune segnalazioni riguardano inoltre anche i due bacini di Doberdò e Pietrarossa. La situazione attuale rispecchia fedelmente quella descritta in passato da altri autori, sia per la parte goriziana (PARODI 1999) che triestina, dove era ritenuto nidificante anche in alcuni siti costieri, precisamente nel golfo di Sistiana e in prossimità del Castello di Miramare (PETRUCCO & BENUSSI 1997).

Al di fuori della ZPS, il martin pescatore nidifica anche nella zona umida delle Noghere, nella porzione meridionale della provincia di Trieste.

Enrico Benussi

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Upupa

Upupa epops

Nidificante e migratrice regolare, è presente in Carso da marzo a settembre. L'upupa risulta distribuita prevalentemente nella parte nord-occidentale della ZPS e, in particolare, in quella centro-meridionale, soprattutto tra gli abitati di Borgo Grotta Gigante e Monrupino, tra Trebiciano e Padriciano e nei dintorni di Sales. Qui l'upupa frequenta gli ambienti a mosaico, ovvero caratterizzati da un'alternanza di aree boscate, comunque prevalenti, e aree agricole e spazi aperti, ed è qui che la specie fa registrare i valori di abbondanza più elevati. Rispetto a quanto riportato da PETRUCCO & BENUSSI (1997) per il territorio triestino, la distribuzione della specie sembra essere oggi più discontinua, in particolare nella parte settentrionale della provincia. Non sembrano invece esserci differenze con quanto riportato da Utmar per la parte goriziana (in PARODI 1999), dove la nidificazione dell'upupa era già ampiamente nota anche in un passato meno recente (SCHIAVUZZI 1887).

Dall'analisi delle preferenze ecologiche, non sembra emergere in maniera chiara una predilezione per una particolare tipologia ambientale: sia gli ambienti agricoli sia i boschi hanno infatti un effetto positivo. Sembra piuttosto emergere una preferenza per ambienti estensivi, caratterizzati dalla presenza contemporanea di aree agricole e bosco, ma non eccessivamente frammentate; un tipo di paesaggio ancora presente nella parte centro-meridionale della ZPS, dove infatti il modello individua le aree maggiormente idonee. L'upupa evita, inoltre, le aree più vicine ai centri abitati e alle maggiori vie di comunicazione, mentre non sembrano emergere particolari preferenze da un punto di vista climatico.

Tommaso Campedelli

foto A. D'Andrea

Torcicollo

Jynx torquilla

Migratore e nidificante regolare; i primi arrivi si registrano agli inizi di aprile e proseguono fino a maggio, la migrazione post-riproduttiva avviene da agosto a settembre. Nella provincia di Trieste, negli anni '80 del secolo scorso, veniva considerata specie frequente in aree coltivate e vicino ai centri abitati (BENUSSI 1983). Nello stesso periodo, nella provincia di Gorizia, la popolazione nidificante veniva stimata in almeno 60-70 coppie (PARODI 1999). Storicamente, SCHIAVUZZI (1883) lo considerava “specie estiva, nidificante, frequentissima”. Il torcicollo appare oggi meno comune rispetto anche ad un recente passato e probabilmente ha risentito delle trasformazioni ambientali, in particolare la riduzione dei coltivi a vantaggio del bosco, con una notevole perdita di habitat idoneo. La distribuzione attuale appare frammentaria con maggiori concentrazioni nel Carso goriziano; nella Riserva della Val Rosandra si stima la presenza di meno di 10 coppie nidificanti (BENUSSI 2010). La specie risulta ovunque poco abbondante.

Il torcicollo predilige situazioni caratterizzate da un elevato grado di diversità ambientale mentre evita decisamente le aree a maggiore copertura forestale. Nella ZPS è più diffuso nell'interno, lontano dalla costa, dove predilige comunque le aree meglio esposte e più calde. Il modello non evidenzia alcun effetto positivo degli ambienti agricoli, che invece dovrebbero essere particolarmente idonei per questa specie; è quindi probabile che le poche aree agricole presenti non risultino più adatte ad ospitare una specie che, ovunque nel suo areale, mostra di soffrire la scomparsa dei paesaggi agrari tradizionali, ricchi di siepi e alberature. Non è casuale

il fatto che una parte delle osservazioni si riferisca ai centri abitati di minore estensione, che rappresentano, almeno in diversi ambiti, gli unici ambienti che offrano condizioni idonee alla nidificazione del torcicollo, come ad esempio la presenza di piante di maggiori dimensioni.

Enrico Benussi

Picchio cenerino

Picus canus

Stanziale e nidificante localizzato, migratore parziale, durante l'inverno è probabile l'arrivo di soggetti svernanti. In ambiente carsico era assente come nidificante fino al 1995, quando fu trovata una coppia presso Doberdò del Lago (GO) a 10 m slm (PARODI 1999), non più riconfermata dopo il 1996. Nella provincia di Trieste è stata accertata la prima nidificazione presso il biotopo naturale delle Noghere nel 2007 a 5 m slm; in questa occasione il nido è stato costruito su un pioppo bianco, a 7,5 metri di altezza (E. Benussi ined.). Sul Carso, dal 2006 una coppia si riproduce con regolarità nel Bosco Porenta, nei pressi di Basovizza, dove ha sempre nidificato su piante di faggio; la coppia risulta essere presente tutto l'anno utilizzando di stagione in stagione i medesimi roost nel periodo invernale. I dati raccolti nell'ambito di questa indagine mostrano una distribuzione molto localizzata con poche coppie accertate: due all'interno della Val Rosandra-Moccò, una presso i boschi di Grozzana, una presso S. Servolo ed una nel Bosco Porenta. È probabilmente più diffuso ma l'elusività della specie non facilita l'individuazione dei territori.

Il modello elaborato per il picchio cenerino risente negativamente del basso numero di dati utilizzati, ed in particolare del fatto che la maggior parte delle osservazioni è concentrata nelle vicinanze di un unico sito (Bosco Porenta). Dalle analisi emerge tuttavia, abbastanza chiaramente, come la probabilità di incontrare il picchio cenerino diminuisca per valori di copertura molto elevati sia di bosco che, come più logico attendersi, di ambienti aperti. Il picchio cenerino, come è noto, utilizza un ampio spettro di ambienti, anche molto

diversi tra loro: se da un lato, per la costruzione del nido, necessita di alberi di latifoglie di grosse dimensioni, questa specie ricerca le sue prede, quasi esclusivamente formiche, a terra, frequentando regolarmente boschi con struttura aperta e radure, ma anche prati e pascoli (GORMAN 2004).

Le aree idonee alla specie sono tutte concentrate nella parte meridionale della ZPS, vicino al confine con la Slovenia, dove la specie è più diffusa (DOPPS 2013). L'invecchiamento generalizzato dei boschi ha favorito negli ultimi decenni la diffusione dei Piciformi in generale, tra cui anche questa specie tipicamente montana, fino a quote relativamente basse come quelle carsiche.

Enrico Benussi

Picchio verde

Picus viridis

Specie sedentaria nidificante, presente all'interno della ZPS durante tutto l'anno; il picchio verde risulta ampiamente diffuso in tutta l'area. Rispetto ad un recente passato, l'areale del picchio verde non sembra aver subito particolari cambiamenti (PETRUCCO & BENUSSI 1997; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999) e la specie, almeno in certi contesti, potrebbe essere stata favorita dall'espansione del bosco. SCHIAVUZZI (1883) non lo riporta tra le specie nidificanti, ma come presente solo durante la migrazione e la stagione invernale, sebbene mai abbondante. Questa specie risulta particolarmente abbondante nella porzione centro-meridionale della ZPS, in particolare nei dintorni di Basovizza e a nord di Opicina.

Il picchio verde frequenta in particolare gli ambienti ecotonali, caratterizzati dalla presenza di aree boscate, preferibilmente latifoglie, anche di ridotte dimensioni, e spazi aperti. I risultati delle analisi ecologiche evidenziano infatti una netta preferenza per situazioni caratterizzate da una elevata diversità ambientale, come evidenziato dalla relazione positiva esistente con la diversità di usi del suolo, ma anche dal fatto che le relazioni con bosco, aree urbanizzate e con le aree agricole sono, in tutti i casi, di tipo quadratico, ovvero i valori di probabilità massima di presenza della specie si hanno per valori intermedi di copertura. Un'ulteriore conferma di questa preferenza viene anche dalla relazione positiva con la variabilità altitudinale.

Un effetto interessante, positivo, sembra essere quello delle doline; queste particolari conformazioni, seppur di piccole dimensioni, ospitano molto spesso, in virtù della loro maggiore fertilità, dovuta sostanzialmente ad

una maggiore quantità di suolo che nel tempo vi si è accumulato, gli alberi di maggiori dimensioni, particolarmente idonei quindi per la costruzione del nido. Da un punto di vista climatico, il picchio verde può essere considerato mediamente mesofilo; preferisce infatti le aree caratterizzate da condizioni più continentali, quindi più interne, dove è comunque più diffuso nelle situazioni meglio esposte.

Enrico Benussi

Picchio nero

Dryocopus martius

Presente nell'area di studio durante tutto l'anno, migratore parziale, il picchio nero è segnalato come nidificante sul Carso triestino dalla fine degli anni '80, quando era considerato raro e localizzato, più diffuso e regolare come svernante. PARODI (1999) lo indica per la provincia di Gorizia erratico nei mesi invernali, molto localizzato e probabilmente nidificante. Un incremento del numero di segnalazioni in periodo riproduttivo è stato registrato negli ultimi venti anni, quando la nidificazione della specie è stata segnalata in più occasioni, fino quasi al livello del mare (Lago di Doberdò, Lago di Pietrarossa, Valle delle Noghere). Nidifica nei boschi maturi di gran parte dell'area di studio, con una maggiore diffusione nel settore centrale e meridionale, senza tuttavia risultare mai abbondante. In pinete mature (*Pinus nigra*) si riproduce solo su alberi morti da tempo, in cui la resina è completamente defluita dal tronco.

In Carso, il picchio nero mostra una certa adattabilità, almeno nella scelta delle piante nido; in cinque siti di nidificazione monitorati, ha utilizzato in due casi piante di cerro, in altrettanti di faggio e in un caso di rovere. Rispetto alla disponibilità, il picchio nero mostra una netta preferenza per le piante di faggio (Bosco Porenta), confermando quanto noto a livello nazionale (BOCCA & FALCONE 1999; COLPI et al. 2009). Nella Riserva Naturale della Val Rosandra sono attualmente conosciuti 6 territori di nidificazione ma la popolazione locale può essere stimata in almeno 8-10 coppie (BENUSSI 2010). Complessivamente, all'interno della ZPS, si stimano almeno 22-32 coppie, di cui 15-20 nel Carso triestino e 8-12 in quello goriziano.

Il modello elaborato per il picchio nero risulta coerente con le caratteristiche ecologiche della specie, confermando, entro certi limiti, una elevata adattabilità e valenza ecologica. Rispetto al picchio cenerino e al picchio verde, con i quali condivide un regime alimentare basato prevalentemente su formiche, è molto più legato al bosco, e mostra di preferire le aree forestali più estese e meno frammentate. Tuttavia, il modello evidenzia anche una relazione positiva con la diversità di uso del suolo, confermando l'utilizzo regolare di ambienti non forestali, attivamente frequentati per la ricerca delle prede. Le aree maggiormente idonee sembrano concentrate nella parte sud-orientale della ZPS e lungo il confine; nel Carso goriziano, come detto, è abbastanza concentrato attorno ai laghi di Doberdò e Pietrarossa. La specie, considerata in aumento e favorita dall'invecchiamento dei boschi, non sembra avere a livello locale problemi di conservazione.

Enrico Benussi

Picchio rosso maggiore

Dendrocopos major

Specie sedentaria nidificante, il picchio rosso maggiore è osservabile all'interno della ZPS durante tutto l'anno. Tra le specie più comuni in assoluto e primo per numero di contatti tra i piciformi, il picchio rosso maggiore è ampiamente distribuito ovunque, situazione che non sembra essere cambiata almeno negli ultimi decenni (PETRUCCO & BENUSSI 1997; PARODI 1999), anche se mostra alcuni picchi di densità, in particolare nei settori orientali e meridionali della ZPS, dove infatti la specie fa registrare i valori di abbondanza maggiori. Come anche per il picchio verde, SCHIAVUZZI (1883) non riporta questa tra le specie nidificanti ma esclusivamente tra quelle di passo e svernanti, sebbene mai abbondante.

Le analisi ecologiche evidenziano una netta preferenza per le aree boscate, comprese le pinete, specialmente se localizzate in aree più continentali, quindi lontano dall'influenza del mare, e con esposizione verso quadranti settentrionali (tra le aree risultate maggiormente idonee vi sono infatti le aree di confine con la Slovenia). È interessante notare come la probabilità di presenza della specie aumenti in prossimità delle aree agricole e diminuisca invece in corrispondenza degli altri ambienti aperti, quali i pascoli e gli arbusteti.

La presenza della specie nei sistemi agricoli, diffusa in particolare in quelli più diversificati e con presenza di boschetti e alberature, è nota anche a scala nazionale, in particolare per le regioni settentrionali (CAMPEDELLI et al. 2009). Coerentemente, il modello fa registrare i valori più elevati di idoneità nella parte meridionale della ZPS, dove è maggiormente presente questa tipologia ambientale. Il picchio rosso maggiore

mostra di tollerare bene il disturbo antropico ed è presente comunemente anche nelle aree limitrofe ai centri abitati di maggiori dimensioni, mentre sembra risentire del disturbo provocato dalle arterie stradali più trafficate.

Enrico Benussi

Picchio rosso minore

Dendrocopos minor

Sedentario e nidificante, indicato in passato per la provincia di Trieste e Gorizia come migratore e svernante irregolare (PERCO & UTMAR 1989). Fino alla fine degli anni '90 considerato molto localizzato in alcuni ambienti della provincia di Gorizia, con una popolazione stimata in 5-10 coppie (PARODI 1999). Un progressivo incremento numerico si è riscontrato, un po' in tutto il Carso, a partire dagli inizi degli anni 2000, probabilmente favorito dal continuo avanzamento e maturazione del bosco. Da uno studio compiuto nella Riserva della Val Rosandra è emersa la presenza di non meno di 8-10 coppie, distribuite in tutti gli ambienti forestali maturi (BENUSSI 2010), anche nelle periferie di centri abitati.

Specie elusiva e caratterizzata da una fenologia riproduttiva molto precoce, il picchio rosso minore è, probabilmente, molto più diffuso di quanto mostrato in cartina. Nel corso dell'indagine sono state seguite tre coppie nidificanti per più annate (Bosco Porenta, Bosco Keller e Doberdò del Lago); la costruzione dei nidi è avvenuta su piante, in parte o completamente morte, di faggio (4), pioppo bianco (1), cerro (1) e roverella (2), a un'altezza media di 5,4 metri; la deposizione è avvenuta tra la seconda e la terza settimana di aprile mentre gli involi sono avvenuti nell'ultima decade di maggio-primi di giugno. Nel caso del Bosco Porenta, una particella sperimentale di un ettaro di bosco la cui essenza dominante è il faggio, la specie vive in simpatria, senza apparenti problemi di territorialità, con altre coppie di Piciformi quali il picchio nero (1), picchio rosso maggiore (3), picchio verde (1) e picchio cenerino (1).

Come noto, il picchio rosso minore è, tra i piciformi, almeno per quanto riguarda la ricerca delle prede, quello probabilmente più legato alla presenza di legno morto. Sebbene, come detto in precedenza, la distribuzione di parte dei dati sembra confermare questo aspetto dell'ecologia della specie (boschi maturi al confine della Slovenia e altre limitate situazioni), il modello evidenzia anche una relazione positiva con gli ambienti urbanizzati, intorno ai quali sono state raccolte numerose osservazioni. Come per il torcicollo, specie comunque meno forestale, questi ambienti, fatta eccezione per i casi di cui sopra, sembrano gli unici a offrire condizioni idonee alla riproduzione della specie, in particolare la presenza di alberi di grosse dimensioni, spesso con parti morte o senescenti, come ad esempio le piante ornamentali di castagno e querce che sovente arredano i giardini.

Enrico Benussi

Cappellaccia

Galerida cristata

Specie sedentaria, presente in Carso in maniera molto localizzata e probabilmente irregolare, almeno durante il periodo riproduttivo; nell'ambito di questa indagine la presenza della cappellaccia è stata accertata in una sola occasione. Il dato, riferito ad un individuo in canto rilevato il 1 giugno 2012, riguarda l'area della cassa di colmata del Lisert. Considerata storicamente nidificante sedentaria e "mediocrementemente abbondante" (SCHIAVUZZI 1883), più recentemente altri autori ne riportano la presenza in Carso per due sole località, una appunto presso le foci del Timavo e l'altra, poco distante dal confine sloveno, nei pressi dell'abitato di Grozzana (FELCHER et al. 1991). Per quanto riguarda la parte Goriziana, PARODI (1999) conferma la presenza della specie nella stessa località, mentre per il Carso Triestino, PETRUCCO & BENUSSI (1997) non confermano la presenza a Grozzana ma riportano alcune osservazioni per la parte a sud di Trieste, tra cui un caso di nidificazione certa nei pressi dello stabilimento Italcementi; per la stessa area esiste, tra l'altro, un'altra osservazione, non riferita però al periodo riproduttivo (SAVA 2013).

Se si esclude l'area del Lisert, dove comunque la presenza della specie è evidentemente legata al regime idrico, sono pochissime le zone idonee per questa specie, che, come noto, predilige ambienti caratterizzati da una scarsa copertura vegetazionale, come possono esserlo appunto i piazzali dei cantieri. La capacità di questa specie di colonizzare ambienti artificiali, anche effimeri, è del resto ben nota e trova qui ulteriore conferma.

Guido Tellini Florenzano

foto G. Colombo

Tottavilla

Lullula arborea

Stanziale, comune durante la migrazione e svernante con un buon numero di individui, distribuiti prevalentemente presso i coltivi, le aree prative e le zone a landa cespugliata del Carso. È assente negli ambienti a maggiore copertura arborea e nelle aree forestali continue e di maggiori dimensioni. La tottavilla appare distribuita in modo omogeneo in gran parte della ZPS, confermando sostanzialmente quanto riportato in PARODI (1999) e BENUSSI (1983). Parodi riporta di tentativi di nidificazione anche in ambiente costiero, nella cassa di colmata del Lisert, dove la presenza della specie è stata confermata anche nell'ambito di questa indagine (un individuo in canto nel mese di giugno 2012).

Nella Riserva Naturale della Val Rosandra si stima un numero di coppie probabilmente inferiore a 15, concentrate presso i coltivi e le aree prative di Grozzana e Pese, le pendici del M.te Concusso e le residue zone a landa presenti sul Monte Stena (BENUSSI 2010). Queste zone, assieme agli ambienti aperti presenti nella parte settentrionale dell'area, fanno registrare i valori di abbondanza più elevati. Complessivamente, per l'intera ZPS, si stima la presenza di circa 60 coppie, distribuite in maniera piuttosto omogenea in tutti gli ambienti idonei.

Il modello ecologico elaborato per la tottavilla conferma l'importanza degli ambienti aperti ed evidenzia una relazione negativa con gli ambienti forestali più estesi e continui, i valori di idoneità più bassi si trovano infatti nelle aree più orientali, relazione che diviene invece positiva per percentuali di copertura più basse. È noto infatti come la tottavilla prediliga situazioni caratterizzate da un elevato grado di eterogeneità ambientale.

Le analisi evidenziano inoltre un effetto positivo dello sviluppo dei margini forestali, anche questa una misura di diversità ambientale e un effetto negativo degli ambienti urbanizzati, da cui la specie si tiene lontana. Non sembra invece emergere una precisa caratterizzazione climatica delle aree più idonee; la tottavilla sembra infatti preferire situazioni intermedie, mediamente termofile. Negli ultimi anni la specie appare in sensibile diminuzione, almeno nel Carso italiano, mentre appare ancora molto comune in quello sloveno, dove è favorita da una maggiore presenza di aree coltivate e pascolate.

Simonetta Cutini

Allodola

Alauda arvensis

Specie nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante, storicamente era considerata abbondante da SCHIAVUZZI (1883), soprattutto nei campi coltivati a cereali. Alla fine degli anni '80 del secolo scorso, la distribuzione della specie sul Carso appare ancora abbastanza continua e uniforme (BENUSSI 1983; PERCO & UTMAR 1989). A distanza di poco più di un decennio, la distribuzione dell'allodola appare già molto più frammentaria (PETRUCCO & BENUSSI 1997; PARODI 1999). I dati raccolti in questo studio evidenziano una drastica riduzione dell'areale della specie con pochissime coppie rimaste ai due estremi nord e sud della ZPS, rispettivamente nelle zone aperte tra Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari e Doberdò del Lago, oltre che nelle colline tra Duino e Medeazza, e, nella porzione meridionale, in corrispondenza della landa di Banne, sul M.te Stena e nella piana di Pese e Grozzana.

Il modello ecologico evidenzia il contributo di un solo fattore, ovvero gli ambienti aperti, selezionati positivamente dall'allodola. Il modello individua sostanzialmente tre aree particolarmente idonee per la specie, una nella porzione nord-ovest della ZPS, abbastanza estesa, e altre due aree, di dimensioni più ridotte, nei dintorni di Duino e Medeazza e, a sud-est, tra San Dorligo della Valle e il confine sloveno. La popolazione nidificante all'interno della ZPS può essere stimata in non più di 10 coppie, con una tendenza alla diminuzione tuttora in corso; aree in cui la presenza della specie era considerata, fino a pochi anni fa, regolare, risultano oggi occupate in modo saltuario (landa di Banne, M.te Stena).

Gianpiero Calvi

foto S. Zanini

Rondine

Hirundo rustica

Nidificante e migratrice regolare, presente da aprile all'autunno inoltrato. Specie decisamente antropofila, la rondine risulta distribuita principalmente in ambiente agricolo e nelle periferie dei centri urbani di piccole dimensioni, dove la matrice agricola è ancora predominante. La specie è più diffusa nella porzione centrale della ZPS, in particolare nelle zone di Duino, Malchina, Slivia, Aurisina e Gabrovizza, dove si registrano i valori di abbondanza maggiori. La specie è comune anche in alcune aree del goriziano, presso Ronchi dei Legionari e le alture di Polazzo, e nella porzione meridionale della ZPS, nella zona di Gropada e nei dintorni di Basovizza. Come tutte le specie legate ad ambienti urbani, la rondine è per lo più concentrata nelle aree esterne alla ZPS e infatti le aree più idonee identificate dal modello si trovano principalmente a ridosso dei confini interni.

Dall'analisi delle preferenze ecologiche emerge chiaramente il carattere sinantropico della specie; i fattori più importanti che ne influenzano la presenza sono, in senso negativo, la presenza del bosco e, in senso positivo, la presenza di centri abitati, soprattutto di piccole dimensioni.

Sebbene manchino dati precisi, rispetto a quanto riportato da BENUSSI (1983), PETRUCCO e BENUSSI (1997) e da Candotto et al. (in PARODI 1999), è probabile che la rondine sia oggi meno diffusa e soprattutto molto meno abbondante; l'abbandono delle attività agricole, e zootecniche in particolare, ha determinato una riduzione importante della disponibilità dei siti di nidificazione, in particolare per una specie che "*nidifica specialmente nelle stalle e sotto le tettoje*" (SCHIAVUZZI 1883).

Severino Vitulano

foto S. Candotto

Rondine rossiccia

Cecropis daurica

Nidificante irregolare, rara e localizzata, fino a pochi anni fa si conoscevano solo due casi di nidificazione per la Regione Friuli Venezia Giulia, una in provincia di Udine (GENERO 1983) e una, appunto, nel Carso triestino, in Val Rosandra (BENUSSI 1991). Qui la nidificazione della rondine rossiccia è stata accertata per la prima volta nel 1988, anche se molto probabilmente la specie si era già riprodotta anche negli anni precedenti. Il nido era stato costruito alla base di una parete rocciosa a strapiombo alta circa 60 metri. Dopo un ulteriore tentativo, peraltro fallito, portato avanti nel 1989, la specie non si è più riprodotta all'interno della ZPS.

Nell'ambito di questa indagine, nelle stagioni 2012 e 2013, è stata accertata la nidificazione di una coppia; in entrambi i casi, il nido è stato costruito sotto l'arcata di un ponte, nei pressi del fiume Timavo, appena fuori dai confini della ZPS. Nel 2013 risultavano presenti due nidi, anche se solo uno correntemente utilizzato; è molto probabile che l'altro fosse un residuo dell'anno precedente. Numerose osservazioni di individui in alimentazione sono state effettuate in tutta l'area circostante, in particolare lungo le fasce di canneto che bordano il corso del fiume, fino al Villaggio del Pescatore.

Enrico Benussi

foto P.L. Tàiarol

Balestruccio

Delichon urbicum

Il balestruccio nella ZPS è specie nidificante migratrice regolare, e mostra una distribuzione legata alla presenza dei centri urbani. Definita frequentissima da SCHIAVUZZI (1883), in tempi più recenti è considerata in diminuzione a causa del massiccio uso di insetticidi in agricoltura (FELCHER et al. 1991), sebbene sia ancora comune e ben diffusa nell'area (BENUSSI 1983; Candotto e Parodi in PARODI 1999). La specie è presente soprattutto nella zona centrale della ZPS e lungo la costa, mentre nuclei più interni sono localizzati in corrispondenza dei principali centri abitati. Le concentrazioni maggiori si registrano presso l'area di Ronchi dei Legionari, Duino, Aurisina e Grignano-Villa Opicina. Nella porzione meridionale della ZPS la specie appare meno diffusa.

Il balestruccio mostra una netta preferenza per le aree urbanizzate in generale - e in particolare per i centri abitati di più piccole dimensioni - inseriti in un contesto ambientale diversificato, spesso caratterizzati da una maglia urbana discontinua. Il modello individua inoltre un effetto negativo degli ambienti forestali. Le aree a più alta idoneità risultano concentrate nella parte settentrionale della ZPS, anche se è opportuno ricordare che il perimetro dell'area protetta non comprende al proprio interno i centri abitati, anche quelli di piccole dimensioni, e quindi l'area protetta risulta, almeno per quanto riguarda la localizzazione dei siti di nidificazione della specie, di importanza marginale.

Gianpiero Calvi

foto R. Castellani

Calandro

Anthus campestris

Regolarmente osservabile durante le migrazioni (aprile-metà maggio e metà agosto-metà ottobre), il calandro è invece molto localizzato come nidificante. In passato SCHIAVUZZI (1883) lo descrive come “*specie non molto frequente*”. Già ritenuto raro e presente solo in alcune zone a landa nella provincia di Trieste da BENUSSI (1983), PARODI (1999) stima in 10-20 coppie, concentrate in alcuni ambienti aperti xerici, la popolazione nidificante nell’intera provincia di Gorizia.

In Carso lo si rinviene nei pochi ambienti aperti o a landa, con vegetazione più rada, prevalentemente nelle superfici pascolate o quelle che sono state interessate da incendi. Una recente indagine ha evidenziato la presenza di 2-3 coppie nella landa carsica della Riserva Naturale della Val Rosandra presso il M.te Stena e presso l’abitato di Pese/Grozzana (BENUSSI 2010), presenze confermate sia nel 2011 sia nel 2012, mentre nel 2013 era presente una sola coppia. La riproduzione della specie è stata accertata, nel 2013, anche nell’area di Banne, sempre in ambiente di landa, dove un individuo adulto è stato osservato il 18 giugno con l’imbeccata. La popolazione attualmente nidificante all’interno della ZPS può essere stimata in 10-15 coppie.

Il modello elaborato per il calandro evidenzia sostanzialmente tre fattori ambientali che sembrano influenzare più di altri la presenza della specie: la distribuzione degli ambienti aperti, positivamente selezionati, e gli ambienti urbanizzati e, soprattutto, quelli forestali, che invece sembrano avere un effetto negativo.

Da un punto di vista climatico, emerge una preferenza per le aree esposte a nord, risultato che deve essere interpretato con cautela, in quanto, probabilmente,

più che a una reale preferenza della specie, potrebbe essere dovuto al limitato numero di dati utilizzati per la costruzione del modello (le poche aree idonee sono praticamente tutte esposte a nord). La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole ed è tuttora minacciata dalla perdita di habitat adatto in tutte le aree carsiche.

Enrico Benussi

Cutrettola

Motacilla flava

Presente nell'area di studio regolarmente durante la migrazione, nell'ambito di questa indagine è stato raccolto un solo dato ascrivibile a un possibile caso di nidificazione, un individuo in canto a fine aprile all'interno della colmata Lisert presso le Foci del Timavo. A livello regionale, durante il periodo riproduttivo, la cutrettola frequenta abitualmente i margini degli ambienti umidi, anche salmastri, oltre che aree coltivate di pianura, purché in ambienti di bonifica o comunque caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale. L'ambiente della colmata appare quindi idoneo alla specie e del resto già Felcher et al. (in PARODI 1999) indicano come possibile la nidificazione della specie, dato più recentemente confermato anche da UTMAR (2013).

Non riportata tra le specie nidificanti in provincia di Trieste da BENUSSI (1983).

Guglielmo Londi

foto M. Basso (archivio MFSN)

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

Specie nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante, mostra una distribuzione ridotta e molto localizzata nella ZPS: nel settore nord la nidificazione appare probabile solo presso il Lago di Doberdò, mentre alcuni individui sono stati rilevati intorno alla zona del Lago delle Mucille. La nidificazione appare inoltre probabile nella zona del Villaggio del Pescatore a Duino, dove la ballerina gialla frequenta la zona dei bacini e del canale esterno. L'altra area di presenza della specie è costituita dalla val Rosandra, nell'estrema porzione meridionale della ZPS, dove nidifica lungo il Torrente Rosandra che, con il suo corso irregolare che si snoda tra le rocce, risulta particolarmente idoneo alla specie. La distribuzione rilevata nell'ambito di questo studio, sembra ricalcare, almeno per le aree a maggiore concentrazione della specie, quella proposta da **BENUSSI (1983)** e **PARODI (1999)**.

L'analisi delle preferenze ecologiche mostra come la ballerina gialla prediliga principalmente zone ad alta diversità ambientale e topograficamente eterogenee, essendo strettamente legata a zone umide non molto estese, come piccoli corsi d'acqua, spesso con una certa escursione altimetrica. Fattori come la presenza delle doline, diffuse sull'altopiano, quindi in aree prive di acqua superficiale, gli spazi agricoli e le aree esposte a sud e con microclima troppo secco sono invece correlati negativamente alla presenza della specie. Il modello conferma la distribuzione molto localizzata della ballerina gialla, evidenziando poche e circoscritte aree a più elevata idoneità: a nord, tra Ronchi dei Legionari e Monfalcone e nei pressi di Duino-Aurisina, a sud nei pressi di San Dorligo della Valle-Dolina.

Severino Vitulano

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Ballerina bianca

Motacilla alba

Specie sedentaria nidificante e migratrice regolare, la ballerina bianca è osservabile all'interno della ZPS durante tutto il corso dell'anno. Comune e ben diffusa in tutta l'area, in particolare lungo la costa e nella parte centrale dell'altopiano, manca quasi del tutto dalle porzioni più orientali della ZPS, caratterizzate dalla presenza di estese e continue formazioni forestali. La specie evita particolarmente anche le aree più aride, come le tipiche formazioni arbustive dominate dallo scotano e la landa, ancora ben rappresentate nella porzione nord-occidentale della ZPS e dove infatti la specie appare molto meno diffusa. Numerose segnalazioni riguardano invece i centri abitati, in realtà esterni alla ZPS, e le aree limitrofe. La distribuzione attuale della specie sembra ricalcare quella descritta da Felcher e Zorzenon (in PARODI 1999) e PETRUCCO & BENUSSI (1997); entrambi consideravano la specie comune, ampiamente distribuita su tutto il territorio, come del resto indicato anche da SCHIAVUZZI (1883) per la fine del XIX secolo.

Il modello elaborato per la ballerina bianca, oltre a confermare una relazione negativa con la presenza degli ambienti aperti e forestali più estesi e continui, evidenzia un effetto positivo di coperture intermedie di ambienti urbanizzati. Sono infatti preferiti quelli di minori dimensioni e con una maglia urbana abbastanza larga, dove trovano ancora spazio tra gli edifici piccole aree agricole e a vegetazione naturale. In definitiva la specie è legata a situazioni particolarmente diversificate, dove non vi è una netta prevalenza di alcuna tipologia in particolare. Questa preferenza è, del resto, ben visibile analizzando la carta dell'idoneità territoriale; i valori più

elevati si riscontrano infatti nelle aree limitrofe ai centri abitati, in particolare nella parte interna e centro-meridionale della ZPS, dove i paesi, tendenzialmente più piccoli, sono sovente circondati da una maglia agraria ancora abbastanza diversificata. I valori massimi di abbondanza si registrano invece in pochi quadrati posti nella porzione settentrionale dell'area protetta.

Tommaso Campedelli

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus

Migratore irregolare e nidificante localizzato, il merlo acquaiolo è risultato presente solo in Val Rosandra. Le prime segnalazioni risalgono al 2007 e 2008, con un soggetto rinvenuto svernante, e probabilmente nidificante, nel tratto a monte del Torrente Rosandra. Nessun dato pregresso è disponibile. Nel 2009 è stata accertata la nidificazione di una coppia in un anfratto roccioso a pochi metri dall'acqua nei pressi della cascata a NW dell'abitato di Bottazzo. Stessa situazione nel 2010, quando quattro giovani involati sono stati osservati mentre venivano imbeccati dagli adulti il 22 maggio (BENUSSI 2010); è ipotizzabile che la deposizione sia avvenuta alla fine di marzo. Nidificazione riconfermata nel medesimo luogo l'anno successivo. La specie non si è riprodotta nel 2012 e 2013, probabilmente condizionata dalla scarsità d'acqua del Torrente Rosandra in relazione ad inverni siccitosi. Interessante la nidificazione a livelli altitudinali piuttosto bassi (178 m slm) per una specie che, altrove, è tipicamente diffusa in corsi d'acqua pedemontani e montani.

Nel goriziano, Utmar (in PARODI 1999) indica la specie come presente regolarmente durante l'inverno lungo il corso dell'Isonzo, dove è stato riconfermato anche di recente (UTMAR 2013), e in alcuni corsi d'acqua vicini nella zona di Sagrado.

Enrico Benussi

foto L. Lapini (archivio MFSN)

Scricciolo

Troglodytes troglodytes

Migratore regolare, svernante comune e ben diffuso in tutti il territorio della ZPS, è nidificante localizzato. Fino ad ora, in provincia di Gorizia, la nidificazione della specie è stata accertata in alcuni ambienti del Collio e nella zona carsica più settentrionale, in aree con esposizione a nord, più riparate e fresche, dove si stima la presenza di una popolazione di 20-30 coppie (Parodi e Peressin in PARODI 1999). Nel corso dello studio è stato contattato presso il lago di Doberdò un soggetto in canto l'08/06/2012. La nidificazione dello scricciolo sul Carso triestino, dove comunque risulta presente, e abbondante, fino a primavera inoltrata (Opicina il 27/04/2010), non solo nelle aree boscate ma anche in ambienti eterogenei e antropizzati, non è mai stata invece confermata. L'ambiente secco e l'assenza di acqua sembrano essere fattori limitanti. Un dato interessante nel corso dell'indagine è relativo ad un maschio in canto il 16 giugno 2013 nei boschi di Grozzana nella parte più meridionale della ZPS.

Lo scricciolo si riproduce in territorio sloveno a poca distanza, sul M.te Castellaro, e non è quindi da escludere la possibilità che nidifichi anche in territorio italiano. Assente anche in Val Rosandra che, per la presenza d'acqua superficiale e ambienti freschi, sembrerebbe invece uno dei pochissimi siti idonei.

Enrico Benussi

foto S. Candotto

Pettirosso

Erithacus rubecula

Specie nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante, già considerata comune e ben diffusa in buona parte dell'altopiano carsico (BENUSSI 1983; PETRUCCO & BENUSSI 1997; Candotto e Parodi in PARODI 1999), il pettirosso mostra una distribuzione piuttosto differente tra la parte goriziana, dove risulta meno diffuso e concentrato per lo più attorno ai laghi e nelle foreste a nord di Jamiano, e la parte triestina, dove, invece, la sua distribuzione è più continua. Anche nel triestino sono, tuttavia, evidenti aree in cui la specie si concentra maggiormente, e che corrispondono, sulla costa, ai boschi tra Santa Croce e Grignano, nell'interno, all'area del Monte Lanaro e in generale ai rilievi meridionali della ZPS.

Secondo il modello di idoneità ambientale, il pettirosso mostra una netta preferenza per le zone con copertura arborea continua, densa e ricca di sottobosco, mentre evita le aree urbane, le zone agricole e gli ambienti aperti di maggiori dimensioni: i valori più bassi di idoneità si registrano infatti in corrispondenza delle aree a landa più estese, in particolare nel goriziano.

Gianpiero Calvi

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Usignolo

Luscinia megarhynchos

Nidificante e migratore regolare, presente da aprile a settembre, l'usignolo appare ben distribuito all'interno della ZPS, dove manca solo dalle aree boscate più estese e continue. La distribuzione che emerge dai dati raccolti in questa indagine non sembra discostarsi troppo da quanto indicato da BENUSSI (1983) per il territorio triestino. Per quanto riguarda invece il territorio goriziano, rispetto a quanto riportato da Candotto e Parodi (in PARODI 1999), sembra che l'usignolo sia oggi più diffuso, soprattutto lungo la fascia costiera, dove comunque non risulta mai abbondante. I valori di abbondanza maggiori si registrano infatti negli arbusteti e nelle boscaglie aperte più estese della parte settentrionale della ZPS, oltre che tra Gabrovizza e Sgonico e nei dintorni di Rupinpiccolo nella parte centrale dell'area. Sulla costa, l'unica area con valori di abbondanza paragonabili a quelli citati per l'interno si trova nella zona di Grignano.

L'usignolo preferisce gli ambienti aperti, in particolare gli arbusteti, e le aree umide, selezionando positivamente la presenza di piccole porzioni di habitat forestale. Evita invece le aree a copertura boscosa più estesa e i conglomerati urbani, così come le porzioni di territorio con maggior variabilità altitudinale. È una delle specie più abbondanti nelle fasce di vegetazione ripariale. La carta del modello evidenzia in maniera abbastanza chiara le aree più idonee, escludendo tutta la parte orientale, dove si trovano le aree forestali più estese, e parte di quella meridionale, confermando invece la parte settentrionale come la più idonea in assoluto.

Gianpiero Calvi

foto: F. Florit

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

Osservabile durante tutto l'anno, è nidificante, migratore regolare e svernante parziale. Rispetto a un recente passato, quando la specie era considerata estremamente localizzata, sia nel Carso goriziano (PERCO & UTMAR 1989; Parodi e Peressin in PARODI 1999) sia in quello triestino, dove non era stata neanche confermata la nidificazione (BENUSSI 1983), il codirosso spazzacamino appare oggi molto più diffuso e, in presenza di condizioni ambientali idonee, anche abbondante. Il promontorio di Sistiana, le cave di Aurisina e gli agroecosistemi nei dintorni di Jamiano e di Repen, sono le aree in cui si registrano i valori massimi di densità.

Il modello d'idoneità ambientale mostra una distribuzione delle aree idonee molto più localizzata rispetto a quello che emerge dalla distribuzione dei dati di presenza. Questo dipende probabilmente dal fatto che molte delle aree più idonee risultano esterne alla ZPS; il codirosso spazzacamino mostra infatti una preferenza per i centri abitati, specialmente quelli di più piccole dimensioni, inseriti in contesti ambientali diversificati. Il modello evidenzia inoltre un effetto negativo del bosco e degli ambienti aperti in generale, in particolare in quelle situazioni in cui queste tipologie ambientali diventano preponderanti. Il codirosso spazzacamino predilige inoltre gli ambienti rupestri, dove spesso è la specie più comune, preferenza evidenziata dalla relazione positiva con la deviazione standard dell'altitudine, una misura della variabilità altitudinale, e quindi morfologica, del territorio.

Jacopo Tonetti

foto F. Florit

Codirosso comune

Phoenicurus phoenicurus

Abbastanza frequente durante la migrazione (prevalentemente aprile e da agosto fino agli inizi di ottobre), è invece estremamente localizzato come nidificante. Non inserito nelle specie nidificanti nella provincia di Trieste fino alla fine del secolo scorso (BENUSSI 1983; PETRUCCO & BENUSSI 1997), in provincia di Gorizia la nidificazione della specie era ritenuta dapprima solo probabile (PERCO & UTMAR 1989) e solo successivamente accertata, peraltro con pochi casi tutti in ambito urbano (PARODI 1999).

Nell'ambito di questa indagine sono state raccolte più osservazioni in periodo riproduttivo, anche se la nidificazione della specie è stata fino ad ora accertata solo in due località del Carso triestino (cava di Monrupino una coppia il 06/05/2012, località già conosciuta dal 2008; Banne, presso le caserme dismesse il 25/04/2010 presenza di una coppia e l'08/05/2010 nido in costruzione). Vi è inoltre una segnalazione di possibile nidificazione presso l'abitato di Sgonico il 23/06/2010 (UTMAR 2013).

Ulteriori dati si riferiscono a possibili nidificazioni presso il Villaggio del Pescatore (maschio in canto il 20/05/2011) e presso il porticciolo di Duino (maschio in canto il 06/05/2012). In ambiente carsico risulta poco diffuso anche in Slovenia (DOPPS 2013). In passato lo SCHIAVUZZI (1883) cita la specie come "*specie di migrazione autunnale, frequentissima*".

Da un punto di vista ecologico, la specie mostra una netta preferenza per gli ambienti urbanizzati, quando tuttavia questi non rappresentano l'unica tipologia ambientale presente e sono inseriti in mosaici ambientali con presenza di ambienti agricoli e forestali; il codirosso

foto F. Florit

comune manca infatti dai centri abitati di maggiori dimensioni. Da un punto di vista climatico la specie sembra preferire condizioni più continentali.

Enrico Benussi

Stiaccino

Saxicola rubetra

Osservabile regolarmente in Carso durante la migrazione, lo stiaccino nidifica in Friuli Venezia Giulia quasi esclusivamente nell'area alpina e pre-alpina, con pochi e irregolari casi di nidificazione segnalati a quote più basse (BRICHETTI & FRACASSO 2008). A uno di questi casi eccezionali potrebbe riferirsi la segnalazione di un individuo osservato, con imbeccata, in data 22 giugno 2010 in un ambiente di landa nei pressi dell'abitato di Borgo Grotta Gigante, a circa 300 metri di altitudine.

Anche storicamente la specie era considerata esclusivamente di passo (SCHIAVUZZI 1883), sebbene secondo EGGENHÖFFNER (1842) sarebbe stata da annoverare tra quelle nidificanti in territorio triestino. La specie è indicata come nidificante nel Carso sloveno (DOPPS 2013).

Tommaso Campedelli

foto R. Parodi (archivio MFSN)

Saltimpalo

Saxicola torquatus

Nidificante sedentario e migratore regolare, presente in Carso durante tutto l'anno. Il saltimpalo mostra una distribuzione piuttosto concentrata; la stragrande maggioranza delle osservazioni si riferisce infatti alla parte nord-occidentale della ZPS, in particolare tra il Lago di Doberdò e Polazzo. Quest'area è di gran lunga la più importante per gli uccelli che nidificano negli ambienti aperti. In questa zona il saltimpalo appare ancora relativamente diffuso (vedi anche carta dell'abbondanza), in particolare nelle aree di margine tra le zone pascolate e gli arbusteti, specie quelli di più recente formazione, sviluppatasi a seguito dei grossi incendi che hanno interessato l'area negli scorsi anni. Le altre osservazioni si riferiscono a individui o coppie isolate, osservate in corrispondenza delle aree agricole più diversificate, ad esempio nei pressi degli abitati di Rupinpiccolo e Ceroglie, e nella landa di Banne, uno degli ultimi lembi rimasti di questo particolare ambiente. La specie è segnalata anche nella cassa di colmata del Lisert, anche se è verosimile che la presenza del saltimpalo in quest'area sia fortemente influenzata dal regime idrico.

In un recente passato, almeno in provincia di Trieste, la specie doveva essere molto più diffusa e abbondante. PETRUCCO & BENUSSI (1997) la indicano come relativamente comune, in particolare nella porzione meridionale della provincia di Trieste: nella stessa area, nell'ambito di questa ricerca, è stata registrata, invece, una sola segnalazione, poco a sud di Basovizza. Non sembrano esserci invece particolari cambiamenti per quanto riguarda la parte goriziana (Guzzon in PARODI 1999).

Il modello ecologico evidenzia una preferenza, del resto ben nota, per gli ambienti aperti, in particolare quelli più diversificati, ad esempio con presenza di arbusti, e localizzati preferibilmente in aree caratterizzate da condizioni climatiche più continentali: la probabilità di presenza della specie aumenta infatti allontanandosi dalla costa e in zone esposte a nord. Il modello evidenzia anche un effetto negativo del bosco, degli ambienti urbanizzati e degli ambienti agricoli, almeno di quelli in cui è preponderante la presenza della vite e dell'olivo, colture non particolarmente adatte a questa specie. Tra le aree più idonee risultano invece i paesaggi agricoli della porzione meridionale della ZPS, dove sono ancora diffuse coltivazioni di tipo erbaceo.

Guido Tellini Florenzano

Passero solitario

Monticola solitarius

Specie erratica nel periodo invernale, nidificante in varie località del Carso triestino, principalmente lungo la costa, ma anche in cave attive e dismesse dell'interno ed in Val Rosandra. Sembra assente nella parte goriziana. Parodi e Peressin (in PARODI 1999) segnalano la specie solo in tre località della provincia di Gorizia, esclusivamente all'interno di cave.

Nell'ambito di questo studio è stata confermata la presenza di 2-3 coppie nel tratto costiero Duino-Sistiana, una presso la galleria naturale nella costiera triestina, ed almeno 2 coppie sui contrafforti rocciosi della strada Napoleonica (Prosecco). All'interno risulta localizzato nelle cave romane di Aurisina (1-2 coppie) e in quella di Monrupino (1 coppia). In Val Rosandra nidifica con 3-4 coppie, presso l'abitato di Bagnoli della Rosandra (nella cava abbandonata) fino alle zone più interne della valle. I siti riproduttivi sono tutti localizzati nei versanti meglio esposti, in condizioni termofile. Si è riprodotto fino al 2007 nella Cava Faccanoni (BENUSSI 2011). Nel 2008 un nido studiato in Val Rosandra, posto in una cavità della roccia, si trovava a meno di 20 metri da un nido attivo di falco pellegrino con tre pulli; la coppia ha portato regolarmente a termine la riproduzione (E. Benussi, E. Prall oss. pers.).

All'interno della ZPS, il passero solitario frequenta esclusivamente ambienti rupestri, a differenza di quanto succede in altre parti d'Italia, dove la specie si riproduce comunemente anche nei centri abitati (BRICCHETTI & FRACASSO 2008). Il modello evidenzia bene questa specificità e infatti la variabilità altitudinale, che, come già detto, identifica proprio le aree più ricche di pareti e affioramenti rocciosi, tra cui anche le cave

di maggiori dimensioni, è quella più importante. Gli ambienti urbanizzati forniscono invece un modesto contributo. Per il resto, il passero solitario si conferma specie termofila, legata qui in particolare agli ambienti costieri, e comunque meglio esposti, soprattutto nei siti più interni come la Val Rosandra. Il modello evidenzia inoltre una relazione positiva con la diversità di uso del suolo, risultato che deve essere letto probabilmente più come una caratteristica intrinseca degli ambienti morfologicamente diversificati, piuttosto che a una reale preferenza della specie.

Enrico Benussi

Merlo

Turdus merula

Nidificante sedentario, migratore e svernante regolare; durante la stagione invernale si aggiungono alle popolazioni locali contingenti provenienti dall'Europa centro-orientale. È risultata in assoluto la specie più comune e diffusa, presente in qualsiasi tipo di ambiente, compresi parchi e giardini, campi coltivati con siepi, ambienti aperti carsici e boschi. La distribuzione della specie non mostra alcuna differenza rispetto a quanto riportato da BENUSSI (1983), PETRUCCO & BENUSSI (1997) e PARODI (1999). Il merlo, rilevato in tutti i quadrati indagati, è risultato particolarmente abbondante in alcune aree costiere (Aurisina, Grignano e Barcola) e, più in generale, in tutte le aree di margine, sia tra coltivi e boschi sia al limitare degli ambienti urbanizzati.

Il modello ecologico evidenzia molto bene il carattere euriecio della specie e, con la sola eccezione delle aree a landa più estese, tutta la ZPS mostra valori di idoneità molto elevati. Il merlo mostra tuttavia una netta preferenza per le aree più diversificate, come indicato dall'effetto positivo contemporaneo del bosco, degli ambienti agricoli e dell'estensione dei margini forestali. Le aree boscate più estese e continue, che si trovano nella parte orientale della ZPS, mostrano infatti valori di abbondanza e di idoneità intermedi.

Lia Buvoli

foto: F. Florit

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

Specie nidificante, migratrice regolare e svernante, il tordo bottaccio era considerato da PERCO & UTMAR (1989) nidificante probabile solo nell'estrema porzione a sud della ZPS, sui versanti del Monte Cocusso, segnalazione poi confermata anche da PETRUCCO & BENUSSI (1997), che indicano come possibili siti di nidificazione anche il M.te Orsario e un'area boscata a est di Medeazza. Nessun dato pregresso per quanto riguarda invece la parte goriziana della ZPS (Felcher et al. in PARODI 1999).

I dati raccolti durante questa indagine, indicano un'espansione significativa dell'areale della specie, oggi distribuita in modo pressoché continuo lungo tutta la parte orientale e meridionale della ZPS e, sebbene in modo molto più frammentario, anche in altre aree interne e lungo la costa, in particolare in corrispondenza delle pinete più estese e mature. A nord, la presenza della specie è stata segnalata nei boschi delle alture di Polazzo, nel Parco delle Mucille e presso il lago di Pietrarossa, oltre che nelle aree forestali comprese tra Berne e Palchise.

Il modello ecologico evidenzia molto bene il carattere forestale della specie. Il bosco ha infatti un effetto positivo e rappresenta il primo fattore per importanza; il tordo mostra inoltre una certa preferenza per condizioni climatiche più continentali, mentre un evidente effetto negativo è determinato dalla presenza delle aree urbanizzate, totalmente evitate dalla specie. Le aree più idonee si confermano quelle lungo il confine sloveno e nella parte meridionale dell'area, le uniche dove la presenza della specie era già stata accertata due decenni fa. Gli elevati valori di idoneità che il modello individua in

alcune aree del goriziano, una volta totalmente inidonee per questa specie, sembrano testimoniare i profondi cambiamenti in atto anche in questa parte di ZPS, dove il bosco risulta oggi molto più diffuso.

Jacopo Tonetti

Tordela

Turdus viscivorus

Nidificante sedentaria e migratrice regolare, la tordela è osservabile all'interno della ZPS durante tutto l'anno; nella stagione invernale ai contingenti locali si aggiungono individui provenienti da altre nazioni europee, in prevalenza dall'Europa centro-orientale.

La nidificazione della tordela in Carso era già nota, almeno per la parte goriziana, dagli inizi degli anni '70 del secolo scorso, sebbene non fosse ritenuta particolarmente abbondante (Felcher et al. in PARODI 1999). BENUSSI (1983) la definisce scarsa e localizzata in provincia di Trieste, limitata ad alcune aree dell'altopiano carsico. Osservando la cartina di distribuzione attuale, negli ultimi decenni la specie è stata protagonista di un importante fenomeno di espansione, che l'ha portata a colonizzare praticamente tutta la ZPS. La tordela risulta particolarmente diffusa nei settori orientali e meridionali dell'area, dove si registrano i valori di abbondanza più elevati; valori particolarmente alti si riscontrano inoltre nell'estremo nord-occidentale della ZPS.

Le aree maggiormente idonee per la tordela sono risultate quelle del settore orientale, che ospitano boschi maturi di latifoglie, ma anche quelle più meridionali, caratterizzate invece da un più elevato grado di diversità ambientale. La tordela mostra una relazione positiva sia con i boschi sia con gli ambienti aperti e le aree agricole, meglio se in zone diversificate anche da un punto di vista morfologico. Positiva anche la relazione con i margini forestali, ad ulteriore conferma del carattere ecotonale della specie. Da un punto di vista climatico, la tordela preferisce le aree più continentali, sebbene non emerga alcuna preferenza per quanto riguarda l'esposizione. La tordela risulta, inoltre, abbastanza sen-

sibile al disturbo antropico: evita infatti i centri abitati di maggiori dimensioni e anche le vie di comunicazione più trafficate sembrano avere un effetto negativo sulla sua presenza.

Guglielmo Londi

Usignolo di fiume

Cettia cetti

Nidificante sedentario, migratore e svernante regolare, la presenza dell'usignolo di fiume è localizzata nelle poche zone umide presenti nel nord della ZPS, dove frequenta le aree con vegetazione ripariale più densa e sviluppata.

La distribuzione attuale ricalca quella delineata da BENUSSI (1983) e GUZZON (in PARODI 1999). PERCO & UTMAR (1989) riportano come probabile la nidificazione della specie anche in alcuni settori meridionali della provincia di Trieste, verosimilmente lungo la parte finale del corso del Torrente Rosandra, la parte iniziale infatti non presenta caratteristiche idonee alla specie, e nella Valle dell'Ospo, sempre all'esterno dell'area di studio. All'interno della ZPS, la specie è risultata presente solo nell'area della foce del Timavo, dove è particolarmente abbondante nei canneti e nella vegetazione ripariale che si sviluppa lungo i canali, nell'area del Lisert e dei laghi di Pietrarossa e di Doberdò, dove però i valori di abbondanza risultano più bassi.

Come era logico attendersi, il modello evidenzia una stretta dipendenza della specie dalle aree umide, che rappresentano decisamente il fattore ecologico più importante; anche la diversità ambientale sembra avere un effetto positivo sulla presenza dell'usignolo di fiume, che infatti spesso frequenta, sempre in vicinanza di ambienti umidi, anche macchie e arbusteti. La ZPS risulta di importanza marginale per la specie, ad eccezione dell'area delle Foci del Timavo, dove si registrano i valori di idoneità più elevati.

Paolo Bonazzi

foto S. Zanini

Cannaiola verdognola

Acrocephalus palustris

Migratrice nidificante, presente nel territorio della ZPS indicativamente da maggio alla prima parte di ottobre. La presenza della cannaiola verdognola è stata accertata in tutte le principali zone umide dell'area (Lago di Doberdò, Foci del Timavo), anche presso le cave delle Mucille, con la sola esclusione del Lago di Pietrarossa, dove gli ambienti idonei alla specie sono effettivamente meno diffusi. In questi siti la cannaiola verdognola frequenta ambienti caratterizzati da una densa copertura di erbe alte con presenza di alberi e arbusti sparsi.

La riproduzione è stata accertata sia lungo le rive del Lago di Doberdò, confermando quanto già riportato da PARODI (1999) e rispetto al quale la distribuzione della specie non sembra aver subito particolari cambiamenti, sia lungo il corso del Timavo, l'unica area della provincia triestina in cui la specie si riproduce.

Guido Tellini Florenzano

foto M. Mendi (archivio MFSN)

Cannaiola comune

Acrocephalus scirpaceus

Specie nidificante migratrice, frequenta i canneti, in particolare a *Phragmites*, anche di estensione ridotta, preferendo le parti allagate ed evitando invece quelle asciutte. Già BENUSSI (1983) descrive la specie come piuttosto scarsa, in quanto localizzata unicamente presso le zone umide con canneto, distribuzione che ricalca quella indicata da Guzzon (in PARODI 1999) per il Carso goriziano. Nella presente indagine, la nidificazione della specie è stata accertata presso due aree ben definite, localizzate nella parte settentrionale della ZPS: la prima corrisponde all'esteso canneto che circonda il Lago di Doberdò, la seconda è la cassa di colmata del Lisert, compreso il corso del Timavo. In questa zona la specie è stata rilevata con diversi individui in canto presso i fitti canneti della foce. Oltre a questi punti, in cui la presenza della specie è del resto ben nota (PERCO & UTMAR 1989), durante il monitoraggio la cannaiola comune è stata rilevata solo presso il bacino del Parco delle Mucille a Monfalcone e in una zona di margine al confine con l'autostrada A4, nei pressi del Lago di Pietrarossa. La cannaiola comune è del tutto assente nelle porzioni centrale e meridionale della ZPS, dove non sono presenti zone umide con caratteristiche idonee alla specie.

L'analisi delle preferenze ecologiche della specie evidenzia, come del resto era logico attendersi, un effetto positivo e importante delle zone umide e una relazione negativa con le aree boscate e con quelle urbanizzate. La carta di idoneità elaborata a partire dal modello conferma in gran parte la distribuzione appena descritta, evidenziando una elevata idoneità per le sole aree della foce del Timavo, e dei laghi di Pietrarossa e Doberdò.

Severino Vitulano

foto G. Luti

Cannareccione

Acrocephalus arundinaceus

Specie nidificante migratrice, la distribuzione del cannareccione nell'area della ZPS appare fortemente legata alle zone umide con estesi canneti, tanto che lo SCHIAVUZZI (1883) lo descrive come frequentissimo, in primavera ed estate, nel territorio di Monfalcone, mentre era definito rarissimo nel territorio triestino, dove risulta presente solo nelle zone umide al confine con la provincia di Gorizia (BENUSSI 1983). La presenza alla Foce del Timavo e presso il Lago di Doberdò era già nota (PARODI 1999). I dati raccolti nell'ambito di questa indagine confermano in modo sostanziale questa distribuzione, con una nuova località di nidificazione individuata presso il Lago di Pietrarossa.

L'analisi delle preferenze ecologiche evidenzia, anche per il cannareccione, una elevata e generale preferenza per le zone umide e l'influenza negativa delle aree forestali sulla presenza della specie. Il cannareccione tende a colonizzare i canneti allagati di *Phragmites* e *Typha* in cui vi siano piante di almeno due anni di età, quindi solide e verticali, con densità per metro quadro non elevatissime. Queste caratteristiche rendono possibile la frequentazione anche di canneti non particolarmente estesi (FELCHER et al. 1991), quali quelli di margine o associati a tipologie spondali più ripide. Il modello d'idoneità ambientale conferma l'elevata idoneità delle zone umide settentrionali nelle quali la specie è stata rinvenuta: foci del Timavo, laghi di Pietrarossa e Doberdò.

Gianpiero Calvi

foto S. Candotto

Canapino comune

Hippolais polyglotta

Nidificante e migratore regolare, presente in Carso da maggio alla fine dell'estate, quando tutta l'area diviene una importante zona di passaggio e di sosta delle popolazioni provenienti dal centro Europa. Diffuso prevalentemente nella porzione settentrionale della ZPS, dove, dopo la capinera, è risultato il silvide più comune, è comunque presente in maniera più o meno continua e regolare anche nella parte centro-meridionale, mentre manca quasi del tutto dalla porzione orientale, lungo il confine con la Slovenia, dove si incontrano le aree forestali continue di maggiori dimensioni. La carta dell'abbondanza evidenzia chiaramente questo pattern, separando distintamente l'area nord-occidentale, dove si riscontrano normalmente valori di abbondanza superiori ai 2 individui/kmq, dal resto della ZPS. Già indicata come comune e ampiamente diffusa sia da Kravos (in PARODI 1999) per la parte goriziana che da BENUSSI (1983) per quella triestina. Nella zona di Polazzo e del Lago di Doberdò frequenta in particolare le aree percorse da incendi, oggi coperte da arbusteti in evoluzione, mentre nelle altre aree della ZPS lo si rinviene anche nei paesaggi agrari più diversificati, ad esempio lungo le siepi, e nelle aree di boscaglia carsica più aperte e con maggiori interruzioni della copertura arborea.

Per quanto riguarda i risultati delle analisi ecologiche, il modello evidenzia una netta preferenza per gli ambienti aperti e gli arbusteti in particolare, prima variabile in assoluto quanto a contributo percentuale. La specie sembra evitare decisamente le aree più urbanizzate e le aree boscate, le pinete in particolare, soprattutto quelle più estese e continue. La relazione di tipo quadratico,

e quindi con effetto soglia, con la diversità di uso del suolo, sembrerebbe evidenziare una preferenza per ambienti non eccessivamente diversificati, ad esempio per gli arbusteti più estesi e continui, in corrispondenza dei quali il modello individua infatti i valori massimi di idoneità. Valori elevati si riscontrano anche nelle colline a ridosso di Monfalcone, in particolare a sud di Medeazza.

Tommaso Campedelli

Sterpazzolina comune

Sylvia cantillans

Specie nidificante migratrice, presente in Carso da aprile a tutto settembre. La posizione sistemática delle sterpazzoline è stata recentemente ridefinita a scala nazionale (BRAMBILLA et al. 2009), con l'elevazione a rango di specie della sterpazzolina di Moltoni (*S. subalpina*), mentre rimane confermata a sottospecie la posizione sistemática della sterpazzolina albistriata (*S. cantillans albistriata*), che ha qui il suo centro di diffusione in Italia (BRICHETTI & FRACASSO 2010). Nell'ambito di questa indagine, sui 41 contatti registrati con sterpazzoline comuni (*S. cantillans*), 21 sono ascrivibili con certezza alla sottospecie albistriata, 2 alla sottospecie nominale (*S. cantillans cantillans*), mentre per 18 non è stato possibile definire con certezza la sottospecie. Le due osservazioni della sottospecie nominale sono state effettuate, una in prossimità della foce del Timavo, l'altra vicino all'abitato di Prosecco, entrambe in arbusteti e boscaglie rade; le osservazioni sono avvenute all'inizio di maggio. In generale, la specie risulta diffusa quasi esclusivamente nella porzione settentrionale della ZPS, in particolare nell'area tra Polazzo e il Lago di Doberdò, dove si raggiungono i valori massimi di abbondanza, zona del resto già indicata da Kravos (in PARODI 1999) come una delle due sole aree di nidificazione della specie in provincia di Gorizia. Al di fuori di questa zona, la presenza della sterpazzolina risulta estremamente localizzata e probabilmente irregolare, in linea con quanto noto per la parte triestina (PETRUCCO & BENUSSI 1997).

L'analisi delle preferenze ambientali evidenzia una relazione positiva importante con gli ambienti aperti e gli arbusteti in particolare, preferibilmente esposti a sud

e quindi in condizioni climatiche più termofile. Il modello evidenzia inoltre un effetto negativo della presenza di ambienti urbanizzati, anche di piccole dimensioni, delle aree boscate e, in misura minore, delle zone umide. Rispetto alla distribuzione dei dati, il modello evidenzia valori di idoneità piuttosto elevati nell'estrema porzione meridionale della ZPS, nei pressi degli abitati di Pese e Grozzana; è probabile che in queste aree la presenza della specie sia limitata da fattori di tipo climatico.

Simonetta Cutini

Occhiocotto

Sylvia melanocephala

L'occhiocotto è specie nidificante sedentaria, distribuito prevalentemente lungo la costa, dove risulta legato in particolare alla macchia mediterranea e alle pinete più aperte e ricche di sottobosco. Diviene raro e localizzato sull'altopiano carsico, tranne che nella parte goriziana, in particolare intorno al lago di Doberdò e sulle alture di Polazzo, dove risulta invece comune, soprattutto nelle aree recentemente percorse da incendi e oggi coperte da giovani arbusteti. In queste zone, e lungo la costa, in particolare nella scogliera di Duino (vedi anche PERCO & PERCO 2011), si raggiungono i valori di abbondanza più elevati. La distribuzione attuale della specie sembra non essere cambiata rispetto a quanto riportato da Parodi e Tout (in PARODI 1999) e PETRUCCO & BENUSSI (1997); storicamente doveva essere molto più raro e localizzato, tanto che SCHIAVUZZI (1883) afferma di non averne mai trovato alcuno.

Il modello ecologico individua come fattore più importante la presenza di ambienti aperti, in questo caso rappresentati da arbusteti e dalla macchia mediterranea, cioè quelli preferibilmente localizzati in condizioni termofile, con esposizioni prevalentemente meridionali. L'effetto positivo della variabilità dell'altitudine è probabilmente dovuto ad una generale preferenza per gli ambienti di costa, caratterizzati qui, in buona parte, dalla presenza di scogliere e falesie, anche imponenti. Proprio lungo la costa il modello individua i valori di idoneità più elevati, valori che risultano particolarmente alti anche nelle aree interne del settore nord della ZPS, non solo nei dintorni di Polazzo, ma anche nelle colline alle spalle di Monfalcone (es. Medeazza).

Guglielmo Londi

foto G. Gobbi (archivio MFSN)

Sterpazzola

Sylvia communis

Nidificante migratrice, presente in Carso da aprile a settembre. La sterpazzola mostra una distribuzione piuttosto concentrata, localizzata principalmente in due aree della ZPS: la parte nord, corrispondente agli estesi arbusteti e ambienti aperti ancora presenti tra il Lago di Doberdò e Polazzo, dove si registrano in assoluto i valori maggiori di abbondanza, e l'estrema parte sud, tra l'abitato di Basovizza e il confine sloveno, area questa caratterizzata invece dalla presenza di ambienti agricoli relativamente estesi e diversificati, oltre ad alcuni lembi residuali di landa carsica (M.te Stena). Altre osservazioni riguardano le aree agricole nei dintorni dell'abitato di Prepotto e le residuali aree aperte del M.te Grisa, presso la Vedetta d'Italia.

Rispetto alla fine del secolo scorso, la sterpazzola sembra aver subito una drastica riduzione di areale nella parte triestina; PETRUCCO & BENUSSI (1997) la indicano come presente in modo uniforme sul territorio provinciale, mentre non sembrano essere avvenuti grossi cambiamenti nella parte goriziana (PARODI 1999), almeno in termini distributivi. È probabile che questa differenza sia dovuta all'effetto di alcuni grossi incendi che recentemente hanno interessato vaste superfici nei dintorni del Lago di Doberdò prima e di Polazzo dopo. Questi incendi hanno mantenuto, e in certi casi rigenerato, ambienti idonei alla sterpazzola, e a molte altre specie in generale, con un effetto evidentemente opposto a una diffusa e generalizzata tendenza al rimboschimento naturale che ha invece interessato la stragrande maggioranza del territorio triestino.

I risultati delle analisi ambientali mostrano un effetto positivo importante della variabile "ambienti aperti",

un effetto invece negativo del bosco e degli ambienti antropizzati e un aumento della probabilità di presenza della specie allontanandosi dalla linea di costa. Questa relazione ha verosimilmente un significato di tipo climatico ed esprime una preferenza per le aree a clima continentale. La carta di idoneità ambientale evidenzia l'importanza specifica della landa per questa specie; oltre alla parte nord della ZPS, già descritta, valori elevati di idoneità si trovano infatti proprio in corrispondenza di questi ambienti, anche quelli di più piccole dimensioni, distintamente individuati dal modello.

Simonetta Cutini

Capinera

Sylvia atricapilla

Nidificante sedentaria e migratrice regolare, la capinera è presente in Carso tutto l'anno. Diffusa praticamente ovunque, frequenta qualsiasi tipologia ambientale purché caratterizzata dalla presenza, seppur minima, di vegetazione arborea e arbustiva. Dopo il fringuello e il merlo, la capinera è la specie più diffusa nella ZPS. La sua distribuzione non sembra aver subito modifiche sostanziali negli ultimi decenni (PETRUCCO & BENUSI 1997; Kravos in PARODI 1999), rispetto a quando potrebbe essere stata ulteriormente avvantaggiata dal processo di afforestazione naturale che ha interessato tutto il territorio della ZPS, in particolare quello triestino. SCHIAVUZZI (1883) la considera frequente in particolare nei mesi autunnali e durante l'inverno, quando alle popolazioni locali si aggiungevano, come tuttora accade, contingenti svernanti provenienti da altre nazioni d'Europa.

Considerata l'alta valenza ecologica della specie, una delle più euricie in assoluto, almeno tra i passeriformi, il modello non riesce a evidenziare tra i parametri ambientali nessun contributo particolarmente importante. Interessante tuttavia l'effetto degli ambienti urbanizzati; se infatti la presenza della capinera sembra influenzata, in generale, negativamente dalla presenza di ambienti urbani, questo effetto è decisamente maggiore in prossimità degli abitati di maggiori dimensioni, dove comunque la specie può essere presente.

Guido Tellini Florenzano

foto B. Dentessani

Lui piccolo
Phylloscopus collybita

Nidificante, migratore regolare e parzialmente svernante, il lui piccolo è ampiamente diffuso all'interno della ZPS. Nel corso degli ultimi decenni, la distribuzione della specie non sembra aver subito cambiamenti degni di nota, anche se, rispetto a quanto riportato da BENUSSI (1983) e Kravos (in PARODI 1999) in particolare proprio per la parte goriziana, la specie potrebbe essere stata avvantaggiata dall'incremento della superficie forestale. Il lui piccolo risulta particolarmente abbondante in tutta la fascia orientale della ZPS, lungo il confine con la Slovenia, e in buona parte dell'area centrale, tra gli abitati di S. Croce, Grignano e Sgonico.

I risultati delle analisi ecologiche evidenziano bene la stretta relazione esistente tra la presenza della specie e gli ambienti forestali, il primo fattore per importanza; risulta invece negativo l'effetto degli ambienti urbanizzati. In generale, tutta la ZPS mostra valori di idoneità piuttosto elevati, con l'esclusione solo delle zone antropizzate, delle principali zone umide, utilizzate invece ampiamente durante la migrazione e la stagione invernale, e le aree agricole più estese.

Paolo Bonazzi

foto: F. Florit

Regolo

Regulus regulus

Migratore e svernante regolare, segnalato come nidificante probabile in un'area ristretta del Carso dove, comunemente a quanto avviene in tutta Italia, risulta particolarmente legato alla presenza di boschi di conifere, anche di impianto artificiale. In inverno, quando forma spesso piccoli gruppi misti, in particolare con le cince, lo si incontra anche al di fuori delle formazioni forestali, anche in ambienti antropizzati (giardini, coltivi, parchi, ecc.). Segnalato come nidificante in un parco a Gorizia nel 1984 (PERCO & UTMAR 1989), successivamente la nidificazione della specie in territorio goriziano è ritenuta solo probabile, tra l'altro con un numero di osservazioni piuttosto basso (PARODI 1999). La nidificazione del regolo nella ZPS è da ritenersi probabile, con 1-2 coppie presenti oramai regolarmente da diversi anni in un ridotto tratto a *Picea abies* quasi all'estremità del M.te Cocusso (BENUSSI 2010).

La presenza della specie è stata riconfermata anche in questa indagine, precisamente nella stessa area già conosciuta, dove un maschio in canto è stato più volte rilevato tra fine maggio e metà giugno 2011.

Enrico Benussi

foto R. Parodi

Fiorrancino

Regulus ignicapillus

Considerato storicamente presente nel territorio di Trieste solo durante le migrazioni, peraltro con contingenti scarsi (SCHIAVUZZI 1883), anche più recentemente il fiorrancino non risulta indicato tra le specie nidificanti in Carso (PETRUCCO & BENUSSI 1997; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999), dove è comunque regolarmente presente da ottobre a fino ad aprile inoltrato. Durante questo studio sono state raccolte 4 segnalazioni, tutte riferibili a soggetti in canto, nei mesi di maggio e giugno 2010, e quindi potenzialmente riconducibili a possibili casi, o comunque tentativi, di nidificazione. Le quattro osservazioni si riferiscono, una alla Val Rosandra, vicino al confine sloveno, un'altra sempre prossima al confine, a monte dell'abitato di Malchina, una invece più vicina alla costa, alle spalle di Barcola e, infine, una vicina a Basovizza, sul M.te Grociana. Tutte le osservazioni si riferiscono a boschi di conifere. Nei successivi tre anni di indagine la specie non è mai stata segnalata in periodo riproduttivo.

Anche alla luce dei dati del 2010, prudenzialmente, la nidificazione del fiorrancino necessita di ulteriori conferme ed è auspicabile in futuro il monitoraggio delle aree potenzialmente più idonee, ad esempio lungo il confine con il Carso sloveno, dove la specie nidifica regolarmente (HAGEMEIJER & BLAIR 1997), sebbene con valori di densità molto bassi se confrontanti con il resto del paese (DOPPS 2013).

Tommaso Campedelli

foto F. Florit

Pigliamosche

Muscicapa striata

Nidificante e migratore regolare, osservabile nell'area da marzo-aprile fino a settembre. Considerato abbastanza diffuso e comune sia in territorio triestino (BENUSSI 1983) sia in quello goriziano (Kravos e Parodi in PARODI 1999), i dati raccolti nell'ambito di questa indagine sembrano confermare questa situazione. Il pigliamosche è risultato più diffuso nella parte triestina della ZPS, dove tuttavia non è mai abbondante, in particolare lungo la fascia costiera centro-meridionale, nell'area di Grignano e Prosecco-Contovello, mentre è risultato assente da buona parte delle zone più orientali e meridionali, che infatti, secondo il modello ecologico risultano, al pari delle aree a landa del goriziano, quelle meno idonee.

La specie frequenta una grande varietà di ambienti, anche se le analisi ecologiche evidenziano un carattere decisamente sinantropico del pigliamosche, che quindi risulta particolarmente legato alla presenza di ambienti urbanizzati. In particolare, sembra prediligere i centri abitati di piccole e medie dimensioni, con un edificato discontinuo, e le zone peri-urbane, dove spesso lo si rinviene in corrispondenza di aree agricole diversificate, con presenza di siepi e filari e situazioni ecotonali, ad esempio di margine con il bosco. In queste situazioni il pigliamosche nidifica sui fabbricati, nelle cavità degli alberi e all'interno delle siepi. La maggior parte di queste aree è in realtà esterna alla ZPS che riveste quindi un'importanza marginale per la specie. Il modello evidenzia anche un effetto negativo delle aree forestali più estese e continue, in corrispondenza delle quali si trovano i valori più bassi di idoneità ambientale (zone orientali e meridionali).

Gianpiero Calvi

foto M. De Luca

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

Specie nidificante sedentaria, il codibugnolo è ampiamente diffuso in tutto il territorio della ZPS; in Carso è presente come nidificante anche la forma orientale a testa chiara, forse attribuibile a *A. c. caudatus*. Considerata già comune da Tout (in PARODI 1999) e PETRUCCO & BENUSSI (1997), in questi anni non sembra siano avvenuti cambiamenti significativi nella distribuzione della specie; SCHIAVUZZI (1883) definisce i codibugnoli durante il periodo di passo autunnale "in certi anni frequentissimi e riescono molesti agli uccellatori, perché imbrattano le panie, senza arrecare alcun utile". Nidifica praticamente in tutte le tipologie forestali, compresi i boschi di conifere, purché caratterizzate da interruzioni nella copertura arborea e dalla presenza di un ricco sottobosco.

Sebbene la specie risulti diffusa praticamente ovunque, valori di abbondanza minori si registrano in corrispondenza delle formazioni forestali orientali, più continue, mentre valori decisamente più elevati sono presenti nella parte litoranea e centrale, dove più è diffusa la boscaglia carsica. Nidifica anche nelle aree agricole, le poche più diversificate, caratterizzate dalla presenza di boschetti e siepi. Queste caratteristiche sono ben riassunte dai risultati delle analisi delle preferenze ambientali.

Il modello elaborato mostra infatti una relazione positiva sia con gli ambienti forestali sia con la diversità ambientale; interessante notare come a un contributo positivo della diversità di uso del suolo si contrappone un effetto negativo dell'estensione dei margini. La specie sembrerebbe quindi preferire ambienti forestali diversificati ma comunque non eccessivamente frammentati.

Il modello evidenzia anche un effetto negativo degli ambienti urbanizzati e una preferenza per situazioni più continentali (privilegiata l'esposizione a nord e le aree lontano dalla costa).

Simonetta Cutini

Cincia bigia

Poecile palustris

La specie nell'area del Carso è nidificante sedentaria, migratrice parziale e svernante. Considerata comune nelle aree boscate (BENUSSI 1983; PERCO & UTMAR 1989), privilegia le formazioni più mature, ricche di cavità utilizzate per nidificare, anche se, soprattutto in inverno, la si può comunemente osservare fin sulla costa e presso i centri urbani. Nella ZPS la distribuzione appare piuttosto continua, in particolare nel settore orientale, con alcuni vuoti prevalentemente lungo la fascia costiera e in alcune aree dell'interno, come ad esempio in corrispondenza delle zone meno boscate tra Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari. Le densità maggiori si registrano nelle aree forestali a ridosso del confine sloveno, sia lungo la porzione orientale sia a sud, nei boschi della Val Rosandra; l'analisi delle preferenze ecologiche evidenzia del resto, in modo netto, una relazione positiva importante con la presenza del bosco.

La probabilità di presenza della specie sembra inoltre crescere allontanandosi dalla costa e dalle strade più frequentate: se nel primo caso, il modello sembra individuare una preferenza della specie per climi più continentali, nel secondo caso è verosimile che più che una sensibilità al disturbo antropico, il modello evidenzi una relazione di tipo geografico. Le aree a maggior diffusione della specie sono infatti molto lontane dalle principali arterie di comunicazione. La carta del modello ricalca fedelmente la distribuzione della specie, evidenziando una elevata idoneità di tutta la fascia orientale della ZPS.

Severino Vitulano

foto M. Cumini

Cincia dal ciuffo

Lophophanes cristatus

La specie è sedentaria e nidificante, osservabile all'interno della ZPS durante tutto l'anno. Particolarmente legata ai boschi di conifere, soprattutto alle formazioni artificiali mature a *Pinus nigra*, la cincia dal ciuffo risulta ampiamente diffusa nel Carso triestino e goriziano, dove frequenta regolarmente anche i boschi misti. È probabile che negli ultimi decenni la specie sia stata favorita dal generalizzato invecchiamento delle pinete. Casi di nidificazione vengono segnalati fino al livello del mare, ad esempio, ma non solo, nella pineta della Riserva Naturale delle Falesie di Duino. È particolarmente diffusa sul M.te Ermada, nel comprensorio del M.te Lanaro, in quello del M.te Cocusso, di S. Lorenzo, della Val Rosandra e del M.te Carso. La carta dell'abbondanza non evidenzia un pattern ben definito: le aree con i valori più elevati si trovano in corrispondenza dei boschi di conifere, sia sulla costa sia nell'interno. La popolazione nidificante veniva stimata in 30-50 coppie nel Carso goriziano (PARODI 1999), mentre in quello triestino in 100-120 coppie.

I risultati del modello confermano la preferenza per gli ambienti forestali, e per i boschi di conifere in particolare. A differenza delle altre cince, la specie sembra frequentare esclusivamente gli ambienti forestali più estesi e continui, come evidenziato anche in altri studi (LENS & DHONDT 1993), mostrando infatti una relazione negativa importante con tutte le tipologie di ambienti aperti. La parte nord-occidentale della ZPS, dove maggiore è l'estensione della landa e degli arbusteti, fa infatti registrare i valori di idoneità più bassi. Il modello evidenzia inoltre un effetto negativo degli ambienti urbanizzati. La cincia dal ciuffo predilige

situazioni esposte a sud, quindi più termofile, anche se la si ritrova comunemente anche in aree più continentali. La capacità della specie di vivere in condizioni climatiche anche molto diverse è già stata evidenziata da altri autori (BROTONS 2004).

Enrico Benussi

Cincia mora

Periparus ater

Prevalentemente sedentaria e nidificante, ma anche migratrice regolare, nel periodo riproduttivo la cincia mora è particolarmente legata ai boschi di conifere (*Pinus nigra*). Ben diffusa in tutta l'area, appare più comune nel Carso triestino che in quello goriziano. Si rinviene anche in boschi misti, spesso associata alla cincia dal ciuffo. Laddove siano presenti boschi di conifere, può nidificare anche a livello del mare. Questa specie, in genere particolarmente diffusa nei boschi montani, si riproduce qui a quote prossime al livello del mare nel Bosco Farneto, parco periurbano delle città di Trieste, nel parco di Miramare e nella pineta del Rilke, a ridosso delle falesie di Duino (tipico esempio di "dealpinismo"). Risulta ben diffusa nella Riserva Naturale della Val Rosandra (M.te Concusso, M.te Grociana, S. Lorenzo/M.te Stena, M.te Carso), dove alcune nidificazioni sono state accertate anche negli anfratti rocciosi, lungo il torrente all'interno della valle. Alla fine dell'800 SCHIAVUZZI (1883) considerava la specie "di passaggio autunnale, alquanto rara". I valori massimi di abbondanza si registrano lungo la fascia orientale della ZPS, ove siano presenti boschi di conifere o misti, e in alcune aree costiere vicine a Prosecco.

Da un punto di vista ecologico, rispetto alla cincia dal ciuffo, con la quale condivide una netta preferenza per gli ambienti forestali e per i boschi di conifere in particolare, la cincia mora sembra essere meno sensibile alla frammentazione forestale e alla presenza degli ambienti aperti che, sebbene non preferiti, hanno un effetto meno negativo sulla presenza della specie, rilevata infatti frequentemente anche in situazioni di margine e più ecotonali. Sempre rispetto alla cincia

dal ciuffo, la cincia mora sembra preferire condizioni climatiche più continentali ed è infatti più comune nelle zone carsiche interne. Questo aspetto risulta piuttosto evidente confrontando le carte di idoneità delle due specie; nel caso della cincia mora, valori elevati di idoneità caratterizzano infatti buona parte delle aree più interne orientali. La si rinviene spesso anche nei centri urbani.

Enrico Benussi

Cinciarella

Cyanistes caeruleus

La cinciarella in Carso è nidificante stanziale, migratrice parziale e svernante. All'interno della ZPS, la specie è presente in modo continuo e diffuso in quasi tutti i quadrati, con solo alcuni vuoti nel Carso goriziano, tra Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari, e valori di densità piuttosto bassi tra Duino e Slivia, zone entrambe caratterizzate da una copertura arborea ridotta o del tutto assente. Le densità maggiori si raggiungono invece nella fascia costiera tra Grignano e Trieste, al confine sloveno nella zona di Col e nel territorio di Padriciano. I dati raccolti indicano una netta preferenza per gli ambienti forestali di latifoglie, e più generale per tutte le situazioni caratterizzate dalla presenza di una discreta copertura arborea, anche in ambito urbano o nelle aree agricole più diversificate.

La vocazione forestale della cinciarella è confermata dal modello di idoneità ambientale, che evidenzia infatti una relazione negativa importante con gli spazi aperti. La specie sembra tuttavia evitare, nel contesto studiato, le foreste di conifere. Rispetto alla cinciallegra, con cui comunque condivide una certa preferenza per le aree a mosaico, o comunque caratterizzate da un elevato grado di diversità ambientale, la cinciarella è specie molto più forestale: i valori più elevati di idoneità ambientale si raggiungono infatti in corrispondenza delle aree forestali più estese e continue, in particolare lungo il confine sloveno. La specie ben si adatta ai contesti urbani laddove siano presenti parchi e giardini.

Paolo Bonazzi

foto: F. Florit

Cinciallegra

Parus major

Considerata nidificante sedentaria, migratrice parziale e svernante, la cinciallegra è estremamente comune in tutta l'area, dove appare ubiquitaria. È particolarmente diffusa nei boschi di latifoglie e nelle formazioni miste, così come nei giardini e nei parchi cittadini, ma anche nelle zone agricole caratterizzate dalla presenza di siepi e alberature, anche se di ridotte dimensioni. I dati raccolti nella presente ricerca confermano, per questa specie, una scarsa selettività ambientale, tanto da risultare presente in tutti i quadrati di rilevamento, con le densità maggiori che si registrano, lungo la fascia costiera, tra Aurisina e Santa Croce e nell'interno, tra Trebiciano e Gropada.

La scarsa selettività ambientale della cinciallegra è confermata dall'analisi delle preferenze ecologiche e dall'efficienza predittiva del modello (valore di AUC di 0.590), evidentemente incapace di identificare dei fattori che caratterizzano in maniera specifica i territori più idonei alla specie. Tuttavia, il modello evidenzia, seppur con un basso contributo percentuale, l'effetto di quattro fattori ambientali: aree agricole, spazi aperti, bosco e urbanizzato. In sostanza, la cinciallegra predilige le aree caratterizzate da un elevato grado di diversità ambientale e la presenza preponderante di una categoria in particolare ne diminuisce la probabilità di presenza.

La carta del modello evidenzia una diffusa idoneità ambientale, che interessa praticamente tutta la ZPS, da nord a sud, sebbene le aree con i valori più elevati risultino non particolarmente estese e localizzate principalmente nelle zone più periferiche della ZPS, a ridosso dei confini. Le aree in assoluto meno ido-

nee sono invece quelle orientali, caratterizzate dalle maggiori estensioni boschive, e parte della porzione nord-occidentale della ZPS, dove gli ambienti aperti risultano più estesi e continui.

Paolo Bonazzi

Picchio muratore

Sitta europaea

Considerato nidificante sedentario, migratore parziale e svernante, il picchio muratore è specie tipicamente forestale e anche nel Carso lo si ritrova in corrispondenza delle aree forestali più estese, ma anche in prossimità dei centri abitati, soprattutto laddove siano presenti alberi vetusti. Rispetto a quanto descritto da BENUSSI (1983), PETRUCCO & BENUSSI (1997) e da Parodi e Peressin (in PARODI 1999), la distribuzione della specie non sembra aver subito particolari cambiamenti, confermandosi molto più diffuso e comune sul Carso triestino, in particolare lungo il confine e nei boschi meridionali della ZPS, mentre è raro e localizzato nella porzione goriziana, dove lo si rinviene esclusivamente presso i boschi che circondano il Lago di Doberdò e a nord di Jamiano.

Da un punto di vista ecologico, il modello evidenzia una relazione negativa con gli ambienti aperti, mentre, nell'ambito delle superfici forestali, la specie mostra una certa preferenza per i boschi di conifere, almeno quelli più maturi e strutturati. Il picchio muratore è decisamente più comune e abbondante nelle aree interne, mostrando di preferire condizioni climatiche più continentali, anche se, in corrispondenza delle pinete più mature, lo si può trovare anche lungo la costa. La carta dell'idoneità evidenzia molto bene il carattere prettamente forestale della specie; i valori più elevati in assoluto si raggiungono infatti in corrispondenza delle aree orientali. Nelle aree centrali dell'altopiano, dove maggiore è la diffusione della boscaglia carsica, lo si trova spesso in corrispondenza delle doline di maggiori dimensioni, dove, in virtù di una maggiore presenza di suolo e quindi di fertilità, si trovano gli alberi di maggiori dimensioni.

Gianpiero Calvi

foto M. Cumini

Rampichino comune

Certhia brachydactyla

Specie nidificante sedentaria, migratrice e svernante, il rampichino comune frequenta principalmente boschi di alto fusto, ma lo si rinviene abitualmente anche nei parchi urbani e nei giardini, purché in presenza di alberi di grandi dimensioni. Rispetto a quanto riportato da PETRUCCO & BENUSSI (1997) e da Parodi e Peressin (in PARODI 1999), la distribuzione della specie non sembra essere cambiata, anche se è probabile sia oggi più diffuso, almeno nella parte triestina. Il rampichino comune sembra infatti aver beneficiato dell'incremento della superficie forestale, colonizzando in modo stabile ambienti che, fino a un ventennio fa, venivano considerati marginali. La specie risulta più comune nella porzione orientale e meridionale della ZPS, dove infatti il modello individua le aree a maggiore idoneità, anche se valori di abbondanza piuttosto elevati si raggiungono anche in alcuni settori costieri, ad esempio nei pressi di Duino e nelle pinete tra Aurisina, Santa Croce e Prosecco-Contovello, e, in provincia di Gorizia, lungo le fasce ripariali che circondano i laghi di Doberdò e Pietrarossa.

Le analisi delle preferenze ecologiche confermano il carattere decisamente forestale della specie, il bosco rappresenta infatti il fattore più importante, e riescono a mettere in luce anche alcune preferenze più di dettaglio. Il rampichino comune mostra infatti una relazione positiva con le pinete, soprattutto quando non formano compagini monospecifiche, e, con la presenza delle doline. Come già descritto per il picchio muratore, ma in maniera molto più evidente, nei contesti forestali meno maturi, il rampichino comune si trova spesso in corrispondenza delle doline, dove, almeno in molte

zone del Carso, si trovano gli unici alberi di grandi dimensioni. La relazione negativa con l'estensione dei margini del bosco, sembra inoltre indicare una preferenza per le aree forestali continue, meno frammentate. Per il resto, il modello evidenzia una generale, e del resto ben nota, relazione negativa con le aree aperte e con l'antropizzazione del territorio.

Gianpiero Calvi

Pendolino

Remiz pendulinus

Sedentario nidificante e migratore regolare, presente durante tutto l'anno. Durante il periodo riproduttivo, il pendolino è stato contattato esclusivamente nelle due principali zone umide della ZPS, le Foci del Timavo e il Lago di Doberdò, entrambe già indicate da PARODI (1999) come siti certi di nidificazione. SCHIAVUZZI (1883) lo indica come abbondante nel Monfalconese. La mancata osservazione nel lago di Pietrarossa e nelle cave delle Mucille, ambienti potenzialmente adatti, potrebbe dipendere dal carattere elusivo di una specie probabilmente già presente con valori di densità piuttosto bassi.

Il pendolino nidifica in un ampio spettro di zone umide, anche salmastre, dove costruisce il nido sulla vegetazione arborea ripariale.

Guglielmo Londi

foto S. Zamini

Rigogolo

Oriolus oriolus

Nidificante e migratore regolare, presente da aprile a settembre, il rigogolo è indicato da BENUSSI (1983), PETRUCCO & BENUSSI (1997), Corbatto e Paradisi (in PARODI 1999) come abbastanza comune e diffuso in Carso. Storicamente, SCHIAVUZZI (1883) lo indica come frequentissimo.

Dai dati raccolti nell'ambito di questa indagine, la distribuzione della specie appare più limitata nella parte goriziana, dove il rigogolo è localizzato sulle alture di Polazzo, al limite della ZPS, nelle zone boscate nei pressi del Lago di Doberdò e a est di Jamiano. Nella zona triestina invece, la specie è diffusa in modo più uniforme, ad esclusione della dorsale di confine, mentre i valori di abbondanza più elevati si raggiungono nella zona di Prepotto-San Pelagio, e nei dintorni di Sgonico e Repen.

All'interno della ZPS, il rigogolo sembra preferire le situazioni più diversificate, come ad esempio le aree a mosaico dove vi è un'alternanza tra zone agricole e boscate, anche in prossimità dei centri urbani, in particolare quelli di minori dimensioni. Risultano invece meno idonee le aree forestali più estese e continue, soprattutto nella porzione orientale della ZPS, dove anche le condizioni climatiche sembrano meno idonee per il rigogolo; il modello evidenzia infatti una preferenza per le aree più calde e meglio esposte.

Severino Vitulano

foto R. Parodi

Averla piccola

Lanius collurio

Specie migratrice regolare, estiva e nidificante localizzata. Si osserva dalla fine di aprile/maggio inoltrato fino alla metà di settembre. Un tempo sul Carso triestino era considerata uniformemente diffusa e molto comune (BENUSSI 1983); abbastanza diffusa anche se non egualmente distribuita nel goriziano (Felcher e Zorzenon in PARODI 1999).

I dati raccolti nell'ambito di questo studio evidenziano una situazione molto diversa e l'averla piccola appare oggi piuttosto localizzata e più diffusa nel Carso isontino, soprattutto nella zona di Doberdò del Lago. La specie è assente dal settore orientale, lungo il confine sloveno, dove si trovano le aree boscate più estese. Nel 2011, nell'area compresa tra il M.te Stena, la piana tra Grozzana e Pese, fino alle pendici del M.te Cocusso (Riserva Naturale della Val Rosandra), si stimava la presenza di 5-6 coppie. Nel 2012, come del resto nel 2013, è stata registrata un'ulteriore riduzione nel numero di coppie nidificanti, con l'abbandono di alcune zone considerate ottimali. La costante diminuzione a livello locale si inserisce in un quadro di generalizzata diminuzione che interessa tutto l'areale europeo della specie. Alla fine dell'800 veniva considerata in questi luoghi "specie estiva, frequentissima" dallo SCHIAVUZZI (1883).

Il modello ecologico elaborato per l'averla piccola evidenzia un effetto positivo importante degli ambienti aperti, soprattutto di quelli caratterizzati da un maggiore grado di diversità ambientale, come le fasce ecotonali e gli ambienti di boscaglia intervallati da spazi erbosi e aree a landa, preferibilmente in condizioni più continentali: la probabilità di presenza della specie aumenta

infatti allontanandosi dalla costa. L'averla piccola risulta mediamente sensibile al disturbo antropico; se infatti sembra evitare le aree limitrofe ai centri abitati, anche di medie dimensioni, può nidificare nelle vicinanze di case isolate o piccoli aggregati rurali (es. Sagrado di Sgonico).

Enrico Benussi

Ghiandaia

Garrulus glandarius

Nidificante sedentaria e migratrice parziale, considerata estremamente comune e ubiquitaria, in particolare sul Carso triestino, dove maggiore è la copertura forestale (BENUSSI 1983). A differenza della gazza, la ghiandaia è legata agli ambienti boschivi, anche di neoformazione, e mostra quindi una distribuzione continua in quasi tutta la ZPS. È verosimile che la specie abbia tratto generale beneficio dal processo di afforestazione naturale che ha interessato, come conseguenza di un generale abbandono della attività agricole e zootecniche, buona parte del Carso, ed in particolare proprio il territorio triestino.

La ghiandaia, come detto, predilige in particolare le aree ad elevata copertura forestale ma che mostrano comunque un certo grado di diversità ambientale, come buona parte delle aree interne centrali dell'altopiano dove, inserite in una matrice forestale comunque preponderante, trovano spazio anche ambienti differenti, in particolare aree agricole. In queste aree i valori di abbondanza risultano particolarmente elevati, più che nelle aree forestali della parte orientale della ZPS. Il modello evidenzia inoltre una relazione negativa con le aree urbanizzate e gli ambienti aperti più estesi e continui.

Jacopo Tonetti

foto V. Dall'Orto (archivio MFSN)

Gazza

Pica pica

Nidificante sedentaria e erratica, la gazza è specie prettamente sinantropica all'interno della ZPS. Assente o comunque poco abbondante nelle zone a maggiore copertura forestale, come anche dagli ambienti aperti più estesi e continui, all'interno della ZPS, la gazza appare diffusa in modo piuttosto continuo, prevalentemente in corrispondenza delle aree urbanizzate più estese, come all'interno dell'area compresa tra Duino, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, nei pressi di Aurisina e, più a sud, nell'area attorno Grignano. In questi contesti risulta particolarmente frequente negli ambienti agricoli periurbani, situazioni in cui si registrano i valori di abbondanza più elevati. La distribuzione della specie non sembra essere cambiata molto da quanto riportato da PETRUCCO & BENUSSI (1997) e PARODI (1999), e neanche rispetto ad un passato meno recente; la specie era infatti già definita molto frequente da SCHIAVUZZI (1883).

Il modello ecologico evidenzia molto bene il carattere sinantropico della specie, con un effetto positivo importante dei fattori legati agli ambienti urbanizzati, sia in termini di uso del suolo sia di distanza dai centri abitati. La carta elaborata a partire dal modello indica tra le aree a maggiore idoneità buona parte della porzione occidentale della ZPS e, più in generale, le aree lungo i confini interni dell'area protetta. Questo è dovuto al fatto che la ZPS, escludendo la quasi totalità delle zone urbanizzate, risulta di importanza marginale per la gazza. Il modello evidenzia anche un effetto negativo della presenza del bosco.

Lia Buvoli

foto F. Florit

Taccola

Corvus monedula

Specie nidificante sedentaria e migratrice irregolare, rispetto a quanto indicato da PETRUCCO & BENUSSI (1997) e Florit (in PARODI 1999), la distribuzione della taccola non sembra essere cambiata in maniera significativa, ed appare tuttora maggiormente diffusa, sebbene molto localizzata, nella parte triestina della ZPS, dove, secondo PERCO & PERCO (2011), la specie potrebbe aver risentito negativamente della presenza del falco pellegrino e del corvo imperiale. I siti di nidificazione noti si trovano nei dintorni di Duino (castello), nelle falesie di Sistiana e Aurisina e nei dintorni di Medeazza. Sempre PERCO & PERCO (2011) stimano in meno di 100 coppie la popolazione nidificante all'interno della ZPS, a cui si devono aggiungere un numero non precisato di coppie che nidificano nella città di Trieste; il fenomeno dell'inurbamento della taccola è considerato piuttosto recente (E. Benussi oss. pers.).

Le analisi ecologiche confermano la preferenza della specie per gli ambienti urbanizzati, prima variabile in assoluto quanto a contributo percentuale, ed una maggiore probabilità di presenza della taccola lungo la costa, dove sono infatti concentrati tutti i siti di nidificazione. Il modello, a ulteriore conferma dello stretto legame della specie con gli ambienti antropizzati, evidenzia inoltre un effetto negativo del bosco e degli ambienti aperti in generale, comprese le aree agricole.

Severino Vitulano

foto S. Candotto

Cornacchia grigia

Corvus cornix

Considerata nidificante stanziale ed erratica; rispetto ad un recente passato, la distribuzione della specie non sembra aver subito particolari modificazioni (BENUSSI 1983; Florit in PARODI 1999). Specie euriecia, ad alta valenza ecologica, la cornacchia grigia frequenta un ampio spettro di ambienti, risultando tuttavia prevalentemente sinantropica. Manca infatti da buona parte delle aree più interne, in particolare dalle aree forestali più estese e continue, ad esempio lungo la fascia di confine con la Slovenia e nella propaggine nord-est della ZPS e, confermando quanto già indicato da Florit (in PARODI 1999), tra Jamiano e San Michele del Carso. I valori di abbondanza maggiore si registrano invece nelle aree limitrofe all'abitato di Ronchi dei Legionari, nei pressi di Grignano e, nella zona meridionale, tra Padriciano e Longera.

La cornacchia grigia predilige gli spazi urbani e le zone agricole, preferibilmente con filari e boschetti, frequentemente utilizzati come siti di nidificazione, e in generale gli ambienti più diversificati, come mostra la relazione positiva con la diversità di uso del suolo, sempre tuttavia in vicinanza dei centri abitati. La carta del modello individua principalmente due aree a maggiore idoneità: una più occidentale, sul Carso goriziano, e una invece più orientale, a sud dell'interporto Ferneti. Le aree più interne ed orientali della ZPS, a carattere decisamente forestale, sono risultate le meno idonee in assoluto.

Lia Buvoli

foto F. Florit

Corvo imperiale

Corvus corax

Stanziale e nidificante, erratico nel periodo autunno-invernale, quando può essere osservato anche in grandi gruppi (76 individui in Val Rosandra il 12/10/2010). Scarso e localizzato come nidificante con tre siti individuati fino alla fine degli anni '90 in provincia di Gorizia (PARODI 1999). Nel triestino nidificante dal 1988 sulle falesie di Duino (PERCO & UTMAR 1989), da allora in continua espansione, inizialmente in gran parte degli ambienti rocciosi disponibili, cave incluse, negli ultimi anni anche in boschi, dove può utilizzare anche vecchi nidi di rapaci. Il corvo imperiale appare uniformemente distribuito su gran parte del territorio. Dalla fine degli anni '90 si riproduce con una coppia in Val Rosandra, dove sono conosciuti almeno tre siti alternativamente occupati (BENUSSI 2010). Attualmente altre due coppie si riproducono entro i confini della Riserva, una nel bosco di conifere del M.te Cocusso, l'altra nell'ex cava di S. Dorligo della Valle. La riproduzione avviene già dalla fine di febbraio, normalmente agli inizi di marzo; insediandosi così precocemente, è stato notato, in più occasioni, come riesca ad influenzare negativamente la riproduzione di altre specie territoriali, come il falco pellegrino e l'astore.

Secondo i risultati del modello ecologico, il corvo imperiale mostra di evitare le aree urbanizzate e zone limitrofe, comprese quelle adiacenti alle infrastrutture di maggiori dimensioni. Una relazione negativa esiste anche con il bosco, ad eccezione delle pinete; in questo caso, per valori intermedi di copertura, la probabilità di presenza della specie aumenta. È evidente che questo risultato dipende dai casi di nidificazione accertati in questo ambiente. Per il resto, il modello conferma la

preferenza per gli ambienti rocciosi, esiste una relazione positiva importante con la deviazione standard dell'altitudine, che individua infatti le aree morfologicamente più diversificate e gli ambienti rocciosi. Interessante il fatto che il modello individui tra le aree ad elevata idoneità anche quella di Banne, dove si trova un contesto ambientale molto simile a quello in cui la specie nidifica su albero sul M.te Cocusso; è probabile che in caso di espansione, e di conferma di questo comportamento riproduttivo, l'area di Banne possa essere una delle prossime ad essere occupate. Un contributo importante al modello viene anche dalle due variabili di "diversità", ovvero l'estensione dei margini forestali e la diversità ambientale: in entrambi i casi esiste una relazione positiva. Non sembra emergere invece alcuna preferenza specifica per particolari condizioni climatiche.

Enrico Benussi

Storno

Sturnus vulgaris

Nidificante stanziale, migratore e svernante regolare, lo storno è comune e diffuso all'interno della ZPS, dove lo si rinviene in vicinanza dei centri abitati. La distribuzione della specie non sembra essere cambiata rispetto a quanto riportato da BENUSSI (1983), PETRUCCO & BENUSSI (1997) e PARODI (1999), e, anche per periodi meno recenti, da SCHIAVUZZI (1883), che lo definisce infatti "odiato all'eccesso e perseguitato con accanimento" a causa dei danni causati ai vigneti.

Nonostante sia ampiamente diffuso, la distribuzione della specie è abbastanza differente nelle varie zone della ZPS, risentendo del diverso grado di urbanizzazione del territorio: nel goriziano, ad esempio, sembra essere molto più localizzato, mentre è più diffuso nella parte centrale dell'area, in particolare nei pressi dei piccoli centri urbani circondati da ambienti agricoli, come Ceroglie, Malchina, Prepetto, Sgonico e Prosecco-Contovello. Nella porzione meridionale della ZPS le zone in cui la specie è risultata più abbondante sono quelle di Trebiciano, Pedriciano e Basovizza, anche queste caratterizzate dalla presenza di aree agricole limitrofe.

Da un punto di vista ecologico, il modello conferma il carattere decisamente sinantropico della specie ed evidenzia un effetto negativo del bosco, tranne che per valori di copertura molto limitati, che evidentemente contribuiscono a definire quelle situazioni più diversificate che la specie sembra preferire, e della deviazione standard dell'altitudine. Le aree caratterizzate da una copertura boschiva troppo estesa e da una morfologia accidentata sono risultate le meno idonee, mentre valori di idoneità maggiori si ritrovano nelle lande del gorizia-

no, nell'area tra Monfalcone e Duino e nella porzione meridionale della ZPS, in particolare nei dintorni di Basovizza.

Lia Buvoli

Passera oltremontana

Passer domesticus

Sedentaria nidificante, la passera oltremontana è osservabile in Carso durante tutto l'anno. Rispetto alla congenera passera d'Italia, considerata secondo le ultime rivisitazioni sistematiche come specie a se stante, risulta molto più diffusa e presente in tutto il territorio della ZPS. Come per le altre specie di passeri, la maggior parte delle osservazioni ricade in realtà appena all'esterno, o lungo il confine della ZPS, in corrispondenza dei centri urbani. La distribuzione della specie non sembra aver subito cambiamenti importanti, almeno rispetto ad un recente passato (BENUSSI 1983; PARODI 1999), quando era indicata, sia nella parte triestina che in quella goriziana, in particolare al confine con la Slovenia e nel Monfalconese, comune e abbondante. La carta delle abbondanze non sembra evidenziare un pattern ben definito, anche se, al pari della passera mattugia, i valori di abbondanza maggiori si raggiungono nella porzione centrale della ZPS.

Nella figura con la distribuzione delle osservazioni, i simboli scuri rappresentano le osservazioni riconducibili con certezza alla passera oltremontana, quelli chiari a *Passer spp.* (*Passer domesticus/italiae*).

Per quanto riguarda l'analisi delle preferenze ambientali, i due fattori più importanti, entrambi con effetto positivo, sono risultati la presenza di ambienti urbanizzati, il primo per contributo percentuale, e degli ambienti agricoli. La relazione con il bosco, quarto fattore per importanza, sembra indicare un effetto soglia, oltre la quale, all'aumentare della superficie forestale, la probabilità di presenza della specie diminuisce marcatamente. Anche in questo caso, come per la passera mattugia, la presenza della specie è più probabile nei

pressi dei centri abitati di piccole e medie dimensioni, mentre diminuisce se ci avviciniamo ai centri più grandi. L'insospitalità delle aree urbanizzate di maggiori dimensioni è un problema noto che riguarda anche questo territorio.

Guglielmo Londi

Passera d'Italia

Passer italiae

Specie sedentaria nidificante, osservabile durante tutto l'anno. Assurta, secondo i più recenti studi, a rango di specie (BRICHETTI & FRACASSO 2013), la passera d'Italia mostra una distribuzione decisamente differente nelle due provincie. PARODI (1999) la considera, rispetto alla passera oltremontana, molto più comune e abbondante in provincia di Gorizia, ad eccezione delle zone prossime al confine con la Slovenia e del Monfalconese dove invece è la passera oltremontana ad essere maggiormente diffusa. Un quadro sostanzialmente uguale è fornito da SCHIAVUZZI (1883, 1887); secondo questo autore infatti, già alla fine del XIX secolo, la "*Passera italiana*" era la più diffusa anche se, soprattutto durante l'inverno, e in particolare nei dintorni di Monfalcone e compresa la città, la passera oltremontana era considerata "*non rara*".

In provincia di Trieste la situazione è invece completamente diversa; BENUSSI (1983) indica la specie presente come nidificante fino al Monfalconese, ma non segnalata come tale in territorio triestino. Recentemente, diverse osservazioni per la provincia di Trieste sono riportate da vari rilevatori sul portale ornitho.it (AA. Vv. 2013); fatta eccezione per alcune segnalazioni riguardanti la città di Trieste e Muggia, praticamente tutte le osservazioni riguardano la zona di Duino, di Medeazza e il confine con la provincia di Gorizia (zone umide del Timavo). I dati raccolti in questa indagine confermano sostanzialmente il quadro conoscitivo appena descritto, con la stragrande maggioranza delle osservazioni effettuate nella parte goriziana della ZPS, ad eccezione di un nucleo, apparentemente isolato, individuato nel paese di Sgonico.

Nella figura con la distribuzione delle osservazioni, i simboli scuri rappresentano le osservazioni riconducibili con certezza alla passera d'Italia, quelli chiari a *Passer* spp. (*Passer domesticus/italiae*).

La passera d'Italia è ecologicamente molto affine alla passera oltremontana e infatti la presenza di ambienti urbanizzati, e in secondo ordine di ambienti aperti, ma non agricoli come nel caso della congenera, si confermano i due fattori più importanti nel caratterizzare le aree più idonee. Confrontando i modelli delle due specie, sembra emergere una differenza a livello climatico, con la passera d'Italia che mostra di preferire decisamente (il contributo del fattore è molto importante) le aree meglio esposte e quindi più calde.

Tommaso Campedelli

Passera mattugia

Passer montanus

Specie nidificante perlopiù sedentaria, la passera mattugia risulta distribuita prevalentemente nella porzione centro-settentrionale della ZPS. In realtà, la stragrande maggioranza delle osservazioni ricade appena fuori o comunque al confine con la ZPS, che infatti esclude praticamente tutti i centri abitati, anche quelli di più piccole dimensioni, particolarmente idonei alla specie. La distribuzione della passera mattugia sembra essere cambiata abbastanza negli ultimi anni, soprattutto nella parte triestina, dove agli inizi degli anni '80 del secolo scorso era definita comune e abbondante, anche nei centri abitati di maggiori dimensioni (BENUSSI 1983). Rispetto alla distribuzione indicata da PETRUCCO & BENUSSI (1997), la passera mattugia non è stata segnalata nell'estrema porzione meridionale della ZPS e sembrerebbe mancare anche dai principali nuclei abitati della porzione centrale dell'area, come ad esempio Villa Opicina.

La distribuzione della specie sembra in linea con le preferenze ambientali emerse dalle analisi ecologiche; la probabilità di trovare la passera mattugia è infatti maggiore in corrispondenza degli ambienti agricoli e in prossimità degli edifici isolati e dei piccoli nuclei abitati, in particolare nel settore centrale della ZPS dove più alti sono risultati i valori di idoneità ambientale. Sembra invece evitare le aree maggiormente antropizzate, caratterizzate dalla presenza di un edificato continuo. Potrebbe essere proprio la diminuzione nei centri abitati di maggiori dimensioni (es. Villa Opicina) la chiave per capire il cambiamento avvenuto nella distribuzione della specie.

Guido Tellini Florenzano

foto S. Candotto

Fringuello

Fringilla coelebs

Specie nidificante sedentaria, migratrice e svernante regolare, è, dopo il merlo, la specie in assoluto più comune e diffusa all'interno della ZPS. Questa situazione non sembra essere cambiata rispetto a quanto riportato da PETRUCCO & BENUSSI (1997) e PARODI (1999), e neanche rispetto a un passato meno recente; già alla fine del XIX secolo, SCHIAVUZZI (1883) la definisce infatti come nidificante abbondante. L'areale della specie copre interamente la ZPS, dove il fringuello appare decisamente ubiquitario, ampiamente distribuito in maniera continua e uniforme, e decisamente abbondante: la carta dell'abbondanza mostra infatti come le classi più frequenti siano quelle con i valori più alti. Il fringuello appare tuttavia più comune nella parte triestina del Carso, dove maggiore è lo sviluppo e l'estensione delle aree forestali; la presenza di vegetazione arborea è infatti l'unico fattore che influenza in maniera importante la probabilità di presenza della specie, ovviamente in senso positivo.

Il modello ecologico conferma il carattere ubiquitario del fringuello all'interno della ZPS, mostrando valori elevati di idoneità praticamente ovunque, ad eccezione di poche e circoscritte aree, coincidenti prevalentemente con gli spazi aperti e le zone umide tra Monfalcone e Doberdò del Lago. La presenza della specie sembra dipendere sostanzialmente da un unico fattore, gli ambienti forestali, con cui evidentemente il fringuello ha una relazione positiva e non solo nel caso delle aree boscate più estese e continue, ma ovunque vi sia un minimo di copertura arborea, aree agricole e centri urbani, preferibilmente di medie e piccole dimensioni, compresi.

Severino Vitulano

foto F. Florit

Verzellino

Serinus serinus

Nidificante e migratore regolare, occasionalmente svernante. Il verzellino risulta distribuito in modo piuttosto uniforme all'interno della ZPS, in particolare in prossimità dei centri abitati e lungo la costa, mentre manca completamente dalle aree forestali e a landa più estese e continue, in linea con quanto riportato da BENUSSI (1983), PETRUCCO & BENUSSI (1997) e Felcher e Zorzenon (in PARODI 1999). Nell'interno la specie è risultata più comune nelle zone di Precenico Inferiore, Slivia, Aurisina e Sgonico, nella parte centrale della ZPS, e nei dintorni di Basovizza e San Dorligo della Valle in quella meridionale. Lungo la costa, le abbondanze maggiori si sono registrate presso il Golfo di Sistiana e Grignano.

Il modello ecologico conferma la preferenza del verzellino per le aree urbanizzate, sia quelle di maggiori dimensioni, dove frequenta abitualmente parchi e giardini, sia di più piccole dimensioni, circondate da aree agricole diversificate. Risulta invece decisamente negativo l'effetto del bosco. Come per tutte le specie sinantropiche, la ZPS riveste un'importanza marginale, come si può facilmente intuire dalla distribuzione delle aree maggiormente idonee, tutte concentrate lungo i confini della ZPS, in prossimità dei centri urbani.

Paolo Bonazzi

foto M. De Luca

Verdone

Carduelis chloris

Considerato nidificante sedentario, migratore regolare e parzialmente svernante, il verdone si è adattato agli ambienti modificati dall'uomo come i coltivi, margini di boschi, parchi e giardini. Nidificante ubiquitario secondo BENUSSI (1983) e Felcher e Zorzenon (in PARODI 1999), la distribuzione attuale della specie sembra non discostarsi molto da quanto indicato in passato. La specie appare infatti ampiamente diffusa, ed è, dopo fringuello e frosone, la specie di fringillide più comune, con solo alcuni vuoti di presenza, principalmente nelle zone a landa più aperta del Carso goriziano e nelle aree forestali dense e continue che si estendono lungo il confine italo-sloveno e nel settore meridionale della ZPS. I valori di abbondanza più elevati si registrano nella parte centrale della ZPS, tra gli abitati di Opicina, Prosecco e Monrupino, dove il verdone risulta più legato alle aree agricole. La specie è risultata comune anche in alcune aree costiere, in particolare nei pressi di Duino, dove frequenta i giardini e i viali alberati, in particolare di pini, che arrivano fino sul mare.

I risultati delle analisi ecologiche evidenziano molto bene la natura "antropofila" del verdone, mostrando come la vicinanza ai centri urbani, in particolare di piccole dimensioni, collocati in un contesto agricolo diversificato e lontano dalle aree boschive più estese, siano i fattori che condizionano maggiormente la probabilità di presenza della specie, e conseguentemente, che caratterizzano le aree individuate dal modello come a maggiore idoneità.

Gianpiero Calvi

foto B. Dentessani

Cardellino

Carduelis carduelis

Specie nidificante sedentaria, migratrice e svernante regolare (FELCHER et al. 1991). Il cardellino era storicamente considerato molto comune e lo SCHIAVUZZI (1883) lo indica, rispetto agli altri nidificanti, come la specie con il periodo riproduttivo più esteso. Le successive indagini indicano una distribuzione ampia e continua in tutto il territorio del Carso, sia goriziano sia triestino (BENUSSI, 1983; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999).

I dati raccolti durante questa indagine hanno permesso di definire meglio la distribuzione della specie che appare, rispetto ad altre specie di fringillidi, tra cui il verdone, molto più frammentaria, soprattutto nel goriziano. La presenza del cardellino non è stata registrata, infatti, in numerosi elementi della griglia di rilevamento, in particolare in quelli caratterizzati da una maggiore copertura boschiva, ad esempio lungo il confine sloveno, ma anche in molte aree dell'altopiano, un po' lungo tutta la ZPS. La specie diviene inoltre poco comune, o del tutto assente, anche in corrispondenza delle aree aperte di maggiore estensione, come ad esempio tra Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari.

La carta del modello identifica la fascia occidentale della ZPS come la più idonea, senza tuttavia raggiungere mai valori particolarmente elevati. Un pattern simile si evince anche dalla carta dell'abbondanza. Questa situazione sembra dipendere dal fatto che praticamente tutti i centri abitati, risultati gli ambienti più frequentati dalla specie, sono esclusi dalla ZPS. La relazione positiva con i centri abitati mostra tuttavia un effetto soglia, ad indicare una preferenza per i centri abitati di piccole e medie dimensioni, meglio se caratterizzati da un

edificato discontinuo, e le zone periurbane, che spesso sono anche quelle più diversificate da un punto di vista ambientale, con la presenza di piccole aree agricole e vegetazione naturale. Si conferma inoltre l'effetto negativo legato alla presenza di ampie superfici boschive.

Paolo Bonazzi

Fanello

Carduelis cannabina

Nidificante sedentario, migratore regolare e svernante, il fanello era considerato abbastanza comune in ambiente carsico, sebbene localizzato in corrispondenza delle aree aperte con presenza di arbusti e scarsa vegetazione arborea (BENUSSI 1983; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999).

Rispetto a questa situazione, la distribuzione attuale sembra abbastanza diversa, in particolare sul Carso triestino (PETRUCCO & BENUSSI 1997), dove il fanello appare oggi molto meno diffuso nella parte centrale dell'altopiano, mentre è ancora relativamente comune lungo il confine con la Slovenia e lungo la costa. Non sembrano invece esserci stati cambiamenti significativi nella parte goriziana, almeno per quanto riguarda l'areale. È probabile che in queste zone, dove tra l'altro si registrano i valori massimi di abbondanza, il fanello sia stato avvantaggiato dagli incendi che vi si sono sviluppati alcuni anni fa, e che hanno ricreato condizioni più favorevoli a questa specie (aree aperte, giovani arbusteti). Sta di fatto che, a differenza di quanto si può evincere dalla lettura della bibliografia degli ultimi anni del secolo scorso, oggi il fanello è molto più diffuso ed abbondante sul Carso goriziano che su quello triestino, dove la specie ha probabilmente sofferto gli effetti di un generalizzato processo di afforestazione naturale.

Da un punto di vista ecologico, il modello evidenzia un effetto negativo degli ambienti agricoli, delle aree forestali e degli ambienti urbanizzati.

Il modello individua un'area principale a maggiore idoneità, abbastanza estesa, localizzata nella porzione nord-ovest della ZPS; altre aree idonee, di minore estensione, sono distribuite un po' lungo tutta l'area

protetta, in corrispondenza delle poche aree aperte rimaste, soprattutto nella parte meridionale della ZPS e lungo il confine con la Slovenia.

Paolo Bonazzi

Crociere

Loxia curvirostra

Migratore regolare e svernante con contingenti variabili, nidificante localizzato, il crociere frequenta prevalentemente le aree boscate con conifere, sia nelle formazioni miste che in quelle pure. Ha nidificato in Val Rosandra negli anni '80 nei boschi di *Pinus nigra* presso il M.te Stena e il M.te Cocusso (PERCO & UTMAR 1989); casi possibili di nidificazione riguardano inoltre tutta la parte orientale della ZPS (M.te Ermada, M.te Lanaro, M.te Francovec) e la pineta nei pressi di Banne (BENUSSI 2011), dove la specie risulta anche abbastanza comune.

Nessun dato di presenza è stato raccolto nella parte goriziana della ZPS, dove invece, secondo PARODI (1999), la specie era di presenza regolare. Caratterizzato da una fenologia riproduttiva irregolare, legata principalmente alla disponibilità alimentare (semi di conifere), il crociere si riproduce prevalentemente tra febbraio e marzo. Recentemente è stata accertata la nidificazione con adulti che imbeccano pulli da poco usciti dal nido nella Conca di Percedol il 14/05/2011 (N. Verginella com. pers.), mentre una coppia intenta nella costruzione del nido (su pino nero a circa 8 metri d'altezza) è stata osservata nel settore meridionale del M.te Cocusso il 16/03/2012. Le osservazioni tardo primaverili possono essere attribuite ad individui erratici provenienti dalla vicina Slovenia dove la specie è stata segnalata nidificante in varie località carsiche (DOPPS 2013). Specie abbastanza difficile da rilevare, il crociere potrebbe essere più abbondante di quanto emerso da questa indagine.

Da un punto di vista ecologico, il modello evidenzia una preferenza esclusiva per i boschi di conifere, men-

tre non sembrano emergere preferenze da un punto di vista climatico; la specie del resto è regolarmente osservabile anche in corrispondenza delle pinete costiere, dove infatti il modello indica valori di idoneità tra i più elevati.

Simonetta Cutini

Frosone

Coccothraustes coccothraustes

Il frosone è specie nidificante sedentaria, durante la stagione invernale ai contingenti locali si aggiungono individui provenienti dalle nazioni del centro ed est Europa. Il frosone è distribuito in modo uniforme all'interno della ZPS, dove frequenta tutte le tipologie ambientali; la situazione non sembra essere cambiata negli ultimi decenni (BENUSSI 1983; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999), mentre SCHIAVUZZI (1883) lo indicava "mediocrementemente frequente nell'epoca di migrazione autunnale nel mese di ottobre". Ampiamente diffuso, la cartina dell'abbondanza evidenzia valori massimi nella porzione centrale dell'area, dove la specie raggiunge abbondanze cospicue anche in prossimità della costa.

Per quanto riguarda le preferenze ecologiche, la presenza del frosone sembra essere positivamente influenzata sia dalla presenza del bosco sia degli ambienti agricoli. Il modello evidenzia inoltre un effetto soglia della deviazione standard dell'altitudine, una misura della sua variazione, indicando quindi una preferenza del frosone per aree mediamente accidentate, che sembrano individuare le zone centrali dell'altipiano, dove appunto la specie è più diffusa. La probabilità di trovare la specie aumenta inoltre avvicinandosi ai piccoli centri abitati e agli edifici rurali. Questa condizione è probabilmente da mettere in relazione con l'effetto positivo delle aree agricole, molto spesso inserite in contesti urbanizzati a bassa densità. È invece negativo l'effetto dei centri abitati più grandi, da cui la specie si tiene a maggiore distanza.

Valori bassi di idoneità ambientale si riscontrano solo in corrispondenza delle aree aperte più estese del

goriziano e in poche altre zone comunque di ridotta estensione; la carta sembra riflettere quindi appieno il carattere euriecio che la specie mostra in quest'area geografica, dove peraltro il frosone raggiunge densità non riscontrabili altrove (MESCHINI & FRUGIS 1993).

Tommaso Campedelli

Zigolo giallo

Emberiza citrinella

Specie migratrice non abbondante e svernante irregolare, nidificante localizzato, già considerato raro e localizzato da BENUSSI (1983) e PERCO & UTMAR (1989). I dati raccolti durante questo studio evidenziano una distribuzione prevalentemente concentrata nel settore meridionale della ZPS, dove è stato contattato in 9 diversi quadranti, in particolare nelle zone cespugliate alternate con tratti a landa del M.te Stena, di Pese/Grozzana e presso le pendici del M.te Cocusso, in corrispondenza dell'area dove è attivo un progetto di ripristino della landa e dove si stima siano presenti 6-8 coppie. Lo zigolo giallo è inoltre segnalato anche in alcune zone vicino al confine con la Slovenia, nei pressi di Gropada, e vicino agli abitati di Trebiciano e Padriciano, dove comunque è molto meno abbondante. In passato si è riprodotto anche negli ambienti limitrofi all'abitato di S. Lorenzo. SCHIAVUZZI (1883) lo citava come "specie migratrice autunnale non molto frequente".

Lo zigolo giallo predilige in generale gli ambienti aperti, come la landa, ma anche gli arbusteti e le aree agricole più diversificate. Il modello evidenzia inoltre una relazione negativa con il bosco e con gli ambienti urbani, in particolare quelli di maggiori dimensioni. Lo zigolo giallo predilige inoltre le aree con clima continentale, la probabilità di incontrarlo aumenta infatti allontanandosi dalla costa. Oltre alle aree in cui la presenza della specie è stata confermata, il modello individua tra le zone più idonee, gli ambienti a landa presenti nella porzione nord-occidentale della ZPS, in provincia di Gorizia; è probabile che in questo caso l'assenza della specie sia da imputare alle condizioni climatiche, qui più termofile.

Enrico Benussi

foto: F. Florit

Zigolo nero

Emberiza cirulus

Nidificante sedentario e migratore regolare, presente durante tutto l'anno, lo zigolo nero è distribuito in maniera abbastanza uniforme all'interno della ZPS, mancando esclusivamente dai settori più orientali, a ridosso del confine sloveno, dove insistono le formazioni forestali più estese e continue. La distribuzione emersa nell'ambito di questa indagine ricalca appieno quanto riportato da altri autori per la fine del secolo scorso, quando la specie era considerata comune e ben diffusa (PETRUCCO & BENUSSI 1997; Felcher e Zorzenon in PARODI 1999), come del resto lo doveva essere anche storicamente (SCHIAVUZZI 1883). Lo zigolo nero risulta particolarmente abbondante nella parte centrale della ZPS, anche in prossimità del mare, oltre che ai due estremi nord e sud.

Specie ad elevata valenza ecologica, il modello indica valori di idoneità piuttosto elevati per buona parte della ZPS, lo zigolo nero mostra di prediligere gli ambienti agricoli e aperti in generale, preferibilmente in contesti climatici non troppo secchi e termofili, la specie è effettivamente poco comune lungo la costa e nelle aree meglio esposte e più calde. Lo zigolo nero mostra una relazione positiva anche con il bosco, almeno nelle situazioni più diversificate e caratterizzate dalla presenza di frequenti interruzioni nella copertura arborea. Sembra inoltre sensibile al disturbo antropico, sia esso determinato dalla presenza di grandi arterie stradali (la presenza della specie diminuisce in maniera importante avvicinandosi alle strade maggiormente trafficate), o dalla vicinanza dei paesi e dei centri abitati di maggiori dimensioni.

Enrico Benussi

foto R. Parodi

Zigolo muciatto

Emberiza cia

Nidificante sedentario, lo zigolo muciatto è presente in Carso durante tutto l'anno. Rispetto al congenere zigolo nero, mostra una maggiore presenza lungo la costa e una distribuzione più uniforme nella parte centro-orientale della ZPS, dove la specie fa registrare i massimi valori di abbondanza, arrivando ad occupare anche le aree prossime al confine. Lo zigolo muciatto risulta relativamente abbondante anche in alcune aree nella parte nord della ZPS, in particolare a est di Monfalcone e vicino al Lago di Doberdò. La distribuzione della specie non sembra aver subito negli ultimi decenni cambiamenti degni di nota (PETRUCCO & BENUSSI 1997; PARODI 1999), mentre storicamente era ritenuto non nidificante (SCHIAVUZZI 1883).

Lo zigolo muciatto mostra una preferenza per ambienti caratterizzati da un certo grado di variabilità, il modello evidenzia infatti un effetto positivo importante della variabilità dell'altitudine e dell'uso del suolo, quest'ultima ben evidente se si considerano nell'insieme l'effetto delle diverse tipologie ambientali. Il bosco ha, infatti, un effetto negativo come anche gli altri usi del suolo presi singolarmente, mentre hanno un effetto positivo i margini del bosco. La relazione con questi ultimi e con gli ambienti agricoli è di tipo quadratico, ovvero esiste un valore soglia di copertura, oltre il quale la probabilità di trovare lo zigolo muciatto diminuisce. La specie è legata ad ambienti ecotonali e a un elevato grado di microdiversità. Questo spiega, ad esempio, la presenza dello zigolo muciatto anche nelle zone forestali orientali più estese dove, però, in corrispondenza delle aree più acclivi, o anche, ad esempio, delle strade, il bosco cede il posto ad ambienti di margine, evidentemente

molto idonei per la specie. Altre zone particolarmente idonee sono distribuite lungo la costa, in particolare in corrispondenza delle falesie, in Val Rosandra e tra Medeazza e Sablici.

Guglielmo Londi

Strillozzo

Emberiza calandra

Sedentario nidificante e comune durante le migrazioni, lo strillozzo mostra una distribuzione piuttosto localizzata, con la stragrande maggioranza delle osservazioni concentrate in due sole aree ben definite, una nella parte goriziana, che comprende le alture di Polazzo e zone vicine, prevalentemente a nord di Medeazza, e una invece nella parte meridionale della ZPS, tra Pese e Grozzana, lungo il confine con la Slovenia. Unica segnalazione al di fuori di queste aree, un individuo osservato nei pressi di Padriciano, vicino al campo da golf. Lo strillozzo risulta quindi molto localizzato, in corrispondenza dei pochi ambienti aperti ancora presenti. Considerato storicamente comune (SCHIAVUZZI 1883), e anche più recentemente indicato da Felcher e Zorzenon (in PARODI 1999) e BENUSSI (1983) abbastanza comune, sebbene poco diffuso, è probabile che negli ultimi anni la specie abbia subito una diminuzione importante, sia in termini numerici che di areale. Nella parte triestina sembra essere scomparsa dalla maggior parte delle residue zone di landa, ambienti una volta prediletti dalla specie.

Le analisi delle preferenze ecologiche evidenziano, come noto, una relazione positiva importante con gli ambienti aperti e, contemporaneamente, un effetto negativo della presenza del bosco; la variabile con il contributo maggiore tuttavia è la distanza dalla linea di costa, con la probabilità di presenza che aumenta allontanandosi dal mare. La ragione di questo effetto, più che a una specifica preferenza per condizioni climatiche più continentali, è probabilmente legata al fatto che le poche aree aperte idonee sono lontane dal mare, dove invece prevalgono ambienti rocciosi e boschivi, poco idonei alla specie.

Guido Tellini Florenzano

foto R. Parodi

picchio rosso minore
Dendrocopos minor

tottavilla
Lullula arborea

allodola
Alauda arvensis

rondive
Hirundo rustica

balestruccio
Delichon urbicum

calandro
Anthus campestris

ballerina gialla
Motacilla cinerea

ballerina bianca
Motacilla alba

pettirosso
Erithacus rubecula

usignolo
Luscinia megarhynchos

codiroso spazzacamino
Phoenicurus ochrurus

codiroso comune
Phoenicurus phoenicurus

Tav. I - Nelle pagine precedenti (pagg. 168-174) vengono proposte le mappe relative all'abbondanza delle specie (quelle per le quali sono stati raccolti dati sufficienti), per la cui elaborazione sono stati utilizzati i soli dati raccolti con i rilevamenti standard, relativi a individui nidificanti. Il dato è espresso come individui/km di transetto per ciascuna unità di campionamento.

- In the previous pages (168-174) the maps related to the abundance of species (those for which sufficient data have been collected) are proposed. For their processing only the data collected with standard surveys - relative to nesting individuals and expressed as individuals / km of transect for each sampling unit - have been used.

Tav. II - Nelle pagine successive (pagg. 175-182) è riportata, sempre per le specie con un numero sufficiente di dati, per le quali è stato possibile condurre le analisi e costruire i modelli per le preferenze ambientali, la mappa con la rappresentazione del modello d'idoneità ambientale (con colore di intensità crescente al crescere dell'idoneità). Le mappe di passera oltremontana e passera d'Italia sono costruite solo con i dati di identificazione specifica certa.

- In the following pages (175-182), again for the species with a sufficient number of data, for which it has been possible to conduct the analyses and build the models for environmental preferences, the map with the representation of the model itself (with color of increasing intensity as eligibility increases) are reported. Maps on Italian and House Sparrows are built using only the sightings with certain species identification.

Indicazioni gestionali (EB, TC, GL)

L'analisi dei dati raccolti durante i quattro anni di indagine, il loro confronto con la situazione pregressa e la valutazione delle dinamiche socio-economiche che hanno interessato negli ultimi decenni l'area del Carso, hanno permesso di individuare sei principali criticità ambientali discusse nei paragrafi che seguono. In alcuni casi queste interessano più aree o la ZPS nel suo insieme, come ad esempio la scomparsa della landa e la perdita più in generale degli ambienti aperti, in altri invece riguardano zone più ristrette, come succede ad esempio nel caso del disturbo causato da escursionisti e rocciatori.

Conservazione della landa carsica e degli ambienti aperti

La conservazione della landa, anche nei suoi primi stadi evolutivi, quando cioè la copertura arbustiva è presente ma ancora ridotta, rappresenta indubbiamente l'obiettivo di tutela più importante della ZPS. Questa particolare tipologia ambientale, la cui origine si fa risalire addirittura all'età del Bronzo, con la comparsa, anche in Carso, della pastorizia, si è creata grazie al pascolamento di bestiame, in particolare di ovini e caprini, su superficie disboscate dall'uomo. Oggi la landa è minacciata principalmente dal processo di afforestazione naturale che, cessate le attività di pascolo, sta trasfor-

mando, radicalmente e molto velocemente, gli ultimi lembi di questo ambiente in boscaglia. In alcune aree, come ad esempio la landa di Banne (Fig. 7), è invece la rinnovazione della pineta a minacciare l'integrità e la funzionalità ecologica di questo ambiente.

Numerose sono le specie legate a questo particolare tipo di ambiente, alcune purtroppo scomparse, come la coturnice (*Alectoris graeca*) e la calandrella (*Calandrella brachydactyla*), altre molto rare o in procinto di estinguersi, come l'allodola e il calandro, altre ancora, come l'averla piccola, lo zigolo giallo e il saltimpalo, per fortuna più diffuse ma comunque in uno stato di conservazione tutt'altro che soddisfacente.

Sommando l'idoneità ambientale calcolata con i modelli ecologici realizzati per le specie che sono risultate maggiormente legate agli ambienti aperti, e sovrapponendo queste aree con quelle occupate dalla landa (Carta dell'uso del suolo Regione Friuli Venezia Giulia), abbiamo identificato le zone di maggior valore ornitologico, in cui concentrare gli sforzi di conservazione e ripristino (Fig. 9).

La conservazione delle residue superfici a landa carsica e il ripristino di superfici occupate fino a non molto tempo fa da questo ambiente, costituisce la principale emergenza per la tutela della biodiversità nel territorio carsico. Lo stesso Piano di gestione della ZPS prevede, tra i propri obiettivi, quello di ridurre la superficie a boscaglia carsica attraverso il ripristino della landa. Questo tipo di intervento può essere realizzato mediante interventi diretti di disboscamento e decespugliamento, ma anche attraverso l'utilizzo del fuoco prescritto. Questa tecnica di gestione degli ambienti aperti ampiamente utilizzata negli altri paesi europei, e solo recentemente riconosciuta come efficace anche in Italia (ASCOLI & BOVIO 2013), ha come vantaggio, oltre a quello di ripristinare in maniera efficace superfici significative di ambienti aperti, quello di ridurre i costi degli interventi e, cosa ancora più importante, il rischio di incendi distruttivi riducendo il carico di combustibile presente. Per quanto riguarda invece le residue superfici in cui ancora la landa è presente, praticamente tutte sono oggi minacciate da processi di afforestazione naturale e in

alcune situazioni, come ad esempio la landa di Banne e quella sul M.te Stena, in particolare dalla rinnovazione delle pinete che si trovano ai margini. In questi casi è assolutamente necessario intervenire in tempi brevi 1) eliminando tutti gli arbusti e/o la rinnovazione presenti all'interno degli ambienti di landa 2) creando, all'interno della pineta o dell'area boscata confinante, una fascia di transizione tra il bosco e la landa, in cui effettuare tagli di diradamento della copertura arborea. Ovviamente tutte queste azioni potranno avere un qualche effetto positivo solo se saranno accompagnate da forme di utilizzo che permettano una manutenzione continua di queste aree: ecco perché è fondamentale incentivare il pascolo brado in ambienti a landa e semplificare le procedure per la riapertura di aree a pascolo in zone di bosaglia.

A questo proposito è opportuno segnalare il progetto "Pascolanda", un progetto di ripristino della landa realizzato dall'Amministrazione provinciale di Trieste vicino a Basovizza, alle pendici del M.te Cocusso (Fig. 8). Il progetto ha previsto una prima fase di taglio della vegetazione arborea e arbustiva, in particolare pinete di scarso valore naturalistico, e quindi il ripristino del pascolo brado: gli ettari interessati, complessivamente, sono circa 70 (Fig. 9). Attualmente pascolano nell'area gruppi di bovini, caprini e ovini ed è attivo un punto vendita di prodotti a km zero (PROVINCIA DI TRIESTE 2004).

Tutela e gestione delle Aree agricole

Le aree agricole, esclusi i prati e i pascoli, rappresentano, con una estensione di 103 ha circa, neanche l'1% della superficie totale della ZPS. Si riconoscono principalmente due tipi di ambienti agricoli, uno più diversificato, strettamente associato ai piccoli insediamenti rurali, e che infatti interessa marginalmente la ZPS, dove a colture arboree, principalmente vite e olivo, si alternano, poche, coltivazioni erbacee, e uno invece più estensivo, dove invece sono le colture erbacee a essere predominanti e gli spazi a vegetazione naturale, preva-

lentemente bosco, occupano superfici importanti. Questi ultimi sono particolarmente diffusi nella porzione sud della ZPS, tra gli abitati di Basovizza, Pese e Grozzana. In queste aree sono inoltre concentrate la maggior parte delle attività zootecniche che però, rispetto anche ad un recente passato, risultano oramai marginali da un punto di vista produttivo. Tuttavia, ultimamente, questo settore ha dato alcuni segnali di ripresa, segnali che sarebbe importante sostenere, come ad esempio la nascita della cooperativa che fa parte del progetto di ripristino della landa a Basovizza, gestito dalla provincia di Trieste (PROVINCIA DI TRIESTE 2013), ma anche l'apertura all'interno delle aziende di prodotti a km zero.

L'importanza degli ambienti agricoli per l'avifauna, e la biodiversità in generale, è ampiamente noto, in particolare nel contesto mediterraneo (BLONDEL & ARONSON 1999), e la conservazione di numerosissime specie, non solo di uccelli, è proprio legata al mantenimento di pratiche agricole e zootecniche (BURFIELD & VAN BOMMEL 2004). Tuttavia, queste attività, affinché possano contribuire a mantenere elevati livelli di biodiversità, devono essere realizzate, per usare un termine forse abusato, in modo sostenibile, prevedendo ad esempio il mantenimento di spazi naturali, anche di piccole dimensioni, e la diminuzione degli input chimici e della intensità delle lavorazioni (per una review degli effetti delle pratiche agricole sulla biodiversità vedi DICKS et al. 2014).

Nell'ambiente carsico le specie legate agli ambienti agricoli sono tuttavia poche; analizzando complessivamente i risultati delle analisi sulle preferenze ecologiche delle specie, gli ambienti agricoli sembrano rivestire un'importanza molto limitata (cfr. Risultati generali). Le uniche specie che mostrano un legame importante con questo tipo di ambiente sono lo zigolo giallo, la passera mattugia, la passera oltremontana e lo strillozzo. L'allodola, oramai quasi scomparsa dal Carso, è infatti concentrata nelle poche aree di landa, e lo stesso vale anche per altre specie più diffuse, come il saltimpalo, la tottavilla, l'averla piccola e la sterpazzola: per tutte queste, i sistemi agricoli del Carso

Fig. 7 - Landa carsica di Banne; in evidenza la rinnovazione della pineta che minaccia la conservazione dell'ecosistema.
- *Banne Karst land: in evidence the pine forest renewal that threatens the preservation of this habitat.*

Fig. 8 - Come si presenta una delle aree ripristinate con il progetto "Pascolanda" (Basovizza).
- *"Pascolanda" project area after pine and shrub removal (Basovizza).*

Fig. 10 - Carta delle aree boscate della ZPS.
- Woodlands map of the SPA.

Fig. 9 - Carta delle aree a landa di maggior valore ornitologico.
- Most important Karst landa areas for breeding birds.

non sembrano rappresentare ambienti particolarmente idonei. Questo dipende probabilmente dalla superficie esigua occupata dai sistemi agricoli, che ne limitano la funzionalità ecologica, soprattutto per quelle specie legate ad ambienti estensivi, come lo sono, ad esclusione dell'averla piccola, quelle citate in precedenza e che infatti si trovano più comunemente nelle aree a landa e negli arbusteti più radi. Nella porzione meridionale della ZPS, dove sono più diffuse le colture erbacee, che sarebbero particolarmente idonee per alcune di queste specie, è invece l'eccessivo livello di frammentazione, causato da una presenza diffusa e importante del bosco, a diminuire l'idoneità di questi ambienti.

Gestione forestale

Le profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato, forse più di altri, questo territorio, hanno determinato un notevolissimo aumento della superficie forestale (Fig. 10).

La maggior parte della ZPS è oggi coperta da boschi di scarso valore naturalistico, per lo più boscaglia carsica, mentre le compagini forestali di maggiore interesse sono rappresentate dagli impianti artificiali di pino nero *Pinus nigra*, alcuni realizzati durante la dominazione austriaca e quindi più che centenari, e da alcune porzioni, in realtà limitate, di boschi di latifoglie lungo il confine con la Slovenia, nelle aree comprese tra M.te San Leonardo e Col dell'Agnello, sul M.te Orsario e nella estrema porzione meridionale della ZPS. Le pinete in particolare ospitano popolamenti ornitici molto ricchi e diversificati e rivestono una certa importanza anche per alcune specie di notevole interesse, come ad esempio il picchio nero, l'astore e il regolo.

Lo stato di conservazione di questi boschi, e dell'avifauna che vi nidifica, non sembra presentare particolari problemi, anzi, la maggior parte delle specie legate a questi ambienti ha mostrato negli ultimi decenni una tendenza all'espansione e all'incremento numerico. Tuttavia, almeno in certe situazioni, sarebbero auspicabili interventi mirati di gestione, come ad esempio il diradamento delle pinete più dense o l'avviamento ad alto fusto di parte dei boschi di latifoglie. Quest'ultimo intervento in particolare, permetterebbe di incrementare in maniera significativa l'habitat idoneo per alcune specie di interesse, poco diffuse o del tutto assenti in territorio italiano, ma che però sono abbastanza diffuse

in Slovenia e da dove potrebbero facilmente immigrare (DOPPS 2013). Tra questi il picchio cenerino, presente nel versante italiano ma ancora poco diffuso, il picchio rosso mezzano (*Dendrocopos medius*), segnalato pochissime volte e comunque di comparsa irregolare, ma anche, almeno nelle situazioni climatiche più adatte, di alcune specie di rapaci notturni, come l'allocco degli Urali (*Strix uralensis*) e la civetta capogrosso (*Aegolius funereus*), oltre naturalmente a numerose altre specie più comuni e diffuse, come ad esempio il picchio rosso minore e alcune specie di rapaci diurni. Un problema, in particolare per le pinete, può essere rappresentato dagli incendi.

Il Piano di Gestione della ZPS individua un congruo e articolato numero di misure che, se applicate, potrebbero sicuramente contribuire a migliorare il valore naturalistico dei boschi del Carso. Tra le buone pratiche di gestione forestale, il Piano prevede anche la trasformazione degli impianti artificiali di conifere, nella fattispecie di pino nero, in boschi misti. È necessario valutare con attenzione l'opportunità di interventi di questo tipo, in particolare nelle pinete più mature e di maggiore valore, che potrebbero perdere la loro specificità.

Urbanizzazione, infrastrutture e consumo di suolo

La ZPS, così come è stata perimetrata, non comprende alcuna area urbanizzata, fatta eccezione per alcune case isolate e piccoli centri rurali. Tuttavia, gli effetti legati ad una crescente urbanizzazione e sviluppo delle infrastrutture, sebbene non interessi direttamente il territorio dell'area protetta, ha evidentemente importanti effetti negativi sulla conservazione delle specie che vi nidificano, sia in termini di frammentazione degli habitat, e quindi di riduzione della loro funzionalità ecologiche, sia di disturbo diretto, in particolare nel caso delle arterie di comunicazione (Fig. 11).

Selezionando le specie che hanno mostrato un effetto negativo legato alla presenza di ambienti urbanizzati e calcolando per queste le aree a maggiore idoneità, è stata redatta una carta della sensibilità all'urbanizzazione. Le aree che mostrano valori più elevati sono quelle in cui la realizzazione di infrastrutture o l'espansione dei nuclei urbani avrebbe le conseguenze negative maggiori sulle specie nidificanti. La risoluzione di questa problematica non può che passare attraverso la definizione di una politica di pianificazione territoriale che abbia come priorità la riduzione del consumo di suolo, anche attraverso una politica di riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, in particolare di quello militare oggi in disuso. Tutto il territorio del Carso è infatti puntellato di ex-caserme ed edifici militari di vario tipo non più utilizzati e in totale stato di abbandono. Una politica abitativa incentrata sul riuso delle strutture esistenti potrebbe avere quindi effetti molto positivi. È tuttavia opportuno valutare attentamente gli eventuali piani di ristrutturazione, compreso l'uso ultimo che si vorrà fare degli immobili, in quanto

Fig. 11- Carta della sensibilità dell'avifauna nidificante all'urbanizzazione.

- Map of bird sensitivity to urbanization.

alcuni di essi cadono all'interno, o nelle immediate vicinanze, di ambienti di notevole importanza naturalistica, come ad esempio l'ex-caserma Monte Cimone, che confina con la landa di Banne, o l'ex-polveriera di Stato, nei pressi di Borgo Grotta Gigante, circondata anch'essa da uno degli ultimi lembi di landa carsica.

Fruizione e disturbo antropico a carico degli ambienti rupestri

La conservazione degli ambienti rupestri, e ovviamente delle specie che vi nidificano, passa infatti attraverso un controllo, e dove necessario, una regolamentazione degli accessi e delle attività di pubblica fruizione. Come detto in sede di introduzione, questo aspetto è legato ad alcune attività specifiche e riguarda zone limitate della ZPS, in particolare gli ambienti rupestri della Val Rosandra e alcuni siti di cava oggi abbandonati.

Negli ultimi anni infatti si sono registrati alcuni casi di interruzione di nidificazioni di specie di notevole interesse - ad esempio di gufo reale - a causa del disturbo provocato da rocciatori e escursionisti. La necessità di regolamentare gli accessi lungo le vie di roccia e, soprattutto, l'apertura di nuove, appare particolarmente stringente all'interno della Val Rosandra ma anche, come detto, all'interno di quei siti di cava oggi abbandonati, o che lo saranno in futuro, e che potrebbero essere considerati da alcuni fruitori palestre di roccia ideali. L'applicazione di un provvedimento di questo tipo risulta avvantaggiata dal fatto che le specie più sensibili al disturbo, ovvero il gufo reale e il falco pellegrino, hanno una fenologia riproduttiva particolarmente precoce, in particolare il gufo reale, e monitorando i pochi siti idonei si possono

individuare, con largo anticipo, almeno rispetto alla stagione primaverile ed estiva, in cui si concentra la maggior parte delle attività outdoor, le aree da interdire. L'altro aspetto legato alla conservazione degli ambienti rupestri, è quello della gestione degli ex-siti di cava. In alcuni di questi ambienti, seppur artificiali, troviamo le stesse specie che nidificano nelle pareti naturali della Val Rosandra o della scogliera di Duino e perciò rappresentano situazioni di estremo interesse, da tutelare non solo indirettamente, come detto in precedenza, ma anche direttamente, ad esempio attraverso l'approvazione di specifici piani di ripristino a conclusione delle attività di coltivazione.

Conservazione delle zone umide

Nonostante l'altopiano carsico, se si eccettua il Torrente Rosandra, sia di fatto privo di acque superficiali "permanenti", all'interno della ZPS si trovano alcune zone umide di notevole interesse naturalistico, prima su tutta la cassa di colmata del Lisert. Quest'area, in assoluto la più importante di tutta la ZPS, rientra solo in parte all'interno dell'area protetta e risulta minacciata da alcuni progetti di ampliamento dell'area industriale e del porto di Monfalcone.

I risultati di quattro anni di monitoraggio ornitologico confermano appieno l'importanza di quest'area, nota già da tempo, non solo come sito di nidificazione per numerose specie acquatiche, tra cui il fratino (UTMAR 2011), unico sito in regione in cui la specie si riproduce ancora, ma anche come area di sosta durante la migrazione e per lo svernamento.

Manoscritto pervenuto il 10.XII.2017 e approvato il 13.III.2018.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare Luca Boscain, Antonio Bossi, Matteo Cargasacchi e Nereo Verginella per averci concesso l'utilizzo dei loro dati inseriti sul portale ornitho.it, e Luigino Felcher e Tarcisio Zorzenon per aver collaborato ai rilevamenti del 2010. Questo lavoro è stato finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Progetto monitoraggio ornitologico integrato della Zona di Protezione Speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia".

Riassunto: In questo lavoro vengono presentati i risultati di quattro anni di censimenti (2010-2013) dell'avifauna nidificante nella ZPS "Aree carsiche della Venezia Giulia". In realtà, almeno per le specie di maggior interesse conservazionistico, le informazioni presentate abbracciano un periodo di tempo molto più lungo e forniscono preziose e talvolta inedite informazioni sull'evoluzione delle popolazioni negli ultimi 30-40 anni.

La ZPS si estende per oltre 12000 ha a cavallo tra le provincie di Trieste e Gorizia. La sua posizione, le caratteristiche geo-morfologiche e climatiche dell'altopiano carsico e l'influenza del mare determinano, in uno spazio limitato, la presenza di condizioni ambientali molto diverse e conseguentemente di un numero molto elevato di specie, con elementi tipici dell'avifauna alpina e montana che si

riproducono a pochi chilometri di distanza dai siti di nidificazione delle specie tipiche della macchia mediterranea. Complessivamente, nei quattro anni di indagine, sono state contattate 188 specie; di queste 114 sono nidificanti (16 quelle di interesse conservazionistico *sensu Dir. 79/409/CEE e succ. mod.*) mentre per altre due specie sono stati raccolti indizi di nidificazione che comunque meritano conferma. Le aree che mostrano valori più elevati di ricchezza sono concentrate nella parte settentrionale, dove si trovano le maggiori superfici a landa e le principali zone umide, mentre in quella centrale e meridionale i valori più elevati riguardano aree più localizzate, ad esempio lungo il confine sloveno e in Val Rosandra. La ricerca, finanziata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha previsto diverse attività: l'attività principale, che è consistita nei rilievi di campagna, e due approfondimenti, uno sull'ecologia riproduttiva delle specie e uno più specifico sulla biologia riproduttiva delle specie di maggiore interesse conservazionistico e gestionale.

I rilievi di campagna sono stati realizzati con una metodologia standard, in questo caso i transetti, che ha permesso di raccogliere informazioni non solo sulla distribuzione delle diverse specie ma anche sulla loro abbondanza relativa. L'area di studio era stata preventivamente suddivisa in 178 unità di rilievo, ciascuna visitata almeno quattro volte, una in ciascun anno di rilievi, nel periodo compreso tra febbraio e agosto. Per quanto riguarda invece l'approfondimento sull'ecologia riproduttiva, per 87 specie per le quali sono stati raccolti un numero di osservazioni sufficiente, sono stati elaborati modelli ecologici che hanno permesso sia di evidenziare i parametri ambientali che più ne influenzano la probabilità di presenza, sia di individuare le aree a maggiore idoneità. Molto interessanti anche i dati scaturiti dalla ricerca sulla biologia riproduttiva; si tratta di una mole di dati di assoluto interesse, qui riportati solo in parte, molti dei quali antecedenti al periodo di indagine e frutto di monitoraggi iniziati oramai decine di anni fa.

L'atlante consta di una parte principale costituita dalle schede monografiche delle specie, dove sono riportate le carte di distribuzione delle osservazioni, quella riassuntiva con le categorie di nidificazione per ciascuna unità di rilievo e, per le specie per le quali sono stati elaborati i modelli ecologici, un grafico riassuntivo dei risultati delle analisi con indicati i parametri, il tipo di relazione (positiva o negativa) e la loro importanza. La scheda è completata da un commento sintetico che riassume le informazioni raccolte. Le carte dell'abbondanza relativa e quelle con indicate le aree a maggiore idoneità ambientale sono invece riportate in appendici separate. Completano il lavoro un capitolo descrittivo delle metodologie di censimento e di analisi dei dati, uno sui risultati generali, un breve inquadramento ornitologico dell'area e un capitolo conclusivo sulle priorità gestionali dell'area, per lo meno quelle desunte dall'analisi dei popolamenti ornitici nidificanti e delle loro preferenze ecologiche.

Summary: *This work presents the results of four years (2010-2013) of breeding bird census in the SPA "Aree Carsiche della Venezia Giulia". Indeed, at least for species of greatest conservation importance, the information presented span over a much longer period of time and they provide valuable and sometimes unpublished information on the evolution of populations over the last 30-40 years. The SPA extends over 12,000 hectares across the provinces of Trieste and Gorizia. Its location, the geo-morphological characteristics and climatic conditions of the Karst plateau and the influence of the sea, determine, in a limited space, the presence of very different environmental conditions and, consequently, of a very large number of species, with typical elements of Alpine and mountain avifauna breeding a few kilometers away from the nesting sites of the typical species of the Mediterranean scrub. Overall, in the all period, 188 species were contacted; of these 114 are nesting (16 those of conservation interest *sensu Dir. 79/409/EEC and subsequent mod.*) while for other two we collected nesting clues which however deserve confirmation. The areas that show higher richness values are concentrated in the northern part, where there are the greatest amount of "landa" surfaces (the characteristic and ever more rare dry Karst grassland) and the main wetlands, while in the centre and south the highest values concern more localized areas, for example along the Slovenian border and in the Val Rosandra area. The research, funded by Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, has planned several activities: the field surveys, the*

main one, and two insights, one on reproductive ecology of the species and one, more specific, on the reproductive biology of the species of greater conservation and management interest.

Field surveys were carried out using a standard methodology, in this instance line transects, which allowed to gather information not only on the distribution of the species but also on their relative abundance. The study area had previously been subdivided into 178 units (based on a 1x1 square kilometer grid), each visited at least four times, one in each year, in the period between February and August. As for the breeding ecology insight, for 87 species for which they were collected a sufficient number of observations, ecological models have been developed allowing us to highlight the environmental parameters that most affect the probability of the presence of species and to identify the mostly suitable areas. Very interesting was also the data from the breeding biology study, only partially reported here, that represent the outcomes of a monitoring activity begun tens of years ago. The atlas consists of a main part with the monographs of the breeding species; here, along with a brief text summarizing all the information collected, it is reported one map of observations distribution, one with the breeding categories for each sample unit and, for the species for which the ecological models were carried out, a summary graph of the results of the analyses with the most important environmental parameters, the type of relationship (positive or negative) and their importance. The relative abundance maps and those with the most suitable areas are instead shown in separate appendices. The volume is completed by a descriptive chapter of the census and data analysis methodology, a chapter on overall results, a brief ornithological framing of the area, and a concluding chapter on the conservation priorities of the area, at least those derived from bird ecology and distribution analysis.

Bibliografia

- AA. VV. 2013. In *www.ornitho.it*. consult. dicembre 2013.
- ASCOLI, D., & G. BOVIO. 2013. Prescribed burning in Italy: issues, advances and challenges. *iForest* 6: 79-89 [online 2013-02-07; <http://www.sisef.it/iforest/>].
- BEMBICH, L. 2001. First breeding of the Yellow-Legged Gull *Larus cachinnans* Michahellis in the Karst. *Acrocephalus* 22 (109): 227-8.
- BENUSSI, E., & L. BEMBICH. 1998. Caratteristiche, status ed evoluzione della colonia urbana di *Larus cachinnans* Michahellis nella città di Trieste. *Annales* 13: 67-74.
- BENUSSI, E. 1983. Contributo allo studio dell'ornitofauna nidificante in Provincia di Trieste. *Atti Mus. civ. St. nat. Trieste* 34 (3): 127-41.
- BENUSSI, E. 1991. La nidificazione di Rondine rossiccia nel Carso triestino ed ulteriori dati sulla distribuzione in Italia e Corsica. *Fauna* 2 (2): 58-61.
- BENUSSI, E. 1997. Indagine su una popolazione di rapaci notturni (Strigiformes) dell'Italia Nord-orientale. *Falco* 12: 5-12.
- BENUSSI, E. 2008. *Monitoraggio di uccelli Strigiformi e Caprimulgiformi nel perimetro del SIC IT 3340006 Carso triestino e goriziano e della ZPS IT 3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia*. Reg. Aut. Friuli Venezia Giulia. Dir. cent. Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna.
- BENUSSI, E. 2010. *Piano di conservazione e sviluppo della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra*. Ornitofauna. D.R.E.A.M. Italia. Comune di S. Dorligo della Valle (TS).
- BENUSSI, E. 2011. *Atlante Ornitologico della Provincia di Trieste*. Corologia, Fenologia, status e distribuzione. Univ. Studi di Trieste. Fond. Cassa di Risparmio di Trieste. (inedito).
- BENUSSI, E. 2013. In *www.ornitho.it*, consult. dicembre 2013.
- BENUSSI, E., & F. PERCO. 1984. Osservazioni eco-etologiche sull'astore, *Accipiter g. gentilis*, nel Carso triestino. *Gli Uccelli d'Italia* 9 (1-2): 3-25.
- BENUSSI, E., P. GALEOTTI & A. GARIBOLDI. 1997. La comunità di Strigiformi della Val Rosandra nel Carso triestino. *Annales* 11: 85-92.
- BENUSSI, E., & M. SERIANI. 1991. Densità dei siti riproduttivi di Astore in un'area della regione alto-adriatica. In *Atti II Sem. It. Censimenti Faunistici dei Vertebrati* (Brescia, 1989), cur. M. Fasola, 267-70. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 16.
- BLONDEL, J., & J. ARONSON. 1999. *Biology and Wildlife of the Mediterranean Region*. Oxford: Oxford University Press.
- BOCCA M. & U.G. FALCONE. 1999. Caratteristiche dei siti riproduttivi del Picchio nero *Dryocopus martius* in una valle delle Alpi Graie (Parco Naturale del Monte Avic, Valle d'Aosta). *Avocetta* 23: 112.
- BRAMBILLA, M., S. VITULANO, F. SPINA, N. BACCETTI, G. GARGALLO, E. FABBRI, F. GUIDALI & E. RANDI. 2009. A molecular phylogeny of the *Sylvia cantillans* complex: Cryptic species within the Mediterranean basin. *Mol. Phylogenet. Evol.* 48: 461-72.
- BRICHETTI, P., & G. FRACASSO. 2003. *Ornitologia Italiana. Vol. 1 - Gaviidae-Falconidae*. Bologna: Oasi A. Perdisa.
- BRICHETTI, P., & G. FRACASSO. 2008. *Ornitologia Italiana. Vol. 5 - Turdidae-Cisticolidae*. Bologna: Oasi A. Perdisa.
- BRICHETTI, P., & G. FRACASSO. 2010. *Ornitologia Italiana. Vol. 6 - Sylviidae-Paradoxornithidae*. Bologna: Oasi A. Perdisa.
- BRICHETTI, P., & G. FRACASSO. 2013. *Ornitologia Italiana. Vol. 8 - Sturnidae-Fringillidae*. Bologna: Oasi A. Perdisa.
- BROTONS, L. 2004. Mallerenga emplomallada *Parus cristatus*. In *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*, cur. J. ESTRADA, V. PEDROCCHI, L. BROTONS & S. HERRADO, 456-7. Institut Català d'Ornitologia, Lynx Edicions.
- BURFIELD, I., & F. VAN BOMMEL, cur. 2004. *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. Cambridge: BirdLife International, *BirdLife Cons. Series* 12.
- CALVI, G., T. CAMPEDELLI, E. FULCO, G. LA GIOIA, G. LONDI, C. CELADA & L. FORNASARI. 2013. Andamento delle popolazioni nidificanti di rapaci diurni in Italia secondo il progetto mito2000 tra il 2000 e il 2011. In *Atti Secondo Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni* (Treviso, 2012), cur. F. MEZZAVILLA & F. SCARTON F., 141-50. Associazione Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici 3.
- CAMPEDELLI, T., L. BUVOLI, P. BONAZZI, L. CALABRESE, G. CALVI, C. CELADA, S. CUTINI, E. DE CARLI, L. FORNASARI, E. FULCO, G. LA GIOIA, G. LONDI, P. ROSSI, L. SILVA & G. TELLINI FLORENZANO. 2012. Andamenti di popolazione delle specie comuni nidificanti in Italia: 2000-2011. *Avocetta* 36: 121-43.
- CAMPEDELLI, T., G. LONDI, L. MINI & G. TELLINI FLORENZANO. 2009. Explicit nation-wide habitat models for common Italian Piciformes. *Avocetta* 33 (2): 115-22.
- COLPI, C., M. VARASCHIN, M. ZENATELLO & R. LUISE. 2009. Selvicoltura ed avifauna sensibile. Il caso del picchio nero (*Dryocopus martius*) nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. In *Atti del terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani* (Taormina ottobre 2008), cur. O. CIANCIO.
- COSTA, M., P.P. CECCARELLI, S. GELLINI, L. CASINI & S. VOLPONI, cur. 2009. *Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po. Emilia-Romagna (2004-2008)*. Parco Delta del Po Emilia-Romagna. Codigoro: Tip. Giari.
- DICKS, L.V., J.E. ASHPOLE, J. DÄNHARDT et al. 2014. *Farmalnd Conservation. Evidence for the effects of interventions in northern and western Europe*. Exter: Pelagic Publishing.
- DINETTI, M., & M. FRAISSINET. 2001. *Ornitologia urbana*. Bologna: Calderini Edagricole.

- DOOPS 2013. Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti in Slovenia. www.ptice.si/atlas, cons. dicembre 2013.
- DUFRESNE, M., & P. LEGENDRE. 1997. Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. *Ecol. Monogr.* 67: 345-66.
- EGGENHÖFFNER E. 1842. *Vögel um Triest*. Isis.
- ELITH, J., C.H. GRAHAM, R.P. ANDERSON, M. DUDÍK, S. FERRIER, A. GUIGAN, R.J. HIJMANS, F. HUETTMANN, J.R. LEATHWICK, A. LEHMANN, J. LI, L.G. LOHMANN, B.A. LOISELLE, G. MANION, C. MORITZ, M. NAKAMURA, Y. NAKAZAWA, J.M. OVERTON, A.T. PETERSON, S.J. PHILLIPS, K. RICHARDSON, R. SCACHETTI-PEREIRA, R.E. SCHAPIRE, J. SOBERÓN, S. WILLIAMS, M.S. WISZ & N.E. ZIMMERMANN. 2006. Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. *Ecography* 29: 129-51.
- ELITH, J., S.J. PHILLIPS, T. HASTIE, M. DUDÍK, Y.E. CHEE, & C.J. YATES. 2011. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions* 17: 43-57.
- FELCHER L., R. PIZZUTTI & T. ZORZENON. 1991. *Inventario faunistico regionale permanente. Primi risultati relativi al periodo riproduttivo 1986-1990*. Reg. aut. Friuli-Venezia Giulia.
- GENERO, F. 1983. La Rondine rossiccia (*Hirundo daurica*) nidifica in Friuli. *Riv. it. Orn.* 53: 77-9.
- GERDOL, R., & F. PERCO. 1977. Osservazioni ecologiche sul Gufo comune (*Asio otus* L.) nell'Italia nord-orientale. *Boll. Soc. Adr. Sci., Trieste* 61: 37-59.
- GORMAN, G. 2004. *Woodpeckers of Europe. A study of the European Picidae*. Hungerford, Berkshire: D e N Publishing.
- GU, W., & R.K. SWIHART. 2004. Absent or undetected? Effect of non-detection of species occurrence on wildlife-habitat models. *Biol. Conserv.* 116: 195-203.
- HAGEMEIJER, W.J.M., & BLAIR M.J. 1997. *The EBCC Atlas of European breeding birds*. London: T. e A.D. Poyser.
- JOHNSON, R.R., B.T. BROWN, L.T. HAIGHT & J.M. SIMPSON. 1981. Playback recording as a special avian censusing technique. In *Estimating the numbers of terrestrial birds*, cur. C.J. RALPH & J.M. SCOTT, 68-75. *Studies in Avian Biology* 6.
- KERR, J.T., A. SUGAR & L. PACKER. 2000. Indicator taxa, rapid biodiversity assessment and nestedness in an endangered ecosystem. *Conserv. Biol.* 14: 1726-1734.
- LENS, L., & A.A. DHONDT. 1993. Effects of habitat fragmentation on the timing of crested tit *Parus cristatus* natal dispersal. *Ibis* 136: 147-52.
- MEROW, C., M.J. SMITH & J. SILANDER. 2013. A practical guide to MaxEnt for modeling species' distributions: What it does, and why inputs and settings matter. *Ecography* 36: 1-12.
- MESCHINI, E., & S. FRUGIS, cur. 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 20: 1-346.
- MICCOLI, S. 1958. Rondoni alpini nella Venezia Giulia. *Riv. it. Ornit.* 28: 91-2.
- MOILANEN, A. 2002. Implications of empirical data quality to metapopulation model parameter estimation and application. *Oikos* 96: 516-30.
- PARODI, R., cur. 1999. *Gli uccelli della provincia di Gorizia*. Udine: Mus. Friul. St. Nat. Udine, Pubblic. 42: 1-356.
- PARODI, R., F. PERCO & P. UTMAR. 1993. L'avifauna della Valle Cavanata. *Fauna* 3: 7-38.
- PERCO, F., & E. BENUSSI. 1981. Nidificazione e distribuzione territoriale dell'Astore (*Accipiter gentilis gentilis* L.) sul Carso Triestino. *Atti I Conv. Ecologia Territori Carsici*: 207-16.
- PERCO, F., & N. PERCO. 2011. *Fauna della Riserva Naturale Falesie di Duino*. Comune di Duino-Aurisina (TS).
- PERCO, F., & P. UTMAR. 1989. L'avifauna delle province di Trieste e Gorizia, fino all'Isonzo. *Biogeographia* 13: 801-43.
- PERONACE, V., J.G. CECERE, M. GUSTIN & C. RONDININI. 2012. Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. *Avocetta* 36: 11-58.
- PETRUCCO, R., & E. BENUSSI. 1997. *Piano Faunistico della Provincia di Trieste*. 7 Allegati. Provincia di Trieste, inedito.
- PHILLIPS, S.J., R.P. ANDERSON & R.E. SCHAPIRE. 2006. Maximum entropy modelling of species geographic distribution. *Ecol. Modell.*, 190: 231-59.
- PHILLIPS, S.J. & M. DUDÍK. 2008. Modelling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. *Ecography* 31: 161-75.
- PROVINCIA DI TRIESTE. Il Progetto di recupero della landa carsica a Basovizza <http://www.provincia.trieste.it/opencms/opencms/it/attivita-servizi/pianificazione-territoriale-progetti-europei/landa-carsica/Il-progetto-Landa-Carsica/consult>. dicembre 2013.
- PROVINCIA DI TRIESTE. 2004. *Progetto di recupero ambientale della landa carsica in località Basovizza. Interventi per la salvaguardia della biodiversità all'interno del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Val Rosandra e Monte Cocusso"*. Relazione tecnico-scientifica. Ufficio pianificazione territoriale e strategica, Provincia di Trieste.
- SAVA, S. 2013. In www.ornitho.it, consult. dicembre 2013.
- SCHIAVUZZI, B. 1883. Materiali per una avifauna del territorio di Trieste fino a Monfalcone e dell'Istria. *Boll. Soc. adr. Sci. nat. Trieste* 8 (1): 3-71.
- SCHIAVUZZI, B. 1887. Materiali per una avifauna del Litorale austro-ungarico. *Boll. Soc. adr. Sci. nat. Trieste* 10: 154-83.
- SPAGNESI, M., & L. SERRA, cur. 2003. Uccelli d'Italia. *Quad. Cons. Natura, Min. Ambiente. Ist. Naz. Fauna Selvatica*, 16.
- UTMAR, P. 1989. Gli anatidi nidificanti nella provincia di Gorizia e nella laguna di Marano. *Fauna* 1: 32-46.
- UTMAR, P. 2001. I larolomicoli (Charadriiformes) nelle zone umide costiere del Friuli-Venezia Giulia. *Avocetta* 25: 257.
- UTMAR, P. 2011. Il Fratino (*Charadrius alexandrinus*) in Friuli Venezia Giulia: un tentativo di sintesi. In *Il Fratino. Status, biologia e conservazione di una specie minacciata*. Atti del Convegno Nazionale, Bracciano (Roma, settembre 2010), cur. M. BIONDI & L. PETRELLI, 165-6. Ed. Belvedere.
- UTMAR, P. 2013. In www.ornitho.it, consult. dicembre 2013.
- ZACCHIGNA, M., B. DENTESANI & S. FILACORDA. 2003. Relazioni tra avifauna e vegetazione di pascoli e lande nel Carso. *Avocetta* 27: 61.
- ZANUTTO, I. 2013. In www.ornitho.it, consult. dicembre 2013.

Indirizzi degli Autori - Author's addresses:

- Tommaso CAMPEDELLI
- Guido TELLINI FLORENZANO
- Guglielmo LONDI
- Simonetta CUTINI
- Dream Italia, Via Garibaldi 3, 52015 PRATOVECCHIO STIA (AR)
e-mail: campedelli@dream-italia.net
- Enrico BENUSSI
- Immagine Natura, Via della Ginnastica 73, 34142 TRIESTE (TS)
e-mail: mmagine.natura@libero.it
- Gianpiero CALVI
- Severino VITULANO
- Studio Pteryx, Via Risorgimento 9, 20060 BASIANO (MI)
e-mail: g.calvi@pteryx.it
- Paolo BONAZZI
- Lia BUVOLI
- Jacopo TONETTI
- Associazione FaunaViva, Via A. Fumagalli 6, 20143 MILANO (MI)
e-mail: p.bonazzi@faunaviva.it
- Fabrizio FLORIT
- Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Servizio Biodiversità, Osservatorio Biodiversità, Via Sabbadini, 31, 33100 UDINE (UD)
e-mail: fabrizio.florit@regione.fvg.it