

GORTANIA - Atti Museo Friul. Storia Nat.	6('84)	191-202	Udine, 1.VII.1985	ISSN: 0391-5859
--	--------	---------	-------------------	-----------------

L. POLDINI, M. VIDALI

SEGNALAZIONI FLORISTICHE DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

FLORISTIC SIGNALLING FROM FRIULI-VENEZIA GIULIA REGION

Riassunto breve — Questa è la prima di una serie di contributi miscelanei, opera di vari autori, che partecipano alla cartografia floristica del Friuli-Venezia Giulia.

Parole chiave: Flora, Cartografia, Friuli-Venezia Giulia.

Abstract — *This is the first of a series of miscellaneous contributions, by various authors who collaborate to the floristic cartography of Friuli-Venezia Giulia (NE-Italy).*

Key words: *Flora, Cartography, Friuli-Venezia Giulia.*

Introduzione

È intenzione degli scriventi di coordinare una serie di contributi miscelanei organizzati in schede sul tipo di quelle pubblicate nell'Informatore Botanico Italiano (Segnalazioni floristiche italiane), derivanti dal lavoro di campagna finalizzato alla cartografia floristica del Friuli-Venezia Giulia, da parte degli afferenti al «Gruppo Regionale Esplorazione Floristica» (G.R.E.F.).

Il gruppo, costituitosi nel 1980 presso il Museo Friulano di Storia Naturale (Udine), che ne cura il coordinamento, collabora attivamente al suddetto progetto cartografico portato avanti dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste.

Segnalazioni floristiche dalla regione Friuli-Venezia Giulia: 1

1. *Osmunda regalis* L. (Osmundaceae)

Specie nuova per la regione

R e p e r t i . Alta pianura friulana: presso il Bosco Torrate di Chions (Pn) (0142/2), ca. m 23, 3.VII.1981, G. Bertani.

O s s e r v a z i o n i . Questa specie, rappresentata nell'erbario del Morassi da un esemplare portante l'indicazione «tra Pesariis e Forcella Lavardet», ma esclusa da GORTANI M. (Fl. Friul., 2: 22-23, 1906) per ragioni fitoclimatiche, va quindi ripristinata per la flora friulana. La località trevigiana del Bosco Montello, comunicata da SACCARDO in BOLZON (Suppl. gener. a. cat. d. pian. vasc. d. Ven. di R. de Visiani e P.A. Saccardo, *Atti R. Ist. Venet. sc., letter., art.*, 9: 10, 1897-1898), anche colà probabilmente estinta a causa delle profonde alterazioni dell'ambiente, rappresenta la località più prossima.

Purtroppo la stazione friulana è andata nel frattempo distrutta perchè messa a coltura con mais.

L'esemplare è stato trovato in un bosco di carpino bianco, farnia e frassino ossifillo (*Quercus-Carpinetum boreoitalicum* Pign. 1953).

G. BERTANI

Segnalazioni floristiche dalla regione Friuli-Venezia Giulia: 2

2. *Herniaria hirsuta* L. (Caryophyllaceae)

Specie nuova per la provincia di Trieste e rediviva per la regione

R e p e r t i . Trieste: stazione di S. Sabba (0348/IV/c), ca. m 6, 28.VIII.1984, L. Poldini et M. Vidali (TSB).

O s s e r v a z i o n i . Specie paleotemperata diffusa in tutto il bacino mediterraneo a partire dalle isole Canarie, dal quale raggiunge l'Afghanistan e il Pakistan; il suo areale si estende su tutta l'Europa per giungere fino all'Asia occidentale (RECHINGER in HEGI, Ill. Fl. Mitteleur., 3 (2): 757-758, 1961).

Per quanto riguarda la sua distribuzione in Italia, PIGNATTI (Fl. d. Ital., 1: 230, 1982) la segnala in tutte le regioni, compreso il Friuli-Venezia Giulia ed include anche il Triestino. Noi non siamo riusciti a risalire a questa citazione. Infatti il MARCHESETTI (Fl. d. Trieste: 212, 1896-97) indica per il territorio in questione solo *H. glabra* L., mentre POSPICHAL (Fl. d. oesterr. Küst., 1: 423, 1897-98) segnala la presenza di *H. hirsuta* L. in Istria presso Canfanaro sulla strada per Rovigno e a Smogliani, quindi al di fuori dei limiti regionali.

L'unica citazione regionale si rifà ad un ritrovamento del Brumati risalente alla prima metà dello scorso secolo incluso nell'erbario Pirona — quest'ultimo a sua volta la dà distribuita «in arenosis ad mare» (Fl. ForoJul. Syll.: 57, 1855) — ripresa da GORTANI M. (Fl. Friul., 2: 156, 1906). Da allora la specie non è stata mai più ritrovata.

L. POLDINI et M. VIDALI

Segnalazioni floristiche dalla regione Friuli-Venezia Giulia: 3

3. *Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E. Schulz (Cruciferae)

(Syn.: *E. pollichii* Schimp. et Sp.; *Brassica ochroleuca* Soy-Will.; *B. erucastrum* var. *ochroleuca* Gaudin)

Specie nuova per la regione

R e p e r t i . Alpi Giulie occidentali (Friuli): Val Dogna, sotto Chiout Zucuin (Ud) (9546/1), m 620, ottobre 1983, E. Mezzelani et C. Perusovich (TSB).

O s s e r v a z i o n i . Specie subatlantica, considerata caratteristica in Europa centrale del *Mercurialetum annuae* Krusem. et Vlieg. 39 em. Th. Mueller, si estende dal sud della Francia alle Ardenne e nel territorio della Mosella (MARKGRAF in HEGI, Ill. Fl. Mitteleur., 4 (1): 480, 1963); rispetto a questa distribuzione si sono aggiunte nuove indicazioni che interessano anche il bacino danubiano ungherese e a nord l'Olanda, la Vestfalia e la Turingia (HESS et al., Fl. d. Schweiz, 2: 191, 1970). Ciò dimostra un'espansione in atto di questa antropofita.

Per quanto riguarda l'Italia, PIGNATTI (Fl. d. Italia, 1: 476, 1982) la indica soltanto dalla Val d'Aosta (Cogne e Gressoney), Massa, Ostia e ancora in Veneto e Trentino, ma soltanto la Val d'Aosta è riportata nella distribuzione regionale.

