

GORTANIA - Atti Museo Friul. Storia Nat.	8('86)	249-262	Udine, 30.IV.1987	ISSN: 0391-5859
--	--------	---------	-------------------	-----------------

L. LAPINI, Fa. PERCO

PRIMI DATI SU *ERINACEUS CONCOLOR* MARTIN, 1838
 NELL'ITALIA NORDORIENTALE
 (MAMMALIA, INSECTIVORA, ERINACEIDAE)

FIRST DATA ON ERINACEUS CONCOLOR MARTIN, 1838 IN NORTHEASTERN ITALY (MAMMALIA, INSECTIVORA, ERINACEIDAE)

Riassunto breve — E' stato esaminato un campione di 83 *Erinaceus* dell'Italia nordorientale (Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige) e della Jugoslavia nordoccidentale soprattutto nei riguardi di alcuni particolari osteologici craniali e dell'ornamentazione ventrale. È risultato evidente come i ricci del Nord Est italiano debbano venire ascritti a due specie diverse, *E. europaeus* ed *E. concolor*; quest'ultima specie viene segnalata per la prima volta sul territorio politico italiano.

Parole chiave: Distribuzione, *Erinaceus concolor*, *Erinaceus europaeus*.

Abstract — After the examination of 83 *Erinaceus* of North-Eastern Italy (Friuli-Venezia Giulia, Veneto and Trentino Alto Adige) and of North-Western Yugoslavia mainly as concerns some cranium osteological aspects and ventral ornamentation, the authors conclude that the hedgehogs of North-Eastern Italy belong to two different species, *E. europaeus* and *E. concolor*. The presence of the latter on the Italian territory is reported for the first time.

Key words: Distribution, *Erinaceus concolor*, *Erinaceus europaeus*.

1. Premessa

Descritto per l'Asia Minore nordorientale, *Erinaceus concolor* MARTIN, 1838 (Terra Typica: presso Trebisonda, Asia Minore) è stato a lungo considerato una sottospecie di *E. europaeus* distinta da quella indicata come la più tipica per l'Est europeo. Quest'ultima forma, descritta da BARRETT-HAMILTON nel 1900 (Terra Typica: Gageni, Prahova, Romania) e denominata *E. e. roumanicus*, fu considerata per più

